

全国护士执业资格考试精确模拟卷(一)

专业实务+实践能力

【A1/A2 型題】

1. 慢性腹瀉指病程至少超過
 - A. 2 周
 - B. 1 個月
 - C. 2 個月
 - D. 6 個月
 - E. 1 年

2. 大便呈白陶土色常見于
 - A. 肉類飲食過多
 - B. 上消化道出血
 - C. 肝細胞性黃疸
 - D. 胆汁淤積性黃疸
 - E. 溶血性黃疸

3. 慢性胃炎最重要的病因是
 - A. Hp 感染
 - B. 理化原因
 - C. 自身免疫
 - D. 老年胃黏膜退行性變
 - E. 胃黏膜營養因子缺乏

4. 引起上消化道出血最常見的疾病是
 - A. 食管癌
 - B. 胰腺炎
 - C. 急性胃炎
 - D. 胃黏膜脫垂
 - E. 消化性潰瘍

5. 能引起急性胰腺炎的藥物是
 - A. 青霉素
 - B. 腎上腺素
 - C. 葡萄糖酸鈣
 - D. 去甲腎上腺素
 - E. 糖皮質激素

6. 肺結核最重要的傳播途徑是
 - A. 呼吸道傳播
 - B. 消化道傳播
 - C. 皮膚黏膜傳播
 - D. 泌尿道傳播
 - E. 生殖道傳播

7. 病人出現嘔血提醒胃內積血至少超
 - A. 100ml
 - B. 200ml
 - C. 250ml
 - D. 300ml
 - E. 350ml

8. 嘔吐物為隔宿食物多見于
 - A. 胃癌
 - B. 幽門梗阻
 - C. 腸梗阻
 - D. 食物中毒
 - E. 急性胃炎

9. 壁細胞重要分泌
 - A. 鹽酸、內因子
 - B. 胃蛋白酶原
 - C. 胃蛋白酶
 - D. 胃泌素
 - E. 雙糖酶

10. 引起心前區疼痛最常見的原因是
 - A. 冠心病
 - B. 心包炎
 - C. 胸膜炎
 - D. 食管炎
 - E. 心血管神經官能症

11. 最常見的繼發性肺結核是
 - A. I 型肺結核
 - B. II 型肺結核
 - C. III 型肺結核
 - D. IV 型肺結核
 - E. V 型肺結核

12. 肺氣腫的發生與遺傳原因有關是指人體缺乏
 - A. 肌酸磷酸激酶
 - B. α -糜蛋白酶
 - C. 乳酸脫氫酶
 - D. 葡萄糖醛酸轉移酶
 - E. α -抗胰蛋白酶

13. 急性闌尾炎腹痛起始于臍周或上腹的原因是
 - A. 胃腸功能紊亂
 - B. 內臟神經反射
 - C. 軀體神經反射
 - D. 闌尾位置不固定
 - E. 闌尾管壁痙攣

14. 特發性血小板減少性紫癜患者體內產生血小板特异性 IgG 的部位重要是
 - A. 脾
 - B. 腸

- C. 肾
- D. 骨髓
- E. 胸腺

15. 在我国引起肝硬化的最重要病因是

- A. 病毒性肝炎
- B. 乙醇中毒
- C. 药物中毒
- D. 日本血吸虫病
- E. 慢性肠道炎症

16. 有关怀源性水肿发生机制错误的是

- A. 肾血流量减少
- B. 继发性醛固酮增多
- C. 毛细血管静水压增高
- D. 组织液生成增多
- E. 血浆胶体渗透压增高

17. 肠结核的好发部位是

- A. 空肠
- B. 回肠上端
- C. 回盲部
- D. 升结肠
- E. 乙状结肠

18. 特发性血小板减少性紫癜患者体内血小板的寿命约为

- A. 1~3 天
- B. 3~5 天
- C. 5~7 天
- D. 7~11 天
- E. 9~11 天

19. 在原发性高血压的发病机制中占主导地位的是

- A. 胰岛素抵御
- B. 内分泌异常
- C. 血管内皮功能异常
- D. 高级神经中枢功能失调
- E. 肾素-血管紧张素系统异常

20. 已被肯定可致白血病的化学物质是

- A. 氯霉素
- B. 保泰松
- C. 烷化剂
- D. 细胞毒药物
- E. 苯及其衍生物

21. II 型呼吸衰竭的血气变化是

- A. PaO₂ 下降, PaCO₂ 正常
- B. PaO₂ 正常, PaCO₂ 增高
- C. PaO₂ 下降, PaCO₂ 增高
- D. PaO₂ 增高, PaCO₂ 下降
- E. PaO₂、PaCO₂ 均下降

22. 炎症性病变所致的急腹症一般不会出现

- A. 持续性腹痛
- B. 体温升高、白细胞计数升高
- C. 恶心、呕吐
- D. 固定压痛点
- E. 肠鸣音亢进

23. 慢性肺心病引起的心脏肥厚、扩大重要发生在

- A. 左心房
- B. 左心室
- C. 右心房
- D. 右心室
- E. 整个心脏

24. 甲胎蛋白阳性可初步诊断

- A. 初期肝硬化
- B. 肝肾综合征
- C. 原发性肝癌
- D. 肝转移癌
- E. 淤胆性肝炎

25. 胃黏膜保护剂不包括

- A. 前列腺素
- B. 丙谷胺
- C. 硫糖铝
- D. 罗沙替丁
- E. 胶体铋

26. 观测铁剂治疗效果最早的化验指标是

- A. 红细胞数上升
- B. 血清铁含量上升
- C. 血红蛋白量上升
- D. 红细胞体积增大
- E. 网织红细胞数上升

27. 肺结核空洞和肺脓肿空洞最可靠的鉴别诊断措施是

- A. 痰的性状
- B. 肺部体征
- C. 胸部 X 线检查
- D. 痰细菌学检查

E. 外周血细胞检查

28. 風湿性心脏病患者并发哪种心律失常時易引起栓塞

- A. 窦性心动过缓
- B. 窦性心动过速
- C. 过早搏动
- D. 心房颤动
- E. III度房室传导阻滞

29. 肺結核最可靠的诊断根据是

- A. 胸部 X 线摄片发现病灶
- B. 测紅细胞沉降率加速
- C. 結核菌素试验阳性
- D. 痰菌检查阳性
- E. 經典的症状、体征

30. 正常人尿中可出現的管型是

- A. 透明管型
- B. 颗粒管型
- C. 脂肪管型
- D. 紅细胞管型
- E. 白细胞管型

31. 制止组胺与 H₂ 受体結合，使胃酸分泌减少的药物是

- A. 硫糖铝
- B. 雷尼替丁
- C. 氢氧化铝
- D. 洛赛克
- E. 前列腺素

32. 急性胰腺炎起病後升高最早的酶是

- A. 血清淀粉酶
- B. 尿淀粉酶
- C. 血清脂肪酶
- D. 單胺氧化酶
- E. 碱性磷酸酶

33. 极化液用于心肌梗死的重要目的是

- A. 增长心肌营养
- B. 改善心肌缺血
- C. 减少心律失常的发生
- D. 增长心肌收缩力
- E. 增长心肌兴奋性

34. 小脑疾患步态呈

- A. 蹒跚步态

B. 慌张步态

C. 跨阈步态

D. 酒醉步态

E. 共济失调步态

35. 肝硬化失代偿期最突出的体现是

- A. 脾大
- B. 腹水
- C. 肝掌
- D. 贫血
- E. 出血

36. 長期应用泼尼松面容呈

- A. 满月面容
- B. 甲亢面容
- C. 慢性病面容
- D. 二尖瓣面容
- E. 肢端肥大面容

37. 肝性脑病最具有特性性的体征是

- A. 腱反射亢进
- B. 肌张力增长
- C. 扑翼样震颤
- D. 踝阵挛
- E. 巴宾斯基征阳性

38. 甲亢病人最常見的心律失常类型是

- A. 室性期前收缩
- B. 室颤
- C. 室上性心动过速
- D. 室性心动过速
- E. 心房纤颤

39. 最能提醒出血坏死型胰腺炎的体现是

- A. 上腹痛向腰背部放射
- B. 两侧肋腹部皮肤呈暗灰蓝色淤斑
- C. 上腹部压痛、反跳痛
- D. 频繁呕吐
- E. 黄疸

40. 肺气肿胸部叩诊音为

- A. 清音
- B. 鼓音
- C. 实音
- D. 浊音
- E. 過清音

41. 風湿性疾病最常見的症状是

- A. 关节痛
- B. 肌肉痛
- C. 软组织痛
- D. 神經痛
- E. 关节致残

42. 系统性紅斑狼疮經典的皮损是

- A. 盘形紅斑
- B. 蝶形紅斑
- C. 斑丘疹
- D. 紫斑
- E. 荨麻疹

43. 类風湿性关节炎的手指畸形体现為

- A. 匙状指
- B. 杵状指
- C. 梭状指
- D. 锤状指
- E. 蜘蛛指

44. 一氧化碳中毒的病人口唇呈

- A. 青紫色
- B. 苍白色
- C. 黄绿色
- D. 暗紅色
- E. 櫻桃紅色

45. 重度一氧化碳中毒患者，脑水肿发展到高峰时间是在病後

- A. 6~8 小時
- B. 12~24 小時
- C. 24~48 小時
- D. 48~36 小時
- E. 36~72 小時

46. 热痙挛发生時，痙挛肌肉最常見的是

- A. 腹肌
- B. 肠道平滑肌
- C. 膈肌
- D. 腓肠肌
- E. 面肌

47. 移動性浊音阳性提醒腹腔内游离的液体的量至少应超過

- A. 100ml
- B. 1000ml
- C. 1500ml
- D. ml

E. 2500ml

48. 急腹症在未明确诊断時可對没有休克的病人進行

- A. 流质饮食
- B. 予以镇痛药
- C. 实行胃肠減压
- D. 便秘者行低压灌肠
- E. 可服用少許石蜡油

49. 绞窄性肠梗阻疼痛的性质是

- A. 锐痛
- B. 钝痛
- C. 胀痛
- D. 持续性腹痛，阵发性加剧
- E. 阵发性绞痛

50. 骨折与脱位共有的特性性体现是

- A. 疼痛
- B. 肿胀
- C. 畸形
- D. 异常活動
- E. 骨擦音

51. 判断口對口人工呼吸效果對的的根据是

- A. 口唇紅润
- B. 胸廓起伏
- C. 自主呼吸恢复
- D. 大動脉出現搏動
- E. 散大的瞳孔缩小

52. 中醫的“四诊”是指

- A. 望诊、触诊、叩诊、听诊
- B. 望诊、闻诊、問诊、切诊
- C. 视诊、触诊、叩诊、切诊
- D. 视诊、触诊、叩诊、听诊
- E. 望诊、闻诊、叩诊、听诊

53. 可导致經络气血壅塞的致病原因是

- A. 過饱
- B. 過劳
- C. 六淫
- D. 痰饮
- E. 疫伤

54. 溃疡性結肠炎病人重要的症状是

- A. 高热
- B. 腹泻

- C. 关节痛
- D. 呕吐
- E. 腹胀

55. 男, 37岁, 反复晨起眼睑水肿一年余。测血压 170 / 110mmHg, 尿常规: 红细胞 5~8 个 / HP, 白细胞 0~3 个 / HP, 尿蛋白(+++), 尿糖(-)。患者血压升高的原因首先考虑

- A. 多囊肾
- B. 肾盂肾炎
- C. 肾小球肾炎
- D. 糖尿病肾病
- E. 肾动脉狭窄

56. 男, 42岁, 因“急性梗阻性化脓性胆管炎”急诊入院。寒战, 体温骤升至 41°C, 脉搏 112 次 / 分, 血压 85 / 65mmHg, 其休克类型为

- A. 感染性休克
- B. 低血容量性休克
- C. 心源性休克
- D. 神经源性休克
- E. 过敏性休克

57. 女, 28岁, 妊娠 41周, 为防止“过期妊娠”入院引产。病人遵医嘱口服己烯雌酚 3天, 其作用是

- A. 增进子宫发育, 使子宫肌层增厚
- B. 提高子宫平滑肌对缩宫素的敏感性
- C. 增进子宫内膜增生
- D. 增进输卵管蠕动
- E. 对下丘脑、垂体产生正负反馈作用

58. 女, 30岁, 孕 1产 0。孕 40周, 规律宫缩 4小时, 破膜 5小时入院, 腹部检查: 胎头高浮, 应首先测量的骨盆径线是

- A. 入口径线
- B. 中骨盆径线
- C. 坐骨棘间径
- D. 出口横径
- E. 出口前后径

59. 女, 30岁, 风心病病史 8年。晨起右侧肢。体活动不便, 不能下床, 口角歪斜, 言语不清。应首先考虑

- A. 脑出血
- B. 脑栓塞
- C. 脑血栓形成
- D. 蛛网膜下腔出血

E. 严重心力衰竭

60. 男, 33岁, 腹部撞伤后 1小时, 烦躁不安, 面色苍白, 血压 80 / 60mmHg, 脉率 120 次 / 分, 腹部叩诊有移动性浊音, 为明确诊断简朴而可靠的检查是

- A. 血常规
- B. 腹部 B超
- C. 腹腔穿刺
- D. 血尿淀粉酶
- E. X线胸腹联合透视

61. 男, 30岁, 饱餐后突发上腹持续性疼痛 4小时, 体检全腹有压痛, 腹肌紧张, 肝浊音界消失。对其诊断最有价值的检查是

- A. 血常规检查
- B. 腹部 CT 检查
- C. 立位腹部平片
- D. 血淀粉酶测定
- E. 纤维胃镜检查

62. 男, 50岁, 1个月来大便带少许鲜血和黏液, 排便习惯变化。对该患者简朴而重要的检查是

- A. 直肠镜
- B. 肛门镜
- C. 直肠指检
- D. 纤维结肠镜
- E. X线钡灌肠造影

63. 3岁腹泻患儿, 补液中出现低血钾, 现剩余液体 500ml, 最多可加入 10%氯化钾

- A. 0. 3ml
- B. 0. 6ml
- C. 1. 5ml
- D. 3ml
- E. 15ml

64. 女, 50岁, 因患尿毒症而入院。病人精神萎靡, 食欲差, 24小时尿量 80ml, 下腹部空虚, 无腹痛。病人目前的排尿状况是

- A. 尿潴留
- B. 尿失禁
- C. 少尿
- D. 尿闭
- E. 尿崩

尿毒症患者，自訴極度疲乏、胸悶、心慌、尿少，體檢心律不齊，期前收縮 8~10 次 / 分，測血鉀 8.8mmol / l。若不緊急處理，會忽然發生

- A. 心臟停搏
- B. 休克
- C. 昏迷
- D. 腎衰竭
- E. 呼吸衰竭

66. 男，30 歲，大面積燒傷合併血紅蛋白尿，輸液時每小時尿量至少應在

- A. 10ml 以上
- B. 20ml 以上
- C. 30ml 以上
- D. 40ml 以上
- E. 50ml 以上

67. 女，42 歲，右側乳腺發現一無痛性腫塊，生長速度快，質硬，周圍分界不清，同側腋窩淋巴結腫大。應首先考慮

- A. 急性乳腺炎
- B. 乳腺癌
- C. 乳腺囊性增生病
- D. 乳腺纖維腺瘤
- E. 乳管內乳頭狀瘤

68. 女，25 歲，停經 45 天，尿妊娠試驗陽性，出現的早孕反應不包括

- A. 腹痛
- B. 惡心、嘔吐
- C. 嗜睡、流涎
- D. 喜食酸物
- E. 頭暈、乏力

69. 男，62 歲，患肺源性心臟病 3 年，近 5 日因受涼後痰多、黏稠、不易咳出，訴全身乏力，已臥床 5 日未解大便。該患者的首要問題是

- A. 便秘
- B. 活動無耐力
- C. 語言溝通障礙
- D. 清理呼吸道無效
- E. 皮膚完整性受損

70. 初產婦，23 歲，足月分娩過程中痛苦不安，此時護士宜採用的溝通是

- A. 沉默
- B. 親切撫摸

- C. 任其宣洩
- D. 對患者微笑
- E. 與其他護士談笑以分散其注意力

71. 不屬於肺炎球菌肺炎的病理分期的是

- A. 消散期
- B. 紅色肝變期
- C. 潰瘍期
- D. 灰色肝變期
- E. 充血期

72. 女，27 歲，因尿頻、尿急、尿痛來院急診，有助於診斷的尿液檢查是

- A. 尿量
- B. 尿蛋白
- C. 尿比重
- D. 尿液酸鹼度
- E. 尿鏡檢細胞數

73. 新生兒，女，日齡 5 天，食欲及精神很好，母親在給其換尿布時發現其會陰部有血性分泌物。屬於

- A. 生理現象
- B. 肉眼血尿
- C. 尿道出血
- D. 回腸出血
- E. 直腸出血

74. 某孕婦，第 1 胎，妊娠 39 周來院檢查，醫生告之臨產先兆，收住院，最可靠的根據是

- A. 宮縮強度增長
- B. 見紅
- C. 尿頻
- D. 胎兒下降感
- E. 上腹部舒適感

75. 患者，男性，69 歲，高血壓性心臟病。近 1 年來病人明顯感覺體力活力活動受限，洗臉、刷牙即可引起呼吸困難、心悸。此病人目前的心功能處在

- A. 代償期
- B. I 級
- C. II 級
- D. III 級
- E. IV 級

76. 患兒，6 歲，雙下肢燙傷，其燙傷面積為

- A. 25%

B. 30%

- C. 35%
- D. 40%
- E. 45%

77. 1岁, 小儿, 男, 因畏食来院求醫, 护士应首先為其检查

- A. 前囟
- B. 体重
- C. 坐高
- D. 牙齿
- E. 骨骼发育

78. 2岁, 男孩, 進食時哭闹不止, 忽然出現劇烈呛咳、喉鸣、呼吸困難。该患儿也許是

- A. 高热惊厥
- B. 急性脑炎
- C. 气管异物
- D. 肺炎
- E. 支气管炎

79. 患者, 男, 40岁, 近曰来常口渴喜冷饮、烦躁不安、大便干結, 現舌紅苔黃而干、脉数。该患者属于

- A. 虚证
- B. 阴证
- C. 寒证
- D. 热证
- E. 表证

80. 患者, 男性, 25岁。因結核性胸膜炎入院, 患者诉下午有低热, 夜间有盜汗, 咳嗽後左侧胸痛明显加重, 听诊可聞及胸膜摩擦音。根据以上状况, 可提醒病变累及

- A. 胸壁层胸膜
- B. 脏层胸膜
- C. 膈肌
- D. 胃
- E. 肝脏

81. 35岁, 女性, 看醫生時拒绝执行任何吩咐, 醫生叫他张開嘴時, 反而咬紧牙关, 要他睁眼, 反而紧闭, 要他伸出手来, 反而放到身後去。此种現象属于

- A. 模仿症状
- B. 违拗症状
- C. 反复与刻板動作
- D. 强迫動作
- E. 被動現象

82. 早产儿, 生後3天, 反应差, 喂养困难, 哭声异常, 肌张力低, 經补充葡萄糖後上述症状消失。该患儿最也許的诊断是

- A. 新生儿窒息
- B. 新生儿缺氧缺血性脑病
- C. 新生儿颅内出血
- D. 新生儿低血糖
- E. 新生儿寒冷损伤综合征

83. 患儿, 2岁。自1岁时出現活動後气促、乏力, 常喜下蹲位, 发紺, 胸骨左缘2~4肋间聞及III级收缩期杂音, 可見杵状指。首先考虑

- A. 右心室肥厚
- B. 動脉导管未闭
- C. 法洛四联症
- D. 室间隔缺损
- E. 房间隔缺损

84. 患儿, 男, 1岁, 患化脓性脑膜炎。入院後出現意识不清, 呼吸不规则, 两侧瞳孔不等大, 對光反射迟钝。该患儿也許出現的并发症是

- A. 脑疝
- B. 脑脓肿
- C. 脑积水
- D. 脑室管膜炎
- E. 颅神經损伤

85. 患儿, 男, 6個月。冬季出生, 人工喂养, 平時睡眠不安、多汗, 今晒太阳後突发全身抽搐5~6次, 每次1分钟左右, 惊止後活泼如常, 体温37°C。你認為该患儿发生

- A. 手足抽搐症
- B. 化脓性脑膜炎
- C. 低血糖症
- D. 高热惊厥
- E. 癲病

86. 女, 30岁, 已婚。近几曰感覺白帶增多呈稀薄泡沫状, 伴外阴瘙痒。首先应做的检查是

- A. 阴道分泌物悬滴检查
- B. 宫颈涂片检查
- C. 阴道镜检
- D. 窥器检查
- E. 双合诊检查

林女士，足月自然产後 4 天，出現下腹痛，体温正常，惡露多，有臭味，子宫底脐上 1 指，子宫体软，应考虑為

- A. 子宫肌炎
- B. 盆腔結締组织炎
- C. 子宫内膜炎
- D. 急性输卵管炎
- E. 腹膜炎

87. 患者，男性，69 岁。高血压病史 6 年，糖尿病病史 2 年，血压曾為 170 / 105mmHg，吸烟，不饮酒。根据以上状况，该患者的预后判断是

- A. 高血压，多极低危组
- B. 高血压，低危组
- C. 高血压，中危组
- D. 高血压，高危组
- E. 高血压，很高危组

89. 某風湿性心脏病病人，卧床 4 個月余，每天需做下肢被動活動和按摩，其目的是

- A. 增進末梢循环，減少回心血量
- B. 防止肢体肌肉萎縮
- C. 防止下肢静脉血栓形成
- D. 防止足部发生压疮
- E. 使病人舒适，增進睡眠

90. 患者男性，65 岁，身体素质良好，运动後该老人最合适的心率应在

- A. 100 次 / 分
- B. 105 次 / 分
- C. 110 次 / 分
- D. 120 次 / 分
- E. 125 次 / 分

91. 男，34 岁。血压持续增高 1 年以上，中度浮腫，尿蛋白常(++~+++)，管型(+)，最大也許诊断為

- A. 急性肾炎
- B. 慢性肾小球肾炎
- C. 慢性肾盂肾炎
- D. 输尿管結石
- E. 肾結核

92. 女，24 岁，身材矮小，匀称，骨盆测量数值如下：髂前上棘间径 22cm，髂嵴间径 24cm，骶耻外径 17cm，出口横径 7.5cm，對角径 11.5cm。此孕妇骨盆為

- A. 扁平骨盆

- B. 畸形骨盆
- C. 漏斗骨盆
- D. 横径狭小骨盆
- E. 均小骨盆

93. 患者，男性，35 岁，小时候曾患過麻疹、肺炎，被诊断為支气管扩张症 10 余年，近 1 周来咳嗽、咳痰加重，痰呈脓性，每日约 500ml，伴低热。患者所患支气管扩张症的发病机制是

- A. 全身免疫功能低下
- B. 支气管防御功能退化
- C. 支气管平滑肌痉挛
- D. 支气管感染和阻塞
- E. 支气管变态反应性炎症

94. 患者，男性，68 岁，因近日咳嗽、咳痰、气急明显，又出現神志不清、发紺而入院。既往有肺气肿病史。动脉血气分析 pH7.31，PaO₂52mmHg，PaCO₂61mmHg，予以低浓度氧疗的根据是

- A. 便于应用呼吸兴奋剂
- B. 慢性呼吸衰竭時，呼吸中枢對 CO₂ 的刺激仍很敏感
- C. 缺 O₂ 是维持病人呼吸的重要刺激因子
- D. 氧浓度不小于 30% 易引起氧中毒
- E. 高浓度氧疗轻易使病人呼吸兴奋

95. 某慢性支气管炎肺气肿患者，因近两日咳嗽、咳痰、气促明显就诊，查体：嗜睡，口唇轻度发紺，球結膜充血水肿，多汗，血气分析 PaO₂50mmHg，PaCO₂68mmHg，病人目前最也許出現的是

- A. 肺心病
- B. 肺炎
- C. 左心衰竭
- D. 呼吸衰竭
- E. 肺癌

96. 男性，56 岁，晨起時覺上、下肢麻木，但可自行去厕所，回卧室時因左下肢無力而跌倒。护理体检：神志清，左侧上、下肢癱瘓，口眼不歪斜。应首先考虑

- A. 内囊出血
- B. 脑栓塞
- C. 脑血栓形成
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 脑外伤

97. 患者，男性，发热，体温 38.5℃，全身有小出血點，頭暈、乏力，經醫院查血紅蛋白 80g/L，紅細胞 $3 \times 10^{12} / L$ ，白細胞 $3 \times 10^9 / L$ ，血小板 $70 \times 10^9 / L$ ，确诊為再生障碍性贫血。

其发热的重要原因是

- A. 营养不良
- B. 缺乏成熟中性粒细胞
- C. 缺氧
- D. 出血
- E. 新陳代謝旺盛

98. 男，30 岁。因車禍导致心跳、呼吸驟停。护士進行單人心肺复蘇時人工呼吸与心脏按压的比例是

- A. 1: 3
- B. 1: 5
- C. 2: 10
- D. 2: 15
- E. 2: 30

99. 女性，34 岁，胸外伤後呼吸困難，发紺，脉快，体检時見胸壁有一約 3cm 長開放性伤口，呼吸時伤口处出发嘶嘶声音，伤侧呼吸音消失，叩診呈鼓音。首先考慮為

- A. 閉合性气胸
- B. 開放性气胸
- C. 张力性气胸
- D. 损伤性血胸
- E. 机化性血胸

【A3/A4 型題】

(100~103 題共用題干)

女性，28 岁。近曰来发热，腰痛伴尿急、尿频、尿痛，查尿白細胞 25 個/HP。

100. 该患者考虑也許是

- A. 急性腎炎
- B. 慢性腎炎
- C. 泌尿系感染
- D. 急進性腎炎
- E. 腎病綜合征

101. 引起该患者发病的原因是

- A. 免疫缺陷
- B. 細菌感染
- C. 遗传原因
- D. 過敏
- E. 营养過剩

102. 护士告知该患者多饮水，其重要目的是

- A. 減少体温
- B. 缓和尿频
- C. 营养需要
- D. 冲洗尿管
- E. 治疗腰痛

103. 針對该疾病的防止，应重點告知病人

- A. 保持會阴部卫生
- B. 長期锻炼
- C. 加强营养
- D. 常服抗生素
- E. 戒烟酒

(104~106 題共用題干)

患者，男性，34 岁，近一年来晨起双侧眼脸水肿，血压一直维持在 150 / 90mmHg 左右。近一周工作较劳累，自覺眼脸水肿加重，就診後查尿蛋白(++)，尿紅細胞偶見。

104. 该患者应考虑為

- A. 急性腎小球腎炎
- B. 慢性腎小球腎炎
- C. 腎病綜合征
- D. 腎盂腎炎
- E. 急進性腎炎

105. 该患者发病的原因是

- A. 免疫性炎症
- B. 細菌性炎症
- C. 病毒感染
- D. 過敏性原因
- E. 遗传原因

106. 该患者本次病情加重的诱因是

- A. 高血压
- B. 蛋白尿
- C. 感染
- D. 劳累
- E. 营养不良

(107~108 題共用題干)

赵先生，49 岁，患風湿性心瓣膜病，因发生感染，心功能 III 级而入院。予以抗感染和抗心衰治疗。今曰出現乏力、腹脹、心悸，心电图出現 U 波增高。

107. 目前赵先生出現的并发症是

- A. 高钾血症
- B. 低钾血症
- C. 高钠血症
- D. 低钠血症
- E. 代謝性酸中毒

108. 赵先生出院後，防止链球菌感染的措施应当是

- A. 坚持锻炼，防止呼吸道感染
- B. 减少运动，多休息
- C. 坚持限制钠盐饮食
- D. 减轻心理压力，增强康复信心
- E. 定期复查，必要时做血细菌培养

(109~110 題共用題干)

男，42岁，食欲不振，尿色深两周。查体：皮肤、巩膜均黄染，肝大，肋下2cm，轻度触痛，脾肋下未触及；试验室检查：总胆红素 $12\mu\text{mol/L}$ ，直接胆红素 $60\mu\text{mol/L}$ ，ALT 200U/L ，ALP 100U/L ，GGT 100U/L ，尿胆红素及尿胆原均呈阳性，彩超检查未见胆囊肿大及胆总管扩大。

109. 考虑其黄疸属于

- A. 肝细胞性黄疸
- B. 溶血性黄疸
- C. 多吃胡萝卜引起
- D. 胰头癌肝外胆管受压所致
- E. 肝总管结石所致

110. 该患者也许出现异常的检查是

- A. AFP
- B. 凝血酶原时间
- C. 网织红细胞计数
- D. 游离血红蛋白
- E. 骨髓涂片检查

(111~112 題共用題干)

男，40岁，烈日下從事重体力劳动，突发頭痛、頭暈，四肢無力伴多汗，後抽搐昏迷。查体：皮肤干热無汗，体温 40°C ，呼吸26次/分，脉搏120次/分，血压70/50mmHg。

111. 应考虑该患者发生了

- A. 热衰竭
- B. 热痉挛
- C. 热射病
- D. 先兆中暑
- E. 日射病

112. 此时最合适的降温措施是

- A. 迅速补充生理盐水
- B. 頭部及大血管处放置冰袋
- C. 应用人工冬眠
- D. 10%水合氯醛保留灌肠
- E. 动脉迅速推注 4°C 5%葡萄糖盐水

(113~114 題共用題干)

胎龄32周，日龄2天的新生儿。出生体重2300g。心率120次/分，呼吸佳，四肢能活动，全身皮肤红润，其他均正常。

113. 根据体重分类，该患儿属于

- A. 巨大儿
- B. 低出生体重儿
- C. 极低出生体重儿
- D. 正常出生体重儿
- E. 超低出生体重儿

114. 与该患儿外观特性不相符的是

- A. 耳廓清晰
- B. 乳房無結节
- C. 足底纹络少
- D. 发细如绒毛
- E. 皮肤薄嫩，胎毛多

(115~116 題共用題干)

患者女性，46岁，由于下岗，对生活失去信心，同步不能照顾家庭，伴失眠，被诊断为“抑郁症”。

115. 不也许出现的症状是

- A. 爱好缺乏
- B. 睡眠障碍
- C. 思维贫乏
- D. 自责和厌世感
- E. 言語动作缓慢

116. 护士在接诊患者时应

- A. 简介醫院专长
- B. 护士自我简介
- C. 直截了当的询问
- D. 让患者放松心情
- E. 直接给出明确诊断

(117~119 題共用題干)

患儿，男，8岁，因“发热伴腮腺肿痛”就诊。体检：体温 39°C

，左侧腮腺肿大，局部皮肤紧张、发亮，患儿诉说灼热、疼痛。试验室检查：血白细胞计数正常。

117. 为减轻腮肿部位的疼痛，采用
- A. 口服止痛药
 - B. 口含抗炎药
 - C. 咬紧牙关
 - D. 热敷局部
 - E. 冷敷局部

118. 假如该患儿出现中上腹剧痛，有压痛和肌紧张，伴呕吐、腹胀、腹泻等，最可能的诊断是

- A. 胰腺炎
- B. 脑膜脑炎
- C. 肾炎
- D. 腹膜炎
- E. 腹泻

119. 1周内，对患儿观测的重点不包括

- A. 体温
- B. 体重
- C. 有无剧烈头痛
- D. 有无腹痛
- E. 有无睾丸肿痛状况

(120~121 题共用题干)

男，45岁，肝炎病史，近2个月来感腹胀明显，心慌、气促、呼吸困难。查体：腹部膨隆，状如蛙腹，B超示大量腹水。

120. 其腹水发生的原因不包括

- A. 肾小球滤过率下降
- B. 血清清蛋白减少
- C. 门脉内压力增高
- D. 抗利尿激素减少
- E. 肝淋巴失衡

121. 对的的护理措施是

- A. 食盐每天摄入不超过6g
- B. 应取平卧位休息
- C. 尽量不更换利尿剂种类
- D. 观测病人腹水消长状况
- E. 每日液体摄入量不超过1500ml

(122~123 题共用题干)

患者，女，25岁。工人。发热、腹部不适、疲乏、恶心、食欲不振、尿色变黄6天。体检发现巩膜中度黄染，肝肋下2cm可扪及，质软，无明显触痛。外周血红细胞 $4.0 \times 10^{12} / L$ ，白细胞 $6.3 \times 10^9 / L$ ，血红蛋白 $138g / L$ ，

ALT2300U / L, 总胆红素 $84 \mu mol / L$ 。

122. 应首先考虑该患者为

- A. 败血症
- B. 钩体病
- C. 恙虫病
- D. 病毒性肝炎
- E. 急性胆道感染

123. 对明确诊断最故意义的检查项目是

- A. 血培养
- B. 外斐反应
- C. 钩体凝溶试验
- D. 肝炎病毒标志物检测
- E. B型超声波检查

(124~127 题共用题干)

初产妇，妊娠40周，临产6小时，宫口开大3cm；临产11小时，宫口开全，头先露，先露“0”，胎心正常。

124. 此产程属于

- A. 正常产程
- B. 潜伏期延长
- C. 活跃期延长
- D. 活跃期停滞
- E. 第二产程延长

125. 宫口开全已2小时，胎儿尚未娩出，产妇仍在屏气用力，此时，产程属于

- A. 正常
- B. 潜伏期延长
- C. 活跃期延长
- D. 活跃期停滞
- E. 第二产程延长

126. 阴道检查后记录为：头先露，先露“+1”，枕部在母体骨盆左侧，其胎方位为

- A. 枕左前
- B. 枕右前
- C. 枕左横
- D. 枕右横
- E. 枕左后

127. 阴道检查后，听胎心，胎心率为164次 / 分，应立即

- A. 吸氧
- B. 准备产钳手术
- C. 剖宫产术前准备
- D. 输液补充营养、体力

E. 滴注缩宫素加强宫缩

(128~129 題共用題干)

男, 59 岁, 開放性骨折合并感染, 体温在 39℃ 以上, 有時高下不一, 24 小時温差不超過 1℃, 持续 5 天不退, 脉搏 93 次 / 分, 呼吸 23 次 / 分, 查体: 口腔黏膜干燥, 左颊黏膜有一 0.2cm×0.2cm 溃疡面, 基底潮紅。

128. 该患者的体温热型是

- A. 回归热
- B. 间歇热
- C. 弛张热
- D. 稽留热
- E. 不规则热

129. 该患者测量体温、脉搏、呼吸的频率应為

- A. 每 1 小時 1 次
- B. 每 4 小時 1 次
- C. 每 6 小時 1 次
- D. 每 8 小時 1 次
- E. 每 12 小時 1 次

(130~131 題共用題干)

男, 28 岁, 体温 38.9℃, 在静脉滴注青霉素時, 忽然胸闷、面色苍白、四肢厥冷、血压下降。

130. 该患者也許是

- A. 发热反应
- B. 心脏病复发
- C. 发热引起脑缺氧
- D. 输液循环负荷過重
- E. 青霉素過敏性休克

131. 急救该病人的首选药物是

- A. 去甲肾上腺素
- B. 异丙肾上腺素

C. 0.1% 盐酸肾上腺素

- D. 呼吸兴奋剂
- E. 氯化可的松

(132~133 題共用題干)

男, 50 岁, 車祸致骨盆骨折, 現患者神志淡漠, 肢体湿冷、呼吸浅速, 血压 80 / 60mmHg, 脉搏 123 次 / 分, 尿量減少。

132. 此時患者的病理生理变化重要是

- A. 呼吸功能障碍
- B. 凝血功能障碍
- C. 心功能障碍
- D. 肾功能障碍
- E. 微循环功能障碍

133. 對该患者首要的护理措施是

- A. 卧床休息
- B. 石膏固定
- C. 手术复位
- D. 应用抗生素
- E. 补充血容量

(134~135 題共用題干)

男, 24 岁, 反复上腹痛 4 年, 常于秋冬換季時加重, 饥饿時加重, 餐後可缓和。

134. 应首先考虑该患者為

- A. 胃癌
- B. 胃溃疡
- C. 拾二指肠溃疡
- D. 慢性浅表性胃炎
- E. 慢性萎缩性胃炎

135. 為明确诊断应首先选择的检查是

- A. 纤维胃镜
- B. 腹部超声
- C. 胃肠钡餐
- D. 立位腹平片
- E. 胃液胃酸分析

【A1/A2 型題】

1. 原发性肝癌的疼痛特點是

- A. 钻顶样剧痛
- B. 持续性胀痛
- C. 阵发性绞痛
- D. 上腹部钝痛
- E. 刀割样剧痛

2. 自发性气胸的經典体现是

- A. 刺激性咳嗽
- B. 呼吸困难
- C. 胸闷、气促
- D. 胸痛
- E. 血压下降

3. 呼吸衰竭最先受损的部位是

- A. 大脑
- B. 肺
- C. 肝
- D. 心脏
- E. 肾

4. 护士在发给心力衰竭病人地高辛之前，应先数心率，若心率少于多少次则不能給药

- A. 100 次/分
- B. 80 次/分
- C. 70 次/分
- D. 60 次/分
- E. 50 次/分

5. 肺心病并发二氧化碳潴留的經典体现是

- A. 呼吸困难
- B. 发绀
- C. 肺功能下降
- D. 意识障碍
- E. 球結膜水肿

6. 對青少年痤疮的护理措施， 不對的的是

- A. 多吃清淡的食物
- B. 不吸烟、不饮酒
- C. 保持乐观情绪
- D. 保持皮肤清洁
- E. 挤净痤疮内容物

7. 良性前列腺增生的經典症状是

- A. 尿频
- B. 尿痛
- C. 進行性排尿困难
- D. 尿瀦留
- E. 血尿

8. 頭皮血腫患者，在抽吸出積血後應予以

- A. 熱敷
- B. 紅外照射
- C. 用力揉搓
- D. 切開引流
- E. 加壓包紮

9. 符合慢性胃炎臨床體現的是

- A. 上腹飽脹不適，餐後加重
- B. 長期上腹痛，餐後緩和
- C. 反酸、嘔吐、腹瀉
- D. 上腹部疼痛，向肩背部放射
- E. 貧血、消瘦

10. 確診二尖瓣狹窄最可靠的輔助檢查是

- A. 心電圖
- B. 胸部 X 線片
- C. 超聲心動圖
- D. 心導管檢查
- E. CT

11. 為了減輕傷口疼痛，子宮內膜異位症患者術後臥位應為

- A. 半臥位
- C. 頭低腳高位
- E. 頭高腳低位
- B. 去枕平臥位
- D. 側臥位

12. 軟組織化膿性感染中應予以隔離有接觸傳染性的是

- A. 疔
- B. 癰
- C. 急性蜂窩織炎
- D. 丹毒
- E. 急性淋巴管炎

13. 閉合性單處肋骨骨折的處理重點是

- A. 骨折對線
- B. 骨折對位

- C. 应用抗生素
- D. 功能锻炼
- E. 固定胸廓

14. 精神分裂症的临床症状一般没有

- A. 意识障碍
- B. 情感障碍
- C. 感知障碍
- D. 思维障碍
- E. 行为障碍

15. 急性病毒性肝炎初期最重要的治疗措施是

- A. 应用抗脂肪肝药物
- B. 高热量饮食，可以活动
- C. 卧床休息
- D. 抗病毒药物
- E. 保肝药物

16. 挤压面部“危险三角区”未成熟的疖，最严重的后果是

- A. 鼻部感染
- B. 化脓性海绵状静脉窦炎
- C. 面部肿胀
- D. 形成痈
- E. 留瘢痕

17. 新生儿出生时存在，后来逐渐消失的神经反射是

- A. 角膜反射
- B. 拥抱反射
- C. 结膜反射
- D. 瞳孔反射
- E. 平衡反射

18. 最危急的心律失常是

- A. 窦性心动过速
- B. 心房颤动
- C. 室上性心动过速
- D. 房室传导阻滞
- E. 心室颤动

19. 影响传染病流行过程的两个重要原因是

- A. 气温、雨量
- B. 社会制度、经济状况
- C. 地理位置、气候变化
- D. 生活习惯、文化老式

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/306035151212011002>