专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年贵州省凤冈县《执业药师之西药学专业二》考试必刷200题题库大全【各地真题】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.下列对甲状腺素应用的表述，错误的是

A：成人初始剂量25～50μg，一日1次

B：本类药起效迅速，24h达血药浓度高峰

C：可用于呆小病的治疗

D：左甲状腺素是主要替代治疗药，一般需终身替代

答案：B

2.以下不属于抗雌激素类药物的是

A：他莫昔芬

B：来曲唑

C：托瑞米芬

D：氟他胺

答案：D

3.西咪替丁的作用原理是()

A：阻断α受体

B：阻断H

C：阻断β受体

D：阻断H

答案：D

4.维A酸软膏治疗痤疮时，合理的用法是

A：一日一次，睡前使用

B：一日二次，早、晚使用

C：一日一次，晨起使用

D：一日一次，固定时间使用

答案：A

5.青霉素()

A：对G

B：抗菌作用强，对厌氧菌有效

C：对G

D：特别对铜绿假单胞菌有效

答案：C

6.30岁，农民，头昏乏力，粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白60g/L。诊断：钩虫感染，缺铁性贫血。

A：输血+注射右旋糖苷铁

B：驱钩虫

C：驱钩虫+口服铁剂

D：驱钩虫+注射右旋糖苷铁

答案：C

7.（2016年真题）属于钠通道阻滞剂的抗心律失常药是

A：利多卡因

B：硝酸甘油

C：索他洛尔

D：美托洛尔

答案：A

8.硫酸亚铁临床应用

A：失去药效

B：缺铁性贫血

C：急性中性粒细胞减少症

D：缺血性脑卒中

答案：B

9.属于胃黏膜保护剂的是()

A：胶体果胶铋

B：莫沙必利

C：胃蛋白酶

D：奥美拉唑

答案：A

10.促进钙剂吸收可选用

A：依降钙素

B：葡萄糖酸钙

C：阿仑膦酸钠

D：阿法骨化醇

答案：D

11.晚期前列腺癌（乳腺癌、卵巢癌患者禁用）可选用的药物是

A：戊酸雌二醇

B：缩宫素

C：垂体后叶素

D：他莫昔芬

答案：A

12.属于合成的麻醉性镇痛药的是

A: 美沙酮

B: 布洛芬

C: 吗啡

D: 可待因

答案：A

13.以下食物与华法林钠不存在相互作用的是

A: 洋葱

B: 红叶苋菜

C: 脱皮黄瓜

D: 菠菜叶

答案：C

14.患者，女，56岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式(控制饮食、增加运动)。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他丁片20mg/d治疗。若采用强化治疗，辛伐他汀片的最大日剂量是()。

A: 20mg

B: 100mg

C: 40mg

D: 80mg

答案：D

15.维生素B12主要用于治疗的疾病是

A: 再生障碍性贫血

B: 巨幼细胞性贫血

C：慢性失血性贫血

D：缺铁性贫血

答案：B

16.奈韦拉平的作用靶点是

A：HIV-1和HIV-2蛋白酶

B：脱氧核糖核酸聚合酶

C：神经氨酸酶

D：HIV-1反转录酶

答案：D

17.以下不属于呋塞米的不良反应的是

A：降低血糖

B：胃肠道反应

C：高尿酸血症

D：耳毒性

答案：A

18.对地高辛中毒出现严重心律失常者可静脉滴注

A：阿托品

B：苯妥英钠

C：利尿剂

D：氯化钾、葡萄糖注射液

答案：D

19.有肾功能不全史的患者解热镇痛应慎用布洛芬，其主要原因是用药后可能发生

A：急性肾衰竭

B: 重度肝损伤

C: 尿潴留和水肿

D: 过敏反应

答案：C

20.袢利尿药主要作用于髓袢升支粗段，利尿作用强，其代表药物是()

A: 依他尼酸

B: 布美他尼

C: 呋塞米

D: 托拉塞米

答案：C

21.属于孕激素类的是()

A: 甲地孕酮

B: 睾酮

C: 他莫昔芬

D: 己烯雌酚

答案：A

22.选择性地兴奋 β

A: 奈多罗米

B: 酮替芬

C: 扎鲁司特

D: 沙丁胺醇

答案：D

23.某患者因疾病在夜间有咳嗽症状，该患者可选择的药物是

A: 可待因

B：苯丙哌林

C：右美沙芬

D：喷托维林

答案：C

24.克拉霉素与阿呋唑嗪合用，阿呋唑嗪的血药浓度水平显著升高，这是因为克拉霉素抑制

A：CYP3A4

B：UGT287

C：p一糖蛋白

D：血浆蛋白

答案：A

25.对甲硝唑无效或禁忌的肠外阿米巴病患者可选用

A：氯喹

B：替硝唑

C：喹碘仿

D：依米丁

答案：A

26.胰岛素的不良反应有

A：高血糖高渗性昏迷

B：骨髓抑制

C：酮症酸中毒

D：低血糖昏迷

答案：D

27.匹维溴铵在使用中应注意

A：对食管有刺激性，需整片吞服

B：糖尿病患者避免使用

C：感染性腹泻早期无效，后期可辅助治疗

D：痉挛性麻痹与脑损伤的婴幼儿禁用

答案：A

28.患者，男，24岁，诊断为右睾丸非精原细胞瘤术后，治疗方案为依托泊苷+顺铂+博来霉素。

A：骨髓功能抑制者

B：心肝肾功能不全严重者

C：慢性胃炎

D：妊娠期妇女

答案：C

29.噻唑烷二酮类药物可降低

A：血红蛋白

B：血容量

C：女性骨折的风险

D：体重

答案：A

30.（2021年真题）属于阳离子型表面活性剂，可用于治疗咽喉炎的药物是（）e

A：西地碘

B：羟甲唑啉

C：氨溴索

D：度米芬

答案：D

31.（2016年真题）对血小板聚集及凝血机制无影响的药品是

A: 对乙酰氨基酚

B: 吲哚美辛

C: 罗非昔布

D: 阿司匹林

答案：A

32.属于β2受体激动剂的平喘药是()

A: 孟鲁司特

B: 噻托溴铵

C: 茶碱

D: 沙美特罗

答案：D

33.治疗血吸虫病的药物是()

A: 氯喹

B: 甲硝唑

C: 吡喹酮

D: 乙胺嗪

答案：C

34.对磺胺类药物过敏者可以选用的利尿剂是()

A: 布美他尼

B: 依托塞米

C: 乙酰唑胺

D: 依他尼酸

答案：D

35.通过抑制 α-葡萄糖苷酶，减少多糖水解为葡萄糖()

A: 阿卡波糖

B: 格列本脲

C: 艾塞那肽

D: 二甲双胍

答案：A

36.（2016年真题）属于长效 β2受体激动剂的平喘

A: 多索茶碱

B: 布地奈德

C: 沙丁胺醇

D: 沙美特罗

答案：D

37.抑制胃酸分泌作用的药物是

A: 枸橼酸铋钾

B: 莫沙必利

C: 奥关拉唑

D: 碳酸钙

答案：C

38.下列药物能抑制尿酸生成的是

A: 丙磺舒

B: 非布司他

C: 呋塞米

D: 秋水仙碱

答案：B

39.抑制胰岛素释放和组织对葡萄糖的利用，升高血糖的是()

A: 氢氯噻嗪

B: 螺内酯

C: 呋塞米

D: 氨苯蝶啶

答案：A

40.（2017年真题）减少钠离子内流而使神经细胞膜稳定,属于乙内酰脲类抗癫药的是（）

A: 苯巴比妥

B: 苯妥英钠

C: 加巴喷丁

D: 卡马西平

答案：B

41.以降低三酰甘油为主要治疗目标时，首选的调血脂药是

A: 瑞舒伐他汀

B: 依折麦布

C: 非诺贝特

D: 辛伐他汀

答案：C

42.下列药物中通过促进纤维蛋白溶解的药物是

A: 噻氯匹定

B: 尿嘧啶

C: 链激酶

D: 氨甲苯酸

答案：C

43.可与吸入性糖皮质激素合用的长效M胆碱受体阻断剂是

A：噻托溴铵

B：沙美特罗

C：多索茶碱

D：孟鲁司特

答案：A

44.可导致坏死性结肠炎的是

A：阿糖胞苷

B：利福平

C：甲氨蝶呤

D：β 受体阻断剂

答案：A

45.与吲达帕胺合用，可导致心律失常的是

A：多巴胺

B：拟交感药

C：胺碘酮

D：考来烯胺

答案：C

46.吸收后代谢成活性产物而发挥抗甲型和乙型流感病毒的前体药物是（）

A：金刚乙胺

B：扎那米韦

C：金刚烷胺

D: 奥司他韦

答案：D

47.呋塞米的利尿作用部位在()

A: 集合管

B: 肾小球

C: 远曲小管初段

D: 髓袢升支粗段

答案：D

48.多种抗眼部细菌感染制剂中常加入糖皮质激素，不能随意使用，应该在眼科医生、药师的密切监护下使用。如使用此类制剂，不应当超过

A: 3日

B: 10日

C: 7日

D: 5日

答案：B

49.适宜餐前整片(粒)吞服，不可咀嚼或压碎的抑酸剂是()。

A: 乳酸菌素

B: 泮托拉唑

C: 前列地尔

D: 雷尼替丁

答案：B

50.易透过血脑屏障用于治疗普通型奈瑟球菌脑脊髓膜炎的药物是

A: 复方新诺明

B: 磺胺多辛

C: 甲氧苄啶

D: 磺胺嘧啶

答案：D

51.主要用于控制疟疾症状的药物是

A: 吡喹酮

B: 乙胺嘧啶

C: 甲硝唑

D: 氯喹

答案：D

52.抢救糖尿病合并酮症酸中毒患者

A: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

B: 胰岛素皮下注射

C: 二甲双胍

D: 静脉用胰岛素

答案：D

53.显著降低糖尿病或肾病患者蛋白尿及微量蛋白尿的抗高血压药物是

A: 血管紧张素转换酶抑制剂

B: 血管紧张素Ⅱ受体阻断剂

C: 烟酸

D: 贝丁酸类

答案：B

54.奎尼丁对心肌细胞膜的作用主要是()

A: 促进 K

B: 促进Ca

C: 抑制Na

D: 抑制Ca

答案：C

55.促进尿酸排泄的抗痛风代表药物是

A: 别嘌醇

B: 扑热息痛

C: 塞来昔布

D: 丙磺舒

答案：D

56.卡马西平适用于

A: 神经源性尿崩症

B: 原发性失眠

C: 急慢性脑功能不全

D: 内分泌失调引起的失眠

答案：A

57.下列关于吉非替尼的描述，错误的是

A: 用药期间应监测肝肾功能

B: 常见典型不良反应是皮肤毒性、腹泻

C: 用于治疗经含有铂类或多西他赛治疗失败的晚期非小细胞肺癌患者

D: 与传统化疗药存在交叉耐药

答案：D

58.延长动作电位时程的广谱抗心律失常药物是()

A: 美西律

B: 奎尼丁

C: 维拉帕米

D: 胺碘酮

答案：D

59.下述种类的利尿药中，利尿作用最强的是

A: 留钾利尿剂

B: 袢利尿剂

C: 碳酸酐酶抑制剂

D: 噻嗪类利尿剂

答案：B

60.频繁、剧烈无痰干咳患者宜选用

A: 可待因

B: 右美沙芬

C: 地关索酯

D: 喷托维林

答案：A

61.应用华法林抗凝过程中，出现严重出血时，可应用急救的药物的是

A: 维生素K1

B: 维生素B1

C: 维生素K3

D: 维生素K4

答案：A

62.下述利尿药中，不宜与氨基糖苷类抗生素合用的是

A: 氢氯噻嗪

B：螺内酯

C：氨苯蝶啶

D：呋塞米

答案：D

63.（2017年真题）在痛风急性期禁用的药物是（）

A：别嘌醇

B：布洛芬

C：秋水仙碱

D：舒林酸

答案：A

64.伐昔洛韦口服后在肝脏水解为

A：西多福韦

B：阿昔洛韦

C：更昔洛韦

D：喷昔洛韦

答案：B

65.下述属于5-HT

A：莫沙必利

B：多潘立酮

C：甲氧氯普胺

D：伊托必利

答案：A

66.（2015年真题）属于多巴胺D2受体阻断剂的是（）。

A：法莫替丁

B: 氯苯那敏

C: 奥美拉唑

D: 多潘立酮

答案：D

67.属于二氢叶酸还原酶抑制剂的抗肿瘤药物是

A: 甲氨蝶呤

B: 顺铂

C: 阿糖胞苷

D: 环磷酰胺

答案：A

68.神经毒性较严重的是

A: 卡铂

B: 奥沙利铂

C: 顺铂

D: 亚叶酸钙

答案：B

69.可引起巨幼红细胞性贫血的药物是()

A: 氯喹

B: 乙胺嘧啶

C: 甲氟喹

D: 伯氨喹

答案：B

70.下列唯一被批准用于临床的选择性胆固醇吸收抑制剂是

A: 瑞舒伐他汀

B：依折麦布

C：盐酸

D：非诺贝特

答案：B

71.合用伊立替康可减弱作用效果的是

A：顺铂

B：米库氯铵

C：琥珀胆碱

D：依托泊苷

答案：B

72.第3代二磷酸腺苷P2Y12受体阻断剂是

A：噻氯匹定

B：氯吡格雷

C：替罗非班

D：替格雷洛

答案：D

73.以下选项中，不属于沙美特罗的适应证的是()

A：慢性支气管炎伴气道痉挛的治疗

B：夜间哮喘的预防和维持治疗

C：缓解支气管痉挛的急性症状

D：肺气肿伴气道痉挛的治疗

答案：C

74.下列不属于凝血因子X抑制剂的是

A：阿哌沙班

B: 华法林

C: 利伐沙班

D: 磺达肝癸钠

答案：B

75.以脉冲方式从垂体中释放出来，在血液循环中的半衰期只有7～12min的药物是

A: 促性腺激素

B: 醋酸去氨加压素

C: 催乳素

D: 促肾上腺皮质激素

答案：D

76.主要用于糖尿病，特别是1型糖尿病的治疗的药物是()

A: 胰岛素

B: 二甲双胍

C: A和B均无效

D: 磺酰脲类

答案：A

77.精神紧张、情绪恐惧所致的失眠

A: 氟西泮

B: 夸西泮

C: 氯美扎酮

D: 谷维素

答案：C

78.患者，男，41岁。有吸烟史，间断少量饮酒。因“嗳气、反酸、上腹部疼痛”就诊。经查，医师诊断为“反流性食管炎”此时应给予治疗的药物是

A：雷尼替丁

B：昂丹司琼

C：泮托拉唑

D：东莨菪碱

答案：A

79.（2016年真题）可导致神经毒性（四肢麻木、腱反射消失）的抗肿瘤药是

A：长春新碱

B：博来霉素

C：紫杉醇

D：柔红霉素

答案：A

80.长期服用呋塞米易发生的不良反应是（）

A：高钠血症

B：高氯血症

C：低钾血症

D：低尿酸血症

答案：C

81.早产儿、新生儿禁用()

A：利福平

B：夫西地酸

C：氯霉素

D: 四环素可的松

答案：C

82.阻止胞苷酸转化为脱氧胞苷酸

A: 阿糖胞苷

B: 氟尿嘧啶

C: 羟基脲

D: 甲氨蝶呤

答案：C

83.抑制DNA回旋酶和拓扑异构酶IV的抗菌药是

A: 甲硝唑

B: 苯唑西林

C: 四环素

D: 喹诺酮类

答案：D

84.（2015年真题）我国研制的没有“金鸡纳”反应的抗疟药是（）。

A: 伯氯喹

B: 氯喹

C: 青蒿素

D: 奎宁

答案：C

85.（2021年真题）用于验光配镜屈光度检查前散瞳的药物是（）

A: 聚乙二醇滴眼液

B: 雷珠单抗注射液

C: 硫酸阿托品眼用凝胶

D: 毛果芸香碱滴眼液

答案：C

86.与林可霉素类抗菌药物存在交叉耐药性的是

A: 四环素类

B: 大环内酯类

C: 头孢菌素类

D: 氨基糖苷类

答案：B

87.长期用药易发生低镁血症的药物是（）

A: 奥美拉唑

B: 胶体果胶铋

C: 复方碳酸钙

D: 替普瑞酮

答案：A

88.（2015年真题）使用强心苷的心力衰竭患者，不宜选用的药品是（）。

A: 果糖

B: 氯化钙

C: 硫酸镁

D: 氯化钾

答案：B

89.（2021年真题）属于微管蛋白活性制剂的抗肿瘤药物是（）

A: 长春新碱

B：来曲唑

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/306115213055011030