

# 癲癇患者的精神異常行為

---

# 概述

---

## □ 癫痫

癫痫是由于大脑细胞异常过度放电而引起的一过程性、反复发作的临床综合征

---

# 概述

---

- 癫痫性精神病障碍 又称癫痫所致精神障碍。原发性及症状性癫痫均可发生精神障碍，癫痫患者在癫痫发作前，发作时，发作后或发作间歇期，表现出的精神活动异常，有的患者甚至表现为持续性精神障碍。由于累及的部位及病理生理改变的不同，症状表现各异。
-

# 临床表现

---

- 发作前的精神障碍
  - 发作时的精神障碍
  - 发作后的精神障碍
  - 发作间期的精神障碍
-

# 发作前的精神障碍

---

发作前的精神障碍是指部分病人在癫痫发作前出现焦虑、紧张、易激惹、冲动、抑郁、淡漠或一段时间的愚笨或自主神经功能紊乱。

**前驱症状：**发作前数小时数天内的症状

**先兆：**临床发作的开始。

先兆对决定癫痫源的起始部位有很大的价值。

---

# 发作时的精神障碍

---

- 知觉障碍
- 记忆障碍
- 思维障碍
- 情感障碍

- 自主神经功能障碍
  - 自动症
  - 朦胧状态
  - 自动症发作持续状态
-

# 发作时的精神障碍

---

## □ 知觉障碍

- 视觉发作
  - 听觉发作
  - 嗅觉发作
  - 味觉发作
-

# 发作时的精神障碍

---

## □ 记忆障碍

病人可体验到一种记忆障碍，例如对某些熟悉的名字，突然不能回忆，或在一个新的环境中有一种似乎过去早已体验过的感觉，称为熟悉感（又称似曾相识感）或在一个熟悉的环境中好像有完全陌生的感觉，称为陌生感（又称旧事如新感）。

---



# 发作时的精神障碍

---

## □ 思维障碍

可有思维中断，病人感觉自己的思潮突然停止，或有强迫性思维，病人的思潮不受自己意愿的支配，强制性的大量涌现在脑内，并常互相缺乏联系。这种症状可能是由于额叶病灶所致。还有强迫性回忆，有人认为是和颞叶外上侧面的异常放电有关。

---

# 发作时的精神障碍

---

## □ 情感障碍

可有恐怖、抑郁、喜悦及愤怒发作。恐怖发作是情绪发作中做常见的一种，程度可轻可重，内容不一。发作性的情感障碍无明星精神因素，突然发病，时间短暂，反复出现同样的临床症状，有时发作常与错觉幻觉同事存在。

---

# 发作时的精神障碍

---

## □ 自主神经功能障碍

是指单独出现的自主神经发作，临床可见头痛、头胀、腹痛、恶心、流涎、呕吐、心悸、脉快、呼吸急促或暂停、出汗、面色苍白或潮红、体温改变等症状。这些以单独出现的自主神经发作较少，大多和其他发作合并出现，并常在复杂部分性发作之前出现。其精神运动性发作持续时间多较短，常为数秒、数分钟，偶见达数小时者。

---

# 发作时的精神障碍

---

## □ 自动症

### □ 核心症状为意识障碍

整个发作过程归纳如下：

**a. 发作先兆：**多数病人发作有先兆。临床表现为躯体感觉异常或出现错觉、幻觉、感知综合障碍、思维紊乱等。

**b. 发作过程：**突然开始。患者意识模糊，常做出一些令人难以理解的自动性动作，有时是较简单的动作，如伸舌、舔唇、咀嚼、吞咽、咂嘴、摸索、走动、奔跑、点头、旋转等。有的则是较复杂的动作，如脱衣、穿衣、解扣、系扣、梳头、撕毁衣物、搬动物体、整理床铺等。一些病人在自动症发作后仍继续发作前的工作，如继续走路、骑车等。

---

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/307043003105006150>