

2024 年河北省博野县《执业药师之西药学专业二》考试完整版（名师推荐）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2018 年真题）关于钙通道阻滞剂（CCB 类）药物的说法，错误的是（ ）

- A: 对既往有脑卒中病史的老年高血压患者, 优先选择 CCB 类降压药
- B: CCB 类对冠状动脉痉挛所致的变异型心绞痛无效
- C: 红霉素可显著增加硝苯地平或非洛地平的生物利用度
- D: CCB 类主要扩张小动脉, 对小静脉和毛细血管作用较小, 可导致下肢或脚踝水肿

答案: B

2. 不属于糖皮质激素对代谢的影响的是

- A: 增高肝糖原
- B: 提高蛋白质的分解代谢
- C: 升高血糖
- D: 增强钙离子的吸收

答案: D

3. 属于长效 β

- A: 多索茶碱
- B: 布地奈德
- C: 沙美特罗
- D: 沙丁胺醇

答案: C

4. 治疗血吸虫病的药物是()

- A: 甲硝唑
- B: 氯喹
- C: 乙胺嗪
- D: 吡喹酮

答案: D

5. 属于雌激素类的是()

- A: 睾酮
- B: 己烯雌酚
- C: 甲地孕酮
- D: 他莫昔芬

答案: B

6. 制霉菌素属于

- A: 丙烯胺类
- B: 吗啉类
- C: 唑类
- D: 抗生素类

答案: D

7. 锥体外系疾病、亨廷顿病者禁用的药物是

- A: 吗氯贝胺
- B: 氟西汀
- C: 吡拉西坦
- D: 文拉法辛

答案: C

8. (2018 年真题) 对磺胺类药物过敏者可以选用的利尿剂是 ()

- A: 依托塞米
- B: 依他尼酸
- C: 布美他尼
- D: 乙酰唑胺

答案: B

9. 阿片类镇痛药与硫酸镁合用，可增强中枢抑制，导致不良反应是

- A: 躁狂
- B: 便秘
- C: 胆绞痛
- D: 低血压

答案: D

10. 属于 M 受体阻断剂的药物是

- A: 奥布卡因
- B: 布林佐胺
- C: 拉坦前列素
- D: 阿托品

答案: D

11. (2018 年真题) 关于甲硝唑作用特点和用药注意事项的说法，错误的是 ()

- A: 甲硝唑代谢产物可能使尿液颜色加深
- B: 甲硝唑有致突变和致畸作用
- C: 甲硝唑属于时间依赖型抗菌药物
- D: 甲硝唑半衰期比奥硝唑短

答案：C

12. 患者，男，43 岁，诊断为感染性心内膜炎，血液细菌培养为草绿色链球菌，拟用青霉素 G 和下列其中一药合用，应合用的药物是

- A: 阿莫西林
- B: 庆大霉素
- C: 红霉素
- D: 奈替米星

答案：B

13. （2021 年真题）用于验光配镜屈光度检查前散瞳的药物是（）

- A: 毛果芸香碱滴眼液
- B: 硫酸阿托品眼用凝胶
- C: 聚乙二醇滴眼液
- D: 雷珠单抗注射液

答案：B

14. 用量过大可引起低血糖反应的药物是

- A: 甲状腺素
- B: 糖皮质激素
- C: 胰岛素
- D: 依替膦酸二钠

答案：C

15. 厌氧菌引起的肺炎宜选用（）

- A: 万古霉素
- B: 阿奇霉素
- C: 克林霉素

D: 氟康唑

答案: C

16. 氨苯蝶啶可导致的不良反应是

A: 高钾血症

B: 低氯碱血症

C: 低血糖

D: 血小板增多

答案: A

17. 治疗弥散性血管内凝血(DIC)宜选用()

A: 达比加群酯

B: 肝素

C: 叶酸

D: 阿司匹林

答案: B

18. (2018 年真题) 可抑制粒细胞浸润和白细胞趋化,用于痛风急性发作的药物是()

A: 秋水仙碱

B: 非布索坦

C: 苯溴马隆

D: 别嘌醇

答案: A

19. 与甘露醇相比,甘油果糖具有的特点不包括

A: 起效更快,维持作用时间较长

B: 利尿作用小

C: 可为患者提供一定的能量

D: 对患者电解质的平衡无明显影响

答案: A

20. 适用于 IIa、IIb 型及家族性杂合子的高脂蛋白血症，但有特殊臭味和刺激性的是

A: 考普罗布

B: 洛伐他汀

C: 考来烯胺

D: 烟酸

答案: C

21. (2021 年真题) 影响熊去氧胆酸的吸收，不宜同时服用的药物 ()

A: 双歧杆菌三联活菌

B: 利那洛肽

C: 昂丹司琼

D: 氢氧化铝

答案: D

22. 伐昔洛韦口服后在肝脏水解为

A: 西多福韦

B: 更昔洛韦

C: 阿昔洛韦

D: 喷昔洛韦

答案: C

23. 强心苷中毒引起的室性心律失常，治疗应首选的药物是

A: 普罗帕酮

- B: 丙吡胺
- C: 苯妥英钠
- D: 普萘洛尔

答案: C

24. 在体内不易蓄积,适用于老年和肾功能不全患者的胰岛素促泌剂类降糖药是 ()

- A: 利拉鲁肽
- B: 瑞格列奈
- C: 罗格列酮
- D: 艾塞那肽

答案: B

25. 利巴韦林最主要的不良反应是

- A: 听力异常
- B: 溶血性贫血
- C: 头痛
- D: 味觉异常

答案: B

26. 对抗胰岛素降血糖作用的药物是

- A: 蛋白同化激素
- B: 甲状腺素
- C: 磺胺类药
- D: 口服降血糖药

答案: B

27. 口沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下,请结合问题作答。

- A: 从 ACEI 转换为沙库巴曲缬沙坦时, 应停用 ACEI 36 小时后方可转换
- B: 轻、中度肝功能损害患者可使用沙库巴曲缬沙坦
- C: 沙库巴曲缬沙坦不能与阿替洛尔、吲哚美辛或西咪替丁合用
- D: 轻、中度肾功能不全患者可使用沙库巴曲缬沙坦

答案: C

28. 对鞭虫无效的药物是()。

- A: 甲硝唑
- B: 噻嘧啶
- C: 吡喹酮
- D: 阿苯达唑

答案: B

29. 关于甲硝唑作用特点和用药注意事项的说法错误的是()

- A: 甲硝唑属于时间依赖型抗菌药物
- B: 甲硝唑半衰期比奥硝唑短
- C: 甲硝唑代谢产物可能使尿液颜色加深
- D: 甲硝唑有致突变和致畸作用

答案: A

30. 适应证为仅用于治疗失眠的药物是

- A: 氟西汀
- B: 卡马西平
- C: 地西泮
- D: 佐匹克隆

答案: D

31. 兰索拉唑用于治疗胃及十二指肠溃疡的机制是

- A: 中和胃酸，升高胃内 pH
- B: 阻断 H₂ 受体
- C: 抑制 H⁺, K⁺-ATP 酶
- D: 保护胃黏膜

答案：C

32. (2015 年真题) 属于雌激素受体阻断剂的抗肿瘤药是 ()。

- A: 阿那曲唑
- B: 丙酸睾酮
- C: 他莫昔芬
- D: 炔雌醇

答案：C

33. (2015 年真题) 不属于抗乙型肝炎病毒的药品是 ()。

- A: 泛昔洛韦
- B: 拉米夫定
- C: 恩替卡韦
- D: 干扰素

答案：A

34. 下述关于抗皮肤寄生虫感染药物的描述中，不正确的是

- A: 林旦是杀灭疥虫的有效药物，但不能灭虱卵
- B: 克罗米通具有局部麻醉作用
- C: 升华硫具有杀灭细菌、真菌及杀虫的作用
- D: 苯甲酸苄酯高浓度可杀灭疥虫

答案：A

35. 利多卡因的电生理作用错误的是

- A: 使传导减慢
- B: 明显影响动作电位 0 相
- C: 缩短复极时间
- D: 提高心室颤动阈值

答案：B

36. 通过促进组织对葡萄糖的摄取和利用发挥作用()

- A: 阿卡波糖
- B: 二甲双胍
- C: 格列本脲
- D: 艾塞那肽

答案：B

37. 维持和调节腹膜透析液渗透压的主要物质的是

- A: 果糖
- B: 维生素
- C: 脂肪乳
- D: 葡萄糖

答案：D

38. 可作为心血管不良事件一级和二级预防的药物是()

- A: 塞来昔布
- B: 阿司匹林
- C: 双氯芬酸
- D: 对乙酰氨基酚

答案：B

39. 患者，女，30 岁。近期出现乏力、心动过速，考虑为“甲亢”，遵医嘱服用药物后出现皮疹或皮肤瘙痒及白细胞减少的是

- A: 丙硫氧嘧啶
- B: 左甲状腺素
- C: 甲巯咪唑
- D: 地塞米松

答案：C

40. 为碱性染料，能抑制革兰阳性菌和少数革兰阴性菌繁殖，对人无害、无刺激的消毒防腐药是

- A: 依沙吡啶
- B: 氯己定
- C: 聚维酮碘
- D: 过氧乙酸

答案：A

41. 对钩虫皮下组织的超微结构破坏严重，导致细胞核消失或破坏、线粒体消失，对其肠管中心层线粒体等结构均有破坏，产生驱虫作用的药物是

- A: 葡萄糖酸锑钠
- B: 伯氨喹
- C: 三苯双脒
- D: 氯硝柳胺

答案：C

42. 不干扰血小板因子IV和血小板，致血小板减少症风险低，血浆半衰期 21 小时，极少引起出血的抗凝血药是()。

- A: 阿哌沙班
- B: 磺达肝葵钠
- C: 水蛭素
- D: 依诺肝素

答案：B

43. 对蛔虫、蛲虫、钩虫、鞭虫感染有良效的是()

- A: 噻嘧啶
- B: 哌嗪
- C: 甲苯咪唑
- D: 氯硝柳胺

答案：C

44. 紧急降低眼压首选的药物是

- A: 拟 M 胆碱药
- B: 碳酸酐酶抑制剂
- C: β -受体阻断剂
- D: 20%甘露醇

答案：D

45. 属于抑酸药的是()

- A: 莫沙必利
- B: 奥美拉唑
- C: 胶体果胶铋
- D: 胃蛋白酶

答案：B

46. 使用呋塞米时，较少发生耳毒性的情况是

- A: 同时使用氨基糖苷类药物
- B: 口服方式给药
- C: 快速静脉输注给药
- D: 频繁静脉输注给药

答案：B

47. (2017 年真题) 属于选择性 5-HT₄ 受体激动剂, 促进乙酰胆碱释放的促胃肠动药是 ()

- A: 甲氧氯普胺
- B: 莫沙必利
- C: 昂丹司琼
- D: 多潘立酮

答案：B

48. 神经垂体功能不足引起的中枢性尿崩症具有良好抑制作用的药物是

- A: 促性腺激素
- B: 促肾上腺皮质激素
- C: 醋酸去氨加压素
- D: 催乳素

答案：C

49. 轻度阻滞 Na⁺通道的药物是

- A: 胺碘酮
- B: 普萘洛尔
- C: 普鲁卡因胺
- D: 利多卡因

答案：D

50. 可抑制花生四烯酸转化为白三烯()

- A: 阿达帕林
- B: 维 A 酸
- C: 异维 A 酸
- D: 过氧苯甲酰

答案: A

51. 患者，女，49 岁，间断上腹部饱胀、恶心 1 年。患者 1 年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药（具体不详）治疗后症状好转。2 个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部 B 超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3 次/日。

- A: 对化疗所致的呕吐有效
- B: 对泌乳素的分泌无影响
- C: 无心脏不良反应
- D: 可作为术后预防呕吐的常规用药

答案: B

52. 以下关于睾酮替代治疗的描述，错误的是

- A: 长期应用高剂量雄激素注意监测电解质、心功能与肝功能
- B: 最好选择能模拟睾酮生理分泌节律的药物
- C: 在补充雄激素前，应常规进行前列腺直肠指检
- D: 丙酸睾酮应采用静脉注射

答案: D

53. 同时具有短效和长效双时相)作用的胰岛素/胰岛素类似物是()

- A: 精蛋白锌胰岛素注射液
- B: 甘精胰岛素注射液

C: 预混胰岛素注射液

D: 普通胰岛素注射液

答案: C

54. 糖皮质激素对血液系统的影响不包括

A: 减少淋巴细胞

B: 提高纤维蛋白原浓度

C: 使红细胞含量增加

D: 使血小板数量下降

答案: D

55. β -内酰胺酶抑制剂的抑酶活性由强到弱的顺序是 ()

A: 舒巴坦>他唑巴坦>克拉维酸

B: 他唑巴坦>克拉维酸>舒巴坦

C: 他唑巴坦>舒巴坦>克拉维酸

D: 舒巴坦>克拉维酸>他唑巴坦

答案: B

56. 可加速硝基咪唑类药物清除，使血药浓度下降的是

A: 奥硝唑+乙醇

B: 甲硝唑+乙醇

C: 替硝唑+华法林

D: 替硝唑+苯巴比妥

答案: D

57. 甲氨蝶呤主要用于

A: 慢性粒细胞性白血病

B: 儿童急性白血病

C: 室管膜瘤

D: 神经母细胞瘤

答案: B

58. 患者女性，30 岁。以肺结核收治入院，给予抗结核治疗，链霉素肌肉注射后，10 分钟后患者出现头晕、耳鸣、乏力、呼吸困难等症状，继而出现意识模糊、晕倒、血压下降、心律失常等症状。

A: 利多卡因

B: 胺碘酮

C: 葡萄糖

D: 葡萄糖酸钙

答案: D

59. 临床上最常用的内分泌治疗药物是

A: 他莫昔芬

B: 氨氯米特

C: 雌激素

D: 雄激素

答案: A

60. 诱导肝微粒体酶，加速皮质激素和雌激素代谢的是()

A: 异烟肼

B: 链霉素

C: 利福平

D: 乙胺丁醇

答案: C

61. 苯妥英钠血药浓度超过多少可出现中毒症状

- A: 5 $\mu\text{g/ml}$
- B: 10 $\mu\text{g/ml}$
- C: 2 $\mu\text{g/ml}$
- D: 20 $\mu\text{g/ml}$

答案：D

62. 兼有抑菌作用的鼻用减充血剂是（）

- A: 羟甲唑啉鼻喷剂
- B: 赛洛唑啉滴鼻液
- C: 麻黄碱滴鼻液
- D: 呋麻滴鼻液

答案：D

63. 一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

- A: 口服补液盐
- B: 洛哌丁胺
- C: 蒙脱石
- D: 双歧杆菌三联活菌

答案：B

64. 下列对甲状腺素应用的表述，错误的是

- A: 可用于呆小病的治疗
- B: 成人初始剂量 25~50 μg ，一日 1 次
- C: 左甲状腺素是主要替代治疗药，一般需终身替代
- D: 本类药起效迅速，24h 达血药浓度高峰

答案：D

65. 口服索他洛尔作为抗心律失常药，其疗效和不良反应发生率均呈剂量依赖性，具有最佳获益风险比的用法是一天两次，一次

A: 160mg

B: 40mg

C: 80mg

D: 120mg

答案：D

66. 属于白三烯受体阻断剂的平喘药物是

A: 异丙托溴铵

B: 沙丁胺醇

C: 孟鲁司特

D: 茶碱

答案：C

67. 有关维生素 K 的描述，错误的是

A: 天然维生素 K 为脂溶性

B: 对于应用链激酶所致出血有特效

C: 参与凝血因子的合成

D: 维生素 K

答案：B

68. 氨曲南的作用特点不包括

A: 低毒，与青霉素类及头孢菌素类无交叉过敏

B: 时间依赖性抗菌药物

C: 血浆半衰期较短

D: 可用于治疗脑膜炎

答案：D

69. 铁剂用于治疗

- A: 再生障碍性贫血
- B: 溶血性贫血
- C: 小细胞低血红蛋白性贫血
- D: 巨幼细胞贫血

答案：C

70. 可以引起低钾血症和低镁血症，增加洋地黄中毒危险的是

- A: 胺碘酮
- B: 呋塞米
- C: 硫酸镁
- D: 克拉霉素

答案：B

71. 干扰核酸生物合成的抗恶性肿瘤药是

- A: 多柔比星
- B: 5-氟尿嘧啶
- C: 环磷酰胺
- D: 吉非替尼

答案：B

72. 患者，女，66 岁，5 天前无明显诱因出现发热，最高 39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗 4 日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38. 8℃，R21 次，BP110 / 70mmHg，HR110 次 / 分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞 $13.4 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞 82. 1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁 0. 59，每 6 小时一次。

- A: 氟康唑是肝药酶诱导剂
- B: 氟康唑对曲霉菌有效
- C: 氟康唑首次使用不需给予负荷剂量
- D: 氟康唑用于治疗侵袭性念珠菌感染

答案：D

73. 临床首选用于治疗土拉菌病和鼠疫的抗生素为()

- A: 奈替米星
- B: 链霉素
- C: 阿米卡星
- D: 异帕米星

答案：B

74. 属于抗甲状腺药的是

- A: 左甲状腺素
- B: 醋酸去氨加压素
- C: 生长抑素
- D: 甲巯咪唑

答案：D

75. 洛伐他汀的作用是()

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 主要影响胆固醇吸收
- B: 影响脂蛋白合成、转运及分解
- C: 主要影响胆固醇合成
- D: 主要影响甘油三酯合成

答案：C

76. 阿托品对眼部的作用特点是()

- A: 扩瞳，调节麻痹
- B: 缩瞳，调节麻痹
- C: 缩瞳，降低眼压
- D: 扩瞳，降低眼压

答案：A

77. 患者，男，60岁，诊断为冠心病，经皮冠状动脉介入术置入支架。医生给予氯吡格雷、阿司匹林抗血小板治疗。

- A: 兰索拉唑
- B: 艾司奥美拉唑
- C: 右兰索拉唑
- D: 奥美拉唑

答案：C

78. 奎尼丁对心肌细胞膜的作用主要是

- A: 抑制 Ca^{2+} 外流
- B: 促进 Ca^{2+} 内流
- C: 促进 K^{+} 外流
- D: 抑制 Na^{+} 内流

答案：D

79. 下述质子泵抑制剂中对氯吡格雷疗效影响最小的是()

- A: 兰索拉唑
- B: 泮托拉唑
- C: 奥美拉唑
- D: 埃索美拉唑

答案：B

80. 抗血小板药西洛他唑属于

- A: 磷酸二酯酶抑制剂
- B: 整合素受体阻断剂
- C: 维生素 K 拮抗剂
- D: 二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂

答案：A

81. (2017 年真题) 可用于吗啡中毒解救的药物是 ()

- A: 苯甲酸钠咖啡因
- B: 氟马西尼
- C: 纳洛酮
- D: 阿托品

答案：C

82. 治疗立克次体感染选用

- A: 多西环素
- B: 庆大霉素
- C: 磺胺嘧啶
- D: 红霉素

答案：A

83. 以下关于硫酸阿托品眼用凝胶的叙述，不正确的是

- A: 用于虹膜睫状体炎
- B: 前列腺肥大病人慎用
- C: 青光眼禁用
- D: 为散瞳药

答案：B

84. 为避免继发真菌感染，使用后应立即漱口的药物是

- A: 孟鲁司特片
- B: 羧甲司坦口服液
- C: 布地奈德福莫特罗吸入剂
- D: 沙丁胺醇气雾剂

答案：C

85. 典型不良反应为恶心、呕吐、肾毒性和耳毒性的是

- A: 顺铂
- B: 奥沙利铂
- C: 亚叶酸钙
- D: 卡铂

答案：A

86. 用青霉素治疗梅毒、钩端螺旋体病时能够出现寒战、咽痛、心率加快等症状，其原因可能是大量病原体被杀灭后出现的全身性反应，这种反应称为

- A: 吉海反应
- B: 瑞夷综合征
- C: 青霉素脑病
- D: 金鸡纳反应

答案：A

87. 下列哪种疼痛不用吗啡治疗

- A: 胆绞痛及肾绞痛

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 急性锐痛

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/307065146052010024>