

2024广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心招聘笔试冲刺题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、颈椎压缩性骨折合并脱位最先选择的治疗方法是（ ）。

- ☐ A. 手法复位，石膏外固定
- ☐ B. 颌枕带牵引
- ☐ C. 两桌复位法
- ☐ D. 颅骨牵引
- ☐ E. 切开复位内固定

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

2、1岁患儿，10月份患腹泻粪便呈水样或蛋花汤样，无腥臭味，有少量黏液但无脓血，有脱水征。考虑其病原体是（ ）。

- ☐ A. 金黄色葡萄球菌
- ☐ B. 致病性大肠杆菌
- ☐ C. 白色念珠菌
- ☐ D. 黏附性大肠杆菌
- ☐ E. 肠道或呼吸道病毒

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

3、关于PCR技术,下列哪种叙述是错误的？（ ）

- ☐ A. 是一种有细胞的分子克隆技术
- ☐ B. 是一种DNA扩增技术
- ☐ C. 具有快速、灵敏和特异性强等特点
- ☐ D. 可用于病毒DNA片段的检测
- ☐ E. 也可用于细菌等微生物DNA片段的检测

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

4、动脉导管完全闭合绝大多数发生于（ ）。

- ☐ A. 5个月内
- ☐ B. 3个月内
- ☐ C. 6个月内
- ☐ D. 9个月内
- ☐ E. 1岁以内

『正确答案』

E

『答案解析』

暂无解析。

5、不符合脑膜炎奈氏菌送检标本的采集原则是（ ）。

- ☐ A. 采集标本注意无菌操作
- ☐ B. 采集的标本要立即送检，并保温保湿
- ☐ C. 标本送检中要保持低温和干燥条件
- ☐ D. 根据该病原菌主要的存在部位取材
- ☐ E. 采集标本应在使用抗菌药物之前

『正确答案』

C

『答案解析』

标本采集送检原则编辑1、采集标本应注意无菌操作,避免细菌污染。2、根据患者病期不同,采集不同部位标本。3、采集标本应在使用抗菌素之前,否则应在分离培养时加入药物拮抗剂,在采集时不可用消毒剂,必要时可用生理盐水冲洗,擦干后取材。4、尽可能采集病变明显部位的材料。5、标本必须新鲜,采集后及早送检。6、送检过程种多数菌需冷藏送运,少数不耐寒细菌需保温,粪便标本常置于甘油缓冲盐水保存液中。

6、抗高血压药最合理的联合是（ ）。

- ☐ A. 氢氯噻嗪+硝苯地平+普萘洛尔
- ☐ B. 肼屈嗪+哌唑嗪+普萘洛尔
- ☐ C. 肼屈嗪+地尔硫革+普萘洛尔
- ☐ D. 氢氯噻嗪+拉贝洛尔+普萘洛尔
- ☐ E. 硝苯地平+哌唑嗪+可乐定

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

7、类白血病反应的特点是（ ）。

- ☐ A. 骨髓中幼稚粒细胞增高
- ☐ B. 外周血出现幼稚细胞，NAP活性增高
- ☐ C. 外周血白细胞 $>50 \times 10^9/L$
- ☐ D. 脾脏显著肿大
- ☐ E. 外周血嗜碱性嗜酸粒细胞增高

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

8、下述均为肾损伤手术探查的适应证，哪项除外？（ ）

- ☐ A. 开放性肾损伤
- ☐ B. 同时合并腹腔脏器损伤
- ☐ C. 腰、腹部肿块增大，局部症状明显
- ☐ D. 全程肉眼血尿
- ☐ E. 经抗休克处理后，症状未见好转

『正确答案』

D

『答案解析』

肾损伤多能经非手术疗法治愈，但在以下情况则需手术治疗：①经积极的抗休克治疗后，生命体征仍未改善，提示继续有内出血；②血尿逐渐加重，血红蛋白和血细胞比容继续降低；③腰、腹部肿块明显增大；④开放性肾损伤；⑤合并腹腔脏器损伤者；⑥经长期的非手术治疗，仍反复发生血尿，感染或高血压者。D项，根据全程肉眼血尿很难判断肾损伤的严重程度，不能作为肾损伤开放手术的指征。当肾实质深度裂伤，且破入肾盂肾盏时，引起出血，血液流入肾盂肾盏，导致明显血尿。当输尿管断裂、输尿管被血块堵塞、肾盂广泛撕裂、肾血管严重损伤时，血尿却并不明显。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/30715014210006064>