

2024 年河北省北戴河区《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题真题题库含答案【考试直接用】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 可用于治疗甲癣、足癣、体癣和股癣等浅表性真菌感染的药品是()。

- A: 两性霉素 B
- B: 氟胞嘧啶
- C: 伏立康唑
- D: 特比萘芬

答案：D

2. 抑制碳酸酐酶的药物是

- A: 乙酰唑胺
- B: 氨苯蝶啶
- C: 呋塞米
- D: 氢氯噻嗪

答案：A

3. 稳定型和不稳定型心绞痛都可选用

- A: 维拉帕米
- B: 硝苯地平
- C: 地尔硫
- D: 普萘洛尔

答案：A

4. 蒙脱石散是

- A: 吸附剂
- B: 微生态制剂
- C: 抗分泌药
- D: 抗动力药

答案：A

5. 常用于痤疮的治疗，因易引起前庭神经毒性，已不作为脑膜炎治疗药的是

- A: 多西环素
- B: 氯霉素
- C: 青霉素
- D: 米诺环素

答案：D

6. 下列氨基糖苷类抗菌药物中，引起耳蜗神经损伤发生率最高的是

- A: 核糖霉素
- B: 链霉素
- C: 卡那霉素
- D: 妥布霉素

答案：C

7. ACEI 与其联用，除可增强降压效果外，还可减少后者引起的高肾素血症以及对血尿酸和血糖的不良影响的是()

- A: β 受体阻断药
- B: 噻嗪类利尿药
- C: 人促红素

D: 留钾利尿药

答案：B

8. 聚乙二醇 4000 可用于

A: 哺乳期便秘

B: 成人及 1 岁以上儿童（包括 1 岁）便秘

C: 果糖不耐受儿童

D: 炎症性肠病患者

答案：A

9. 促进钙吸收()

A: 葡萄糖酸钙

B: 依降钙素

C: 阿仑膦酸钠

D: 阿法骨化醇

答案：D

10. 外耳道红肿局部治疗可选用

A: 3%硼酸乙醇

B: 2%酚甘油

C: 赛洛唑啉

D: 伪麻黄碱

答案：B

11. 长期大量服用维生素 D 会出现

A: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

B: 严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活

C: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象

D: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

答案：A

12. 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式(控制饮食，增强运动)。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀片 20mg / d 治疗。

A: 20mg

B: 80mg

C: 100mg

D: 40mg

答案：B

13. 变异型心绞痛宜选用

A: 地尔硫

B: 维拉帕米

C: 普萘洛尔

D: 硝苯地平

答案：D

14. 低剂量可提供接近全效的降压作用的是

A: 氢氯噻嗪

B: 螺内酯

C: 氨苯蝶啶

D: 阿米洛利

答案：A

15. 男性，68 岁，发热伴咳嗽 1 周，表情淡漠，气急，近 2 天全身散在出血点及瘀斑，血压 60 / 40mmHg，血红蛋白 120g / L，白细胞 12×10^9 / L，血小板 30×10^9 / L，血涂片可见少量红细胞碎片，凝血酶原时间 18 秒(正常值 13 秒)，骨髓穿刺示增生活跃，巨核细胞多，诊断为弥散性血管内凝血。

- A: 维生素 C
- B: 鱼精蛋白
- C: 低分子肝素
- D: 维生素 K1

答案：B

16. 以下关于复方托吡卡胺的描述，正确的是

- A: 可诱发未经诊断的闭角型青光眼
- B: 可用于术后防止粘连
- C: 妊娠期妇女慎用
- D: 高血压、动脉硬化、冠状动脉供血不足者慎用

答案：D

17. 属于外周多巴胺受体阻断剂，直接阻断胃肠道多巴胺 D

- A: 昂丹司琼
- B: 甲氧氯普胺
- C: 多潘立酮
- D: 莫沙必利

答案：C

18. (2021 年真题) 患者，男，54 岁。拟行膝关节置换术，围手术期宣选用的预防用抗菌药物 ()

- A: 头孢唑林

- B: 头孢噻肟
- C: 头孢曲松
- D: 头孢他啶

答案：A

19. 在虫体神经肌肉接头处发挥抗胆碱作用，阻断乙酰胆碱对蛔虫肌肉的兴奋作用，或改变虫体肌肉细胞膜对离子的通透性，影响神经自发冲动的传递；亦可抑制琥珀酸盐的产生，减少能量的供应，从而阻断神经肌肉接头处，使冲动不能下达，使蛔虫从寄生的部位脱开，随肠蠕动而排出体外的药物是

- A: 阿苯达唑
- B: 甲苯咪唑
- C: 左旋咪唑
- D: 哌嗪

答案：D

20. 华法林是消旋体，由 S-华法林和 R-华法林组成，二者的抗凝作用是

- A: 二者抗凝作用关系不确定
- B: R-华法林的抗凝作用约是 S-华法林的 5 倍
- C: S-华法林的抗凝作用约是 R-华法林的 5 倍
- D: 二者抗凝作用等效

答案：C

21. （2020 年真题）痛风急性发作时首选的药物是

- A: 秋水仙碱
- B: 苯溴马隆
- C: 碳酸氢钠

D: 非布司他

答案: A

22. 按作用时间分类，属于超长效的胰岛素 / 胰岛素类似物的是

A: 普通胰岛素

B: 地特胰岛素

C: 精蛋白锌胰岛素

D: 预混胰岛素

答案: B

23. 体内缺乏维生素 B1 会导致

A: 贫血

B: 不孕症

C: 脚气病

D: 脂溢性皮炎

答案: C

24. 具有较强的 M 受体阻断作用，能直接解除膀胱逼尿肌痉挛，改善膀胱储尿功能的药物是

A: 西地那非

B: 奥昔布宁

C: 睾酮

D: A 型肉毒毒素

答案: B

25. 抗肿瘤药一般缺乏特异性，在杀伤肿瘤细胞同时，对正常组织细胞不可避免的会产生损害或毒副作用，75%以上化疗患者会出现不同程度的恶心、呕吐。

- A: 应用化疗药后的 72h 后发生
- B: 应用化疗药后的 24~48h 内发生
- C: 应用化疗药后的 48~72h 内发生
- D: 应用化疗药后 24h 内发生

答案：D

26. 糖尿病患者应慎用的高效能利尿剂是()

- A: 呋塞米
- B: 氢氯噻嗪
- C: 乙酰唑胺
- D: 阿米洛利

答案：A

27. 膦甲酸钠不能与静脉滴注喷他脒联合使用，以免发生

- A: 高钾血症
- B: 高钙血症
- C: 低钙血症
- D: 低钾血症

答案：C

28. 可与甲巯咪唑发生药物相互作用的是

- A: 华法林
- B: 阿司匹林
- C: 头孢类抗生素
- D: 噻嗪类利尿剂

答案：A

29. 下述属于第三代 α

- A: 哌唑嗪
- B: 酚苄明
- C: 坦洛新
- D: 十一酸睾酮

答案：C

30. 可与阿司匹林发生相互作用的是

- A: 丙酸睾酮
- B: 伐地那非
- C: 坎利酮
- D: 呋塞米

答案：C

31. 患者，女，41 岁，因进食不洁食物后发生腹泻，伴有恶心、呕吐及下腹痛，大便每日 6~8 次，为糊状或稀水状，伴有黏液。血常规检查提示：白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规：白细胞 8~10 / HP，红细胞 3~5 / HP。诊断：急性腹泻。医嘱：复方地芬诺酯片，2 片，口服，3 次 / 日；诺氟沙星胶囊，300mg，口服，2 次 / 日。

- A: 含地芬诺酯和阿托品
- B: 为阿片受体激动剂
- C: 地芬诺酯是吗啡的衍生物
- D: 地芬诺酯对肠道作用类似吗啡

答案：C

32. 蛋白结合率较高 (>70%) 的头孢菌素类是

- A: 头孢噻肟
- B: 头孢呋辛
- C: 头孢吡肟

D: 头孢曲松

答案：D

33. 以上属于成瘾产妇的新生儿戒断症状的是

A: 惊厥、震颤、反射加速、发热

B: 哈欠、打喷嚏、流涕、出汗

C: 神经过敏、失眠、恶心、呕吐

D: 胃痉挛、心动过速、极度疲乏

答案：A

34. 常在用药 1 周后出现刺激性干咳的是

A: 哌唑嗪

B: 卡托普利

C: 氨氯地平

D: 地高辛

答案：B

35. 患者，男，57 岁，身高 175cm，体重 87kg，诊断为 2 型糖尿病。医生给予二甲双胍片口服，500mg，bid。

A: 餐前即刻或餐时

B: 餐前半小时

C: 餐后 1 小时

D: 餐后半小时

答案：A

36. 硝酸酯类药物舒张血管的作用机制是

A: 抑制磷酸二酯酶

B: 产生 NO，激活鸟苷酸环化酶，使细胞内 cGMP 升高

C: 产生 NO，激活腺苷酸环化酶，使细胞内 cAMP 升高

D: 激动血管平滑肌上的 β_2 受体，使血管扩张

答案：B

37. 可引起肺毒性的抗肿瘤抗生素是

A: 博来霉素

B: 卡莫司汀

C: 环磷酰胺

D: 丝裂霉素

答案：A

38. 老年患者长期大剂量应用 PPIs 可能导致的典型不良反应是

A: 骨折

B: 乳房发育

C: 消化不良

D: 心律不齐

答案：A

39. 以下药物治疗高血压时，给药次数为一日 2 次给药的是

A: 硝苯地平控释片

B: 硝苯地平缓释片

C: 氨氯地平片

D: 非洛地平缓释片

答案：B

40. 不易导致便秘和腹泻不良反应的抗酸药是

A: 三硅酸镁

B: 氢氧化铝

C: 铝碳酸镁

D: 碳酸钙

答案: C

41. 蛇毒血凝酶的给药方式不包括

A: 静脉注射

B: 皮内注射

C: 皮下注射

D: 肌肉注射

答案: B

42. 主要阻滞电压依赖性的钠通道，属于二苯并氮

A: 苯妥英钠

B: 卡马西平

C: 加巴喷丁

D: 苯巴比妥

答案: B

43. 丙磺舒与水杨酸盐和阿司匹林合用()

A: 代谢加快而失效

B: 抑制排酸作用

C: 代谢加速而导致意外怀孕

D: 子宫内膜突破性出血

答案: B

44. 早产系指妊娠在多少周之间结束者

A: 28~37 周

B: 28~38 周

C: 25~37 周

D: 18~37 周

答案：A

45. 可致色觉异常的药物是

A: 硝酸甘油

B: 地高辛

C: 氨氯地平

D: 卡托普利

答案：B

46. 属于第二代头孢菌素口服制剂的是()。

A: 头孢拉定

B: 头孢克洛

C: 头孢吡肟

D: 头孢克肟

答案：B

47. 抑制胃酸分泌作用的药物是

A: 奥关拉唑

B: 碳酸钙

C: 枸橼酸铋钾

D: 莫沙必利

答案：A

48. 关于钙制剂临床应用中的注意事项描述，错误的是()

A: 钙在体内的吸收随着钙的摄入量增加而增加

B: 同时补充维生素 D

C: 补钙应选用含钙量高、生物利用度好、溶出度高的制剂

D: 钙制剂与肾上腺皮质激素、异烟肼、四环素或含铝抗酸药不宜同时服用

答案：A

49. 具有利胆作用的药物是()

A: 熊去氧胆酸

B: 肾上腺素

C: 甲氧氯普胺

D: 阿托品

答案：A

50. 可与抗菌药物联合应用的是

A: 保加利亚乳杆菌

B: 嗜热链球菌

C: 地衣芽孢杆菌

D: 嗜酸乳杆菌

答案：C

51. 在肠内吸收水分后膨胀形成胶体，使肠内容物变软，体积增大，反射性增加肠蠕动而刺激排便的是

A: 乳果糖

B: 酚酞

C: 甘油

D: 聚乙二醇 4000

答案：D

52. 为碱性染料，能抑制革兰阳性菌和少数革兰阴性菌繁殖，对人无害、无刺激的消毒防腐药是

- A: 氯己定
- B: 依沙吡啶
- C: 聚维酮碘
- D: 过氧乙酸

答案：B

53. 镇痛药的合理用药原则，不包括()

- A: 尽可能选口服给药
- B: 按阶梯给药对于轻度疼痛者首选弱阿片类药物
- C: 用药剂量个体化，根据患者需要由小剂量开始逐渐加大剂量
- D: “按时”给药，而不是“按需”给药

答案：B

54. 关于 ARB 药物的叙述，错误的是

- A: ARB 药物多在体内代谢后排出
- B: 所有的 ARB 蛋白结合率大于 96%
- C: 所有的 ARB 起效时间在 2 小时左右
- D: 除厄贝沙坦和替米沙坦外，其他药的口服生物利用度都较低

答案：A

55. (2019 年真题) 对磺胺类药物有严重过敏史的患者应避免使用的药物是()

- A: 坦洛新
- B: 西地那非
- C: 特拉唑嗪
- D: 十一酸睾酮

答案：A

56. 不得与碱性物质或铁器接触的是()

- A: 林旦霜
- B: 苯甲酸苄酯
- C: 克罗米通
- D: 阿达帕林

答案：A

57. (2015 年真题) 可抑制鲨烯环氧酶的活性, 属于丙烯胺类抗皮肤真菌药的是 ()。

- A: 阿莫罗芬
- B: 联苯苄唑
- C: 制霉菌素
- D: 特比萘芬

答案：D

58. 患者, 女, 46 岁。肝硬化腹水患者, 长期使用噻嗪类利尿药不会引起

- A: 高尿酸血症
- B: 低氯性碱中毒
- C: 低钾血症
- D: 低钙血症

答案：D

59. 煤焦油治疗银屑病的作用机制是

- A: 可抑制表皮细胞的有丝分裂, 使皮肤增生速率恢复正常
- B: 通过角蛋白表达正常化, 促进角质细胞末端分化

C: 与维 A 酸细胞核受体有较高亲和力

D: 能抑制皮肤角质形成细胞的过度增生和诱导其分化，从而使银屑病表皮细胞的增生和分化得到纠正

答案：A

60. 口服可用于肠道感染的药物是

A: 链霉素

B: 妥布霉素

C: 奈替米星

D: 庆大霉素

答案：D

61. 强心苷中毒所致的心室纤颤宜选用()

A: 普罗帕酮

B: 地尔硫

C: 胺碘酮

D: 利多卡因

答案：D

62. 属于高致吐风险的抗肿瘤药物是（）

A: 顺铂

B: 奥沙利铂

C: 氟尿嘧啶

D: 吉非替尼

答案：A

63. 下列维生素中，属于水溶性的是()。

A: 维生素

B: 维生素

C: 维生素 A

D: 维生素

答案：D

64. 为治疗阴道滴虫病的首选药物是

A: 三苯双脒

B: 吡喹酮

C: 甲硝唑

D: 乙胺嘧啶

答案：C

65. 属于 P-糖蛋白的底物，提高辛伐他汀发生横纹肌溶解危险性的是

A: 烟酸

B: 地高辛

C: 利福平

D: 红霉素

答案：B

66. 下列关于利巴韦林作用机制的描述中，不正确的是

A: 减少病毒核糖核酸和蛋白质合成

B: 破坏病毒复制与传播

C: 抑制病毒合成酶

D: 可竞争性抑制 DNA 多聚酶

答案：D

67. 深部真菌感染首选药，静脉滴注用于真菌性肺炎、心内膜炎的药物是

- A: 两性霉素 B
- B: 膦甲酸钠
- C: 奥司他韦
- D: 制霉菌素

答案：A

68. 适用于 IIa、IIb 型及家族性杂合子的高脂蛋白血症，但有特殊臭味和刺激性的是

- A: 烟酸
- B: 洛伐他汀
- C: 考来烯胺
- D: 考普罗布

答案：C

69. 阿托品对眼部的作用特点是()

- A: 缩瞳，降低眼压
- B: 缩瞳，调节麻痹
- C: 扩瞳，降低眼压
- D: 扩瞳，调节麻痹

答案：D

70. 可使后者疗效显著下降的是

- A: 维生素 C
- B: 他莫昔芬
- C: 氯丙嗪
- D: 红霉素

答案：A

71. 红霉素的作用机制是

- A: 与核蛋白 50s 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成
- B: 抑制细菌蛋白质的合成的全过程
- C: 与核蛋白 70s 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成
- D: 与核蛋白 30s 亚基结合，抑制细菌蛋白质的合成

答案：A

72. 属于促凝血因子活性药的是

- A: 酚磺乙胺
- B: 鱼精蛋白
- C: 氨甲环酸
- D: 甲萘氢醌

答案：A

73. 可使维生素 B

- A: 异烟肼
- B: 糖皮质激素
- C: 丙磺舒
- D: 雌激素

答案：D

74. 防治血栓性疾病如心肌梗死、脑梗死的药物是()

- A: 非格司亭
- B: 氨甲环酸
- C: 香豆素类
- D: 维生素 K

答案：C

75. 下述药物可引起药物性鼻炎的是

- A: 过氧化氢溶液
- B: 硼酸甘油滴耳液
- C: 麻黄碱
- D: 酚甘油滴耳液

答案：C

76. (2017 年真题) 不属于糖皮质激素的适应症是 ()

- A: 风湿
- B: 再障
- C: 系统性红斑狼疮
- D: 活动性肺结核

答案：D

77. 下列关于托吡卡胺的描述错误的是

- A: 哺乳期慎用
- B: 可给予拟胆碱类药物解毒
- C: 可诱发闭角型青光眼
- D: 滴眼后不应压迫泪囊

答案：D

78. 属于润滑性泻药的是

- A: 欧车前
- B: 番泻叶
- C: 利那洛肽
- D: 多库酯钠

答案：D

79. 育龄女性在无防护的性生活或避孕失败 72 小时内,宜使用的口服紧急避孕药物是 ()

- A: 左炔诺孕酮 (1
- B: 炔雌醇去氧孕烯 (30g/150g)
- C: 复方醋酸环丙孕酮 (35 μ g/2mg)
- D: 十一酸睾酮 (40mg)

答案: A

80. 可能诱发酒后双硫仑样反应的抗菌药物是

- A: 哌拉西林
- B: 甲硝唑
- C: 左氧氟沙星
- D: 米诺环素

答案: B

81. 治疗良性前列腺增生症宜选用

- A: 坦洛新
- B: 尼莫地平
- C: 托特罗定
- D: 利血平

答案: A

82. 是碘与表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮经反应生成的复合物。含有效碘 9%~12%。从载体中释出碘,可直接卤化菌体蛋白质,与细菌蛋白质的氨基酸结合,破坏菌体的蛋白质和酶,使微生物代谢功能发生障碍而死亡的广谱强效杀菌药是

- A: 过氧乙酸
- B: 聚维酮碘

C: 依沙吡啶

D: 氯己定

答案: B

83. 抢救糖尿病合并酮症酸中毒患者

A: 静脉用胰岛素

B: 胰岛素皮下注射

C: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

D: 二甲双胍

答案: A

84. 氯霉素的抗菌作用机制是

A: 与细菌核糖体 50S 亚基结合，抑制肽酰基转移酶的活性，从而阻止肽链延伸，是蛋白质合成受阻

B: 阻止氨基酰-tRNA 与细菌核糖体 30S 亚基结合，影响蛋白质的合成

C: 抑制二氢叶酸合成酶，影响叶酸的合成

D: 改变细菌胞浆膜通透性，使重要的营养物质外漏

答案: A

85. 治疗酮症酸中毒的是

A: 二甲双胍

B: A 和 B 均无效

C: 胰岛素

D: 磺酰脲类

答案: C

86. (2016 年真题) 与西地那非协同，可导致严重低血压的药品是

专业《执业药师之西药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 非那雄胺

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/308057133045007022>