

# 精品学习资源复习备考宝典

——考前迅速提升——

(辅导资料、习题资源、知识点训练等)

## 输血师考试试题及答案全套

1.关于悬浮红细胞的描述，正确的是（ ）。

- A. 含有全血中全部的红细胞、白细胞、血小板、保存液的混悬液
- B. 含有全血中全部的红细胞、一定量白细胞、血小板、少量血浆
- C. 含有全血中全部的红细胞、一定量白细胞、少量血浆和保存液的混悬液
- D. 含有全血中全部的红细胞、一定量白细胞、血小板、少量血浆和保存液的混悬液
- E. 含有全血中全部的红细胞、白细胞、血小板、血浆和保存液的混悬液

**【答案】：D**

2.终产品浓缩红细胞的血细胞比容应为（ ）。

- A. 0.45~0.50
- B. 0.50~0.65
- C. 0.55~0.65
- D. 0.65~0.75
- E. 0.65~0.80

**【答案】：E**

3.成分离心机离心转速的注意事项是检查人员要注意安全，转速仪的测量距离为（ ）。

- A. 5cm
- B. 10cm
- C. 20cm
- D. 30cm
- E. 50cm

**【答案】：C**

4.下列检测艾滋病的方法中，不属于 HIV 抗体检测法的是（ ）。

- A. 明胶颗粒凝集法
- B. ELISA 法
- C. HIV RNA 检测
- D. 快速法
- E. 免疫印迹法

**【答案】：C**

5.医德关系成为生命伦理学主要研究对象的方面是（ ）。

- A. 医务人员与患者之间的关系
- B. 医务人员相互之间的关系
- C. 医务人员与患者家属
- D. 医务人员与医学科学发展之间的关系
- E. 以上都不是

**【答案】：D**

6.血液安全度依次降低的献血模式排列顺序是（ ）。

- A. 有偿献血、家庭互助献血、无偿献血
- B. 家庭互助献血、无偿献血、有偿献血
- C. 有偿献血、无偿献血、家庭互助献血
- D. 家庭互助献血、有偿献血、无偿献血
- E. 无偿献血、家庭互助献血、有偿献血

**【答案】：E**

**【解析】：**

血液安全度依次降低的献血模式排列顺序是无偿献血、家庭互助献血、有偿献血。其中有偿献血最危险，献血人为了利益，瞒报可能的传染病。其次为家庭互助献血，某些遗传学血液病也可能存在于其他家庭成员。

7. 下列关于细胞因子的特点叙述正确的是（ ）。

- A. 一种细胞可产生多种细胞因子
- B. 非抗原特异性
- C. 受体依赖性
- D. 丝裂原可刺激细胞合成和分泌细胞因子
- E. 以上答案均正确

**【答案】：E**

8. 不会引起休克的输血反应是（ ）。

- A. 非溶血性发热反应
- B. 过敏反应
- C. 溶血反应

D. 细菌污染反应

E. 循环超负荷

**【答案】：A**

**【解析】：**

非溶血性发热反应一般无血压变化，不会发生休克，应选择 A。严重的过敏反应可发生过敏性休克；急性溶血反应可发生低血容量休克；细菌污染反应可发生感染性休克；循环超负荷可引起心源性休克。

9. 男性，28 岁，O 型血，患再生障碍性贫血半年，血红蛋白 70g/L，白细胞  $2.2 \times 10^9/L$ ，血小板  $20 \times 10^9/L$ 。

(1) 下列关于该再障患者纠正贫血的说法，不正确的是（ ）。

A. 该患者若无明显的临床表现，不需要纠正贫血

B. 为防止贫血引起的继发疾病，应将血红蛋白水平提高至 100g/L 以上

C. 若需输血，可用年轻红细胞

D. 多次输血后可引起 HLA 抗体的产生，可用白细胞滤器进行红细胞输注

E. 当输血次数较多时，应适当给予去铁胺注射

**【答案】：B**

**【解析】：**

再障患者对缺氧一般有较强的耐受力，只有当血红蛋白 $<40\text{g/L}$ 时，才考虑给予输血治疗。

(2)若患者出现感染，抗生素治疗仍得不到控制，需输注粒细胞，一般总数为（ ）。

- A.  $(0\sim 3.0) \times 10^8$
- B.  $(5.0\sim 6.0) \times 10^8$
- C.  $(0\sim 3.0) \times 10^9$
- D.  $(5.0\sim 6.0) \times 10^9$
- E.  $(0\sim 3.0) \times 10^{10}$

**【答案】：E**

**【解析】：**

再障患者出现感染，抗生素治疗仍得不到控制，输注粒细胞必须足量，一般总数为  $(0\sim 3.0) \times 10^{10}$ 。

(3)该患者早晨刷牙时发现出血，应立即给予的措施是（ ）。

- A. 严密观察病情
- B. 无需输注血小板制剂
- C. 立即输注血小板制剂
- D. 根据患者的具体情况决定是否需要输注血小板制剂
- E. 应用止血药物

**【答案】：C**

**【解析】：**

再障出血的原因及治疗措施：再障患者由于血小板计数过低可引起脏

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/308070066101006124>