

2024 河南省范县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题通关秘籍题库及答案【网校专用】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 某男性患者，57 岁，既往高血压病史 10 年，与儿子吵架后突然起病，言语不清，左侧肢体无力，意识不清。查体：BP220 / 120mmHg，中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激(+)，左侧肢体不活动，左侧巴彬斯基征阳性。

- A: 脑血栓形成
- B: 短暂性脑缺血发作
- C: 脑出血
- D: 缺血性脑卒中

答案：C

2. 不宜肌肉注射或直接静脉注射，滴注速度过快可出现红人综合征的药物是

- A: 万古霉素
- B: 洛铂
- C: 培氟沙星
- D: 苯妥英钠

答案：A

3. 具有耳毒性、肾毒性的抗结核药是

- A: 链霉素
- B: 利福平

C: 乙胺丁醇

D: 异烟肼

答案：A

4. 痛风急性发作期应选用

A: 丙磺舒

B: 别嘌醇

C: 阿司匹林

D: 秋水仙碱

答案：D

5. 患者，女，52 岁，近年来发现手关节肿痛，且呈对称性，并有畸形，晨起时有僵硬现象持续 1 小时，疼痛难忍。经实验室检测示血沉 28mm / 1h，指尖关节的 X 线片显示受累关节有骨侵蚀特征。

A: 白介素-6 拮抗剂

B: 依那西普

C: 关洛昔康

D: 泼尼松

答案：D

6. (2019 年真题) 用后不宜马上进食的剂型是

A: 软膏剂

B: 直肠栓剂

C: 滴眼剂

D: 含漱剂

答案：D

7. 以下药品中，最适宜治疗沙眼和流行性急性结膜炎的是

- A: 酞丁安滴眼剂
- B: 色甘酸钠滴眼剂
- C: 红霉素眼膏
- D: 硫酸锌滴眼剂

答案：A

8. 治疗流行性脑脊髓膜炎首选药是

- A: 磺胺多辛
- B: 替硝唑
- C: 磺胺嘧啶
- D: 磺胺甲噁唑

答案：C

9. (2018 年真题) 过敏性结膜炎和春季卡他性结膜炎可选用 ()

- A: 色甘酸钠滴眼液
- B: 氧氟沙星滴眼液
- C: 七叶洋地黄双苷滴眼液
- D: 玻璃酸钠滴眼液

答案：A

10. 躯干部出现鞭打状色素沉着的是

- A: 白消安
- B: 氟尿嘧啶
- C: 柔红霉素
- D: 博来霉素

答案：D

11. 稚嫩、柔弱，喹诺酮类药物可致关节痛及关节肿胀、软骨损害

- A: 运动系统
- B: 水盐代谢
- C: 内分泌系统
- D: 血液系统

答案：A

12. (体内贮铁量与血浆铁的运转率的关系)，铁缺乏时铁剂的吸收率可达

- A: 20%~60%
- B: 10%~20%
- C: 15%~20%
- D: 20%~40%

答案：A

13. 查找药物信息的正确顺序是()。

- A: 一级信息源→二级信息源→三级信息源
- B: 二级信息源→三级信息源→一级信息源
- C: 二级信息源→一级信息源→三级信息源
- D: 三级信息源→二级信息源→一级信息源

答案：D

14. 服用胃动力药多潘立酮治疗消化不良，最佳用药时间是

- A: 餐前
- B: 餐后 1 小时
- C: 餐前 0.5~1 小时
- D: 餐后

答案：C

15. 服药期间饮酒可引起低血糖反应的是

- A: 泼尼松
- B: 西咪替丁
- C: 硫酸亚铁
- D: 格列本脲

答案：D

16. 2 型儿童糖尿病者宜首选 ()。

- A: 格列喹酮
- B: 二甲双胍
- C: 胰岛素
- D: 瑞格美脲

答案：B

17. 患者,男,80 岁,因发热、咳嗽、咳痰 2 天就诊诊断为社区获得性肺炎,给予左氧氟沙星、甘草合剂、氨溴索、对乙酰氨基酚、维生素 C 等治疗。患者用药 3 天后出现失眠、烦躁不安等症状最可能引起该症状的药物是 ()

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 甘草合剂
- C: 左氧氟沙星
- D: 氨溴索

答案：C

18. 解救急性乙醇中毒的是 ()

- A: 纳洛酮
- B: 亚硝酸钠
- C: 双复磷

D: 二巯丁二钠

答案: A

19. 检查栓剂 / 软膏剂的异嗅和散剂的气味属于

A: 听觉试验

B: 嗅觉试验

C: 触觉试验

D: 视觉试验

答案: B

20. 下列关于烫伤救治措施的说法，正确的是

A: 烫伤患者的镇痛、镇静药物首选氯丙嗪

B: 创面及时外涂甲紫溶液预防感染

C: I 度烫伤可冷敷后外涂烧伤膏

D: 可用清洁塑料薄膜覆盖创面，以防创面感染

答案: C

21. 能刺激骨骼、肌肉和组织生长发育的是

A: 蛋白同化激素

B: 利尿剂

C: 肽类激素

D: 麻醉药品

答案: C

22. 可能导致癫痫发作的药物是

A: 利血平

B: 氟哌啶醇

C: 白消安

D: 麻黄碱

答案：D

23. 具有临床耐受性良好、无戒断效应特点的治疗失眠症药物为（）

A: 小剂量米氮平

B: 艾司唑仑

C: 阿戈美拉汀

D: 低剂量的多塞平

答案：D

24. 以下解救中毒措施中，正确的药物拮抗是

A: 口服氯化铵促使苯丙胺排泄

B: 二巯丙醇拮抗青霉胺

C: 阿托品拮抗颠茄碱类中毒

D: 依地酸钙钠可"驱铅"

答案：D

25. 单纯饮食控制及体育锻炼治疗无效的 2 型糖尿病患者宜选用

A: 格列本脲

B: 胰岛素

C: 二甲双胍

D: 大剂量碘剂

答案：C

26. 阿托伐他汀钙的日剂量范围是()

A: 5—20mg

B: 10—20mg

C: 40—200mg

D: 10—80mg

答案：D

27. 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病、高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.59tidpo、瑞格列奈片 1mg tidpo、阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

A: 停用瑞格列奈片和阿托伐他汀钙片

B: 停用瑞格列奈片

C: 停用阿托伐汀钙片

D: 停用二甲双胍肠溶片

答案：D

28. 治疗抗肿瘤药引起的恶心、呕吐等不良反应，可选用的止吐药物是

A: 维生素 B6

B: 昂丹司琼

C: 雷尼替丁

D: 奥美拉唑

答案：B

29. 正常高值的血压范围是()。

A: 收缩压 140~159mmHg，舒张压 90~99mmHg

B: 收缩压 120~139mmHg，舒张压 80~89mmHg

C: 收缩压 160~179mmHg，舒张压 100~109mmHg

D: 收缩压 ≥ 180 mmHg，舒张压 ≥ 110 mmHg

答案：B

30. 以下治疗手足浅表性真菌感染的药物中，尤其适用于角化皲裂型足癣的处方药是

- A: 特比萘芬
- B: 依沙吡啶
- C: 苯甲酸
- D: 尿素

答案：A

31. 患者 12 岁，近 1 周夜间持续咳嗽宜首选

- A: 羧甲司坦？
- B: 右美沙芬？
- C: 苯丙哌林？
- D: 盐酸吗啡？

答案：B

32. 中成药血脂康中含有的化学药物成分是

- A: 洛伐他汀
- B: 依折麦布
- C: 阿托伐他汀钙
- D: 辛伐他汀

答案：A

33. （2015 年真题）下列关于脑梗死急性期药物治疗的说法，正确的是（ ）。

- A: 甘油果糖脱水作用较甘露醇强且快
- B: 应在使用溶栓药的同时联合使用阿司匹林
- C: 血小板计数 $<100 \times 10^9/L$ 时应禁用溶栓药
- D: 急性脑梗死的溶栓治疗时间窗是 48 小时内

答案：C

34. 有机氟杀虫农药中毒的特效解毒剂是

- A: 乙酰胺
- B: 碘解磷定
- C: 维生素 K1
- D: 毒扁豆碱

答案：A

35. 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160 / 105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol / L(正常参考范围 <7.8mmol / L)，甘油三酯 1.52mmol / L(正常参考范围 0.56~1.70mmol / L)，总胆固醇 6.26mmol / L(正常参考范围 <5.2mmol / L)，低密度脂蛋白胆固醇 4.18mmol / L(正常参考范围 2.1~3.1mmol / L)，高密度脂蛋白胆固醇 1.20mmol / L(正常参考范围 1.2~1.65mmol / L)，血肌酐 50 μmol / L(正常参考范围 45~84 μmol / L)，尿蛋白(++)。临床诊断为高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A: 阿托伐他汀
- B: 依折麦布
- C: 普罗布考
- D: 非诺贝特

答案：A

36. 易风化的药物是()。

- A: 胃蛋白酶
- B: 青霉素
- C: 硫酸镁
- D: 硝酸甘油

答案：C

37. 关于他汀类和贝特类的联合使用，下列说法正确的是

- A: 晚间服用
- B: 早晚分别服用
- C: 早晨服用
- D: 早晨服用贝特类、而晚上服用他汀类

答案：D

38. (常用的特殊解毒剂的适应证)，急性阿片类及急性乙醇中毒的特殊解毒剂

- A: 二巯丁二钠
- B: 谷胱甘肽
- C: 纳洛酮
- D: 乙酰半胱氨酸

答案：C

39. 下列药物属于肝药酶诱导剂的是

- A: 环丙沙星
- B: 胺碘酮
- C: 卡马西平
- D: 氟康唑

答案：C

40. (2018 年真题) 患者, 男 58 岁, 高血压病史 5 年, 吸烟史 40 年, 日均 40 支, 6 小时前出现左侧肢体无力, 并逐渐加重, 不能站立, 家属发现其说话迟钝含混, 右侧嘴唇变浅, 意识清楚, 到某院急诊 BP190/120mmHg, 血常规基本正常, 行头部 MRI 检查后, 诊断为急性脑梗死。

- A: 阿司匹林肠溶片 300mgqdp0
- B: 华法林片 3mgqdp0

C: 阿司匹林肠溶片 100mgqdp0

D: 氯吡格雷片 75mgqdp0

答案: C

41. 属于护士用药咨询的是

A: 栓剂、气雾剂的正确使用方法

B: 减肥、补钙、补充营养素

C: 注射剂溶媒的正确选择

D: 抗菌药物的合理应用

答案: C

42. 患者女 45 岁,既往有心律失常(Q-T 间期延长)、低钾血症近日因发热、咳嗽、咳痰就诊,诊断为社区获得性肺炎。该患者不宜选用的药物是()

A: 头孢呋辛酯

B: 阿莫西林

C: 莫西沙星

D: 氨溴索

答案: C

43. 口服后可导致肠道内 pH 下降, 并可通过渗透作用增加结肠内容量的药物是

A: 比沙可啶

B: 硫酸镁

C: 乳果糖

D: 聚乙二醇 4000

答案: C

44. 属于选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的是

- A: 吗氯贝胺
- B: 文拉法辛
- C: 阿米替林
- D: 氟西汀

答案：D

45. 阿尔茨海默病患者应该避免使用的药物是

- A: 多奈哌齐
- B: 美金刚
- C: 卡巴拉汀
- D: 颠茄

答案：D

46. （2015 年真题）使用前应用青霉素进行皮试的药物是（ ）。

- A: 阿奇霉素片
- B: 阿莫西林胶囊
- C: 左氧氟沙星片
- D: 注射用头孢曲松钠

答案：B

47. 消化不良很常见，半数以上人群在生命过程中曾因此病症而就诊，其主要症状有上腹饱胀、食欲缺乏等表现。

- A: 胰酶片必须用肠溶衣片，口服时不可嚼碎，应整片吞下
- B: 微生态制剂不可用于消化不良的治疗
- C: 过量的干酵母和乳酶生可以引起腹泻
- D: 乳腺癌、机械性肠梗阻患者禁用多潘立酮

答案：B

48. 不可随意间断用药、停药、换药

- A: 适量
- B: 联合
- C: 规律
- D: 早期

答案：C

49. 具有多种作用，可用于角膜软化、夜盲症的是

- A: 维生素 D
- B: 维生素 C
- C: 维生素 B1
- D: 维生素 A

答案：D

50. （2018 年真题）由带状疱疹所致的严重后遗神经痛，应选的药物是
（ ）

- A: 卡马西平片
- B: 羟考酮缓释片
- C: 对乙酰氨基酚片
- D: 芬太尼透皮贴剂

答案：A

51. 高 TG 血症首选

- A: 依折麦布
- B: 阿昔莫司
- C: 氟伐他汀
- D: 非诺贝特

答案：D

52. 患者，男 52 岁，身高 168cm，体重 85kg，痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖 7.8mmol/L(正常值:3.9~6.1mmol/L)，餐后血糖 148mmol/L(正常值:<7.8mmol/L)，血尿酸 580 μ mol/L(正常值:男性 180~440 μ mol/L)，血 LDL-C 3.7mmol/L(正常值:2.1~3.1mmol/L)肌酐清除率 100ml/min。颈动脉彩超提示:动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断 2 型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

- A: 格列齐特
- B: 阿卡波糖
- C: 二甲双胍
- D: 甘精胰岛素

答案：B

53. 妊娠初始 3 个月妇女禁用的药品是

- A: 沙利度胺
- B: 硫酸铝
- C: 乳酸菌素
- D: 阿司匹林

答案：A

54. (2018 年真题) 患者,女,53 岁,冠心病史 2 年,目前服用硝酸异山梨酯、阿托伐他汀钙。近三个月因胃痛心境低落、有自杀倾向就诊,临床诊断为消化性溃疡、抑郁症。给予奥美拉唑肠溶片 40mgqdpo 文拉法辛缓释片 150mgqdpo,谷维素片 10mg tidpo 治疗,患者用药后出现血压升高可能导致该患者血压升高的药物是 ()

- A: 文拉法辛缓释片

B: 奥美拉唑肠溶片

C: 阿托伐他汀钙片

D: 硝酸异山梨酯片

答案：A

55. 布桂嗪属于

A: 血管扩张药

B: 利尿剂

C: 抗组胺药

D: 镇痛药

答案：D

56. 处方中外文缩写“OU”代表

A: 左耳

B: 双眼

C: 右耳

D: 左眼

答案：B

57. 细菌感染性腹泻患者宜选用

A: 小檗碱

B: 乳果糖

C: 阿苯达唑

D: 干酵母

答案：A

58. 属于多巴胺受体激动剂的是

A: 苯海索

- B: 司来吉兰
- C: 恩托卡朋
- D: 普拉克索

答案：D

59. 真菌引起的阴道炎宜选用

- A: 聚甲酚磺醛
- B: 咪康唑
- C: 庆大霉素
- D: 甲硝唑

答案：B

60. (2019 年真题) 餐后服用可以增加吸收的药物是

- A: 头孢拉定胶囊
- B: 左甲状腺素钠片
- C: 维生素 B2 片
- D: 磷酸铝凝胶

答案：C

61. 用药后不会出现畸形胎儿的时间是在受精后

- A: 20 天之内
- B: 10 天之后
- C: 15 天之内
- D: 15 天之后

答案：C

62. 下列影响老年人血药浓度的因素中，叙述错误的是

- A: 与血浆蛋白结合率增加，使游离型药物减少

- B: 对药物的代谢、排泄减慢，血浆半衰期延长
- C: 心肝肾及胃肠等主要器官功能在不断下降
- D: 常规剂量连续给药就有可能引起蓄积性中毒

答案：A

63. 放射性碘的不良反应是

- A: 中枢抑制
- B: 粒细胞缺乏
- C: 甲状腺功能亢进
- D: 甲状腺功能低下

答案：D

64. 婴幼儿腹泻，服用地衣芽孢杆菌活菌制剂，正确的使用方法是()

- A: 应同时碱化尿液
- B: 舌下含服
- C: 清晨服用
- D: 用温水调服

答案：D

65. 适宜餐前服用的助消化药是

- A: 铝碳酸镁
- B: 乳酸菌素
- C: 硫糖铝
- D: 法莫替丁

答案：B

66. 下列关于肾功能不全患者给药方案调整的方法，错误的是

- A: 肾功能不全者首选经肝胆代谢和排泄的药物

B: 肾功能不全又必须使用明显肾毒性的药物时，可以同时服用碳酸氢钠以碱化尿液，促进药物排泄。防止药源性疾病

C: 肾功能不全而肝功能正常者，可选用经双通道（肝、肾）消除的药物

D: 肾功能不全又必须使用明显肾毒性的药物时，可以延长给药间隔或减少给药剂量

答案：B

67.（2018 年真题）用于胆石症的非手术治疗，属于钙通道阻滞剂，不可掰开嚼碎，避免卧位服用的药物是（）

A: 鹅去氧胆酸片

B: 匹维溴铵片

C: 山莨菪碱片

D: 熊去氧胆酸片

答案：B

68. 关于尿路感染的用药注意事项，说法不正确的是

A: 服用磺胺类药物时应少喝水

B: 尽量避免尿路器械的使用

C: 无症状菌尿仅推荐筛查和治疗孕妇以及接受可能导致尿道黏膜出血的侵入性操作的患者

D: 经验性用药有头孢氨苄、阿莫西林等

答案：A

69. 下列是 5 位患者血常规检查的结果，其中白细胞计数异常的是

A: 成人静脉血 $4.3 \times 10^9 / L$

B: 6 个月～2 岁婴儿 $11.0 \times 10^9 / L$

C: 成人末梢血 $8.0 \times 10^9 / L$

D: 成人静脉血 $13.0 \times 10^9 / L$

答案：D

70. 是空腹血浆中的主要脂蛋白，可将胆固醇运输到肝外组织的为

A: 极低密度脂蛋白胆固醇

B: 低密度脂蛋白胆固醇

C: 三酰甘油酯

D: 血清总胆固醇

答案：B

71. 人体的生物钟规律即指在人体内调控某些生化、生理和行为现象有节奏地出现的生理机制，很多药物的作用和毒性、不良反应与人体的生物节律(生物钟)有着极其密切的关系，同一种药物在同等剂量可因给药时间不同而产生不同的作用和疗效。

A: 清晨服用泼尼松

B: 清晨服用利尿药

C: 清晨服用驱虫药

D: 睡前服用助眠药

答案：A

72. (2017 年真题) 下列关于口服阿仑膦酸钠使用注意事项的说法, 错误的是 ()

A: 随餐服用, 并大量饮水, 可增加吸收、减少胃肠道刺激

B: 口服后 30 分钟内应保持立位或坐位

C: 食管炎为典型不良反应

D: 应避免同时使用两种双膦酸盐

答案：A

73. 淡红色处方作为

- A: 普通处方
- B: 儿科处方
- C: 急诊处方
- D: 麻醉药品和第一类精神药品处方

答案：D

74. (2016 年真题) 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo，瑞格列奈片 1mgtidpo，阿托伐他汀钙片 20mgqdpo 等药物治疗。

- A: 停用瑞格列奈片和阿托伐他汀钙片
- B: 停用阿托伐他汀钙片
- C: 停用瑞格列奈片
- D: 停用二甲双胍肠溶片

答案：B

75. 同时使用 2 种药物，药物不良事件的发生率为

- A: 0.13
- B: 0.38
- C: 0.72
- D: 0.58

答案：A

76. 属于拓扑异构酶抑制剂是

- A: 放线菌
- B: 培美曲塞
- C: 顺铂
- D: 依托泊苷

答案：D

77. 患者男性，45 岁，反复发作夜间呼吸困难 1 个月，加重 1 天就诊。体格检查：血压 180 / 110mmHg，呼吸急促，双肺散在哮鸣音，双肺底细湿啰音，心率 130 次 / 分。

- A: 氨溴索
- B: 吗啡
- C: 氨茶碱
- D: 速尿

答案：B

78. 适用于阿司匹林哮喘伴过敏性鼻炎的预防和维持治疗的药物是

- A: 异丙托溴铵气雾剂
- B: 沙丁胺醇气雾剂
- C: 茶碱片
- D: 孟鲁司特钠咀嚼片

答案：D

79. 患者，男，48 岁，因“肺结核”入院治疗。医师处方异烟肼片 0.3gqd、利福平胶囊 0.6gqd、乙胺丁醇片 1.0gqd、吡嗪酰胺片 1.5gqd。药师对患者的正确用药指导是

- A: 患者治疗期间应避免服用维生素 B6
- B: 异烟肼加快乙胺丁醇代谢，增加球后视神经炎风险，须定期评估视神经功能
- C: 利福平可加快异烟肼的代谢，增强肝毒性，须定期监测肝功能
- D: 利福平可减慢异烟肼的代谢，增强肝毒性，须定期监测肝功能

答案：C

80. 患者，男，71 岁，因高血压、心力衰竭给予氢氯噻嗪、地高辛等治疗，产生的药物相互作用属于()

- A: 降低抗药性，疗效增加
- B: 敏感化作用，药品不良反应增加
- C: 增加靶器官药物浓度，药品不良反应减少
- D: 拮抗作用，药品不良反应增加

答案：B

81. 饮食对粪外观的影响，肉食

- A: 酱色
- B: 黑褐色
- C: 暗绿色
- D: 红色

答案：B

82. 患者，女，45 岁，1 年前临床诊断为室上性心动过速，服用美托洛尔片 25mgbid。近日因反复胃痛就诊，胃镜检查诊断为胃溃疡，幽门螺杆菌阳性。既往有膝关节疼痛，长期服用非甾体抗炎药。医师处方：奥美拉唑肠溶片 20mgqd，甲硝唑片 0.4gtid，克拉霉素片 50mgbid，枸橼酸铋钾胶囊 220mg tid。患者溃疡治愈后，因膝关节疼痛需要长期服用非甾体抗炎药。为降低溃疡复发风险，首选的预防药物是

- A: 替普瑞酮
- B: 多潘立酮
- C: 枸橼酸铋钾
- D: 奥美拉唑

答案：D

83. 具有变形运动和吞噬功能，可吞噬抗原抗体复合物或细菌的细胞为

- A: 嗜酸性粒细胞
- B: 中性粒细胞
- C: 嗜碱性粒细胞
- D: 淋巴细胞

答案：A

84. 服用地西泮等苯二氮

- A: 烟
- B: 酒
- C: 浓茶
- D: 咖啡

答案：A

85. 长期服用避孕药

- A: 可使驾驶员出现眩晕和幻觉
- B: 可导致驾驶员多尿或多汗
- C: 可使驾驶员视物模糊或辨色困难
- D: 可使驾驶员出现定向力障碍

答案：D

86. 导致心脑血管事件的是

- A: 加替沙星
- B: 阿托伐他汀
- C: 己烯雌酚
- D: 罗非昔布

答案：D

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/308102135042007022>