

学习资料整理汇编

（考点或配套习题突击训练）

运动医学模拟题库与答案

1、Coles 骨折,最有诊断意义的体征是()。

- A、 局部肿胀
- B、 局部压痛
- C、 反常活动
- D、 典型畸形
- E、 手功能受限

答案: D

2、45 岁女性患者,10 月前因左股骨颈头下型骨折行空心钉固定术,术后 3 月下地行走。近 2 月来,左髋疼痛明显,不能行走,X 线片示左股骨头密度高低不均,形态基本正常,诊断应为()。

- A、 左髋关节结核
- B、 创伤性关节炎
- C、 化脓性关节炎
- D、 左股骨头缺血性坏死
- E、 股骨头肿瘤

答案: D

3、正常血液 pH 保持在()。

- A、 5.35~6.45
- B、 6.35~7.45
- C、 7.35~7.45
- D、 7.35~8.45
- E、 8.35~8.45

答案: C

4、患儿,男,4 岁,摔倒后肩部疼痛。检查发现患肩下沉,患肢活动障碍,头向患侧偏斜,杜加(Dugas)征阴性。最可能的诊断是()。

- A、 臂丛神经损伤
- B、 桡骨小头半脱位
- C、 锁骨骨折
- D、 肱骨外科颈骨折
- E、 肩关节脱位

答案: C

5、属于稳定性骨折的是()。

- A、 伸直型肱骨髁上骨折
- B、 股骨干的横骨折

- C、 单一桡骨干的斜骨折
- D、 尺、桡骨双骨折的青枝骨折
- E、 股骨颈骨折内收型

答案：D

6、Coles 骨折时, 以下情况最少见的是()。

- A、 骨折畸形愈合
- B、 骨折不愈合
- C、 合并尺骨茎突骨折
- D、 合并腕三角软骨盘破裂
- E、 合并下尺桡关节脱位

答案：B

7、脊柱骨折病人在搬运过程中, 最正确的体位是()。

- A、 侧卧位
- B、 仰卧屈曲位
- C、 仰卧过伸位
- D、 俯卧过伸位
- E、 半坐卧位

答案：C

8、最容易引起骨折不连接的移位是()。

- A、 侧方移位
- B、 成角移位
- C、 分离移位
- D、 旋转移位
- E、 嵌插移位

答案：C

9、红细胞的能量获取主要通过途径为()。

- A、 脂肪代谢
- B、 磷酸戊糖途径
- C、 糖酵解
- D、 蛋白质分解
- E、 氨基酸代谢

答案：C

10、20 岁, 男性。夜间骑自行车, 头朝下跌于壕沟, 发生四肢不全瘫, X 线片显示齿状突骨折伴半脱位, 此时在治疗上最先采取的措施, 是()。

- A、 石膏领固定

- B、 颅骨牵引固定
- C、 吊带牵引
- D、 环枕固定术
- E、 切开复位内固定

答案：B

11、 骶骨骨折时, 最容易受损伤的神经是()。

- A、 S1 和 S2
- B、 S3 和 S4
- C、 L4 和 L5
- D、 L2 和 L3
- E、 股神经

答案：A

12、 26 岁女性, 3 小时前摔伤左前臂, 来院检查发现前臂肿胀, 瘀斑, 剧痛, 并有短缩成角畸形, 诊断首先考虑()。

- A、 前臂软组织挫伤
- B、 尺神经损伤
- C、 尺桡骨双骨折
- D、 桡骨骨折
- E、 尺骨骨折

答案：C

13、 青年男性, 1 小时前打篮球时扭伤右脚, 疼痛明显。查体: 右踝部肿胀明显, 压痛, X 线检查: 右外踝横行骨折线, 内踝为外下至内上斜型骨折线, 移位均不明显, 具体治疗方法是()。

- A、 足内翻石膏托固定
- B、 足外翻石膏托固定
- C、 足中立位石膏托固定
- D、 足背伸位石膏托固定
- E、 足掌屈位石膏托固定

答案：B

14、 锁骨骨折可发生的合并损伤, 是()。

- A、 颈 2、3 神经根
- B、 胸锁乳突肌
- C、 副神经损伤
- D、 膈神经损伤
- E、 臂丛神经损伤

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/308103014110006075>