专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年甘肃省玉门市《执业药师之西药学综合知识与技能》考试真题含答案（预热题）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.归属专业学术机构网站的是

A: www.merck.com

B: www.cmt.tom.cn

C: www.googl

D: www.ashp.org

答案：D

2.（2015年真题）他汀类药物引起的典型药源性疾病是（）。

A: 血液系统疾病

B: 神经系统疾病

C: 胃肠类疾病

D: 肝病

答案：D

3.服用胃动力药多潘立酮治疗消化不良，最佳用药时间是

A: 餐后1小时

B: 餐前0.5～1小时

C: 餐后

D: 餐前

答案：B

4.哺乳期妇女应用下列药物会对乳婴产生何种不良影响,过量维生素D

A: 可引起过期妊娠、产程过长和产后出血

B: 可能引起乳婴视神经损害、智力障碍

C: 可能致胎儿畸形

D: 导致新生儿血钙过高

答案：D

5.药物警戒信号通过评价后，将事前检出的信号归类，提示有潜在的风险，需要继续密切监测的信号属于

A: 尚不确定的信号

B: 驳倒的信号

C: 确认的信号

D: 部分确认的信号

答案：A

6.患者，女，64岁，患2型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片0.5gtidpo，瑞格列奈片1mgtidpo，阿托伐他汀钙片20mgqdpo等药物治疗。

A: 每3～5天调整1次

B: 每次调整1～4单位

C: 开启使用中的低精蛋白锌胰岛素必须放入冷藏保存

D: 根据血糖水平调整低精蛋白锌胰岛素用量

答案：C

7.有明确的风险，有必要采取措施以降低风险；评判为

A: 待验证

B: 验证

C: 确认

D: 驳倒

答案：C

8.（2017年真题）缺铁性贫血患者常表现为（）

A: 血红蛋白减少

B: 红细胞增多

C: 嗜酸性粒细胞增多

D: 中性粒细胞增多

答案：A

9.若空腹服药，则胃排空较快，药物在短时间内可进入十二指肠与小肠。餐后服用可延缓胃排空，使药物在胃中较充分地吸收，且能够减少或避免药物对胃黏膜的刺激。因此，许多药品适宜餐后服用。

A: 餐中服用

B: 清晨服用

C: 餐前服用

D: 餐后服用

答案：A

10.可加重老年人慢性便秘的药物是

A: 氯丙嗪

B: 麻黄碱

C: H

D: 异丙嗪

答案：D

11.（2015年真题）患者，男，64岁，身高174cm，体重92kg。既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊，临床处方，阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

A: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、阿司匹林肠溶片

B: 特拉唑嗪片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片

C: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、单硝酸异山梨酯注射液

D: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、辛伐他汀片

答案：C

12.应用抗生素头孢哌酮时宜

A: 少食盐

B: 少食醋

C: 不吸烟

D: 不饮酒

答案：D

13.患者，女，50岁，体重60kg，因咳嗽、咳痰伴发热就诊，查体：体温38.5℃、双肺可闻及湿性啰音，查血常规提示：WBC12.4×10

A: 首剂1片，此后每24小时半片

B: 1片半qd

C: 1片qd

D: 半片qd

答案：A

14.（2017年真题）下列药物使用方式,正确的是（）

A: 乙酰半胱氨酸泡腾片用100ml温开水浸泡溶解后服用

B: 酵母片在餐后整片用水送服

C: 氧氟沙星滴眼液打开使用后,继续使用 3 个月

D: 硝酸甘油片在心绞痛发作的紧急情况下嚼碎用冰水送服

答案：A

15.普萘洛尔的别名是

A：心得安

B：安痛定

C：消心痛

D：心痛定

答案：A

16.治疗窗窄以及代谢存在较大个体差异的药物是（）

A：苯妥英钠

B：顺铂

C：茶碱

D：地高辛

答案：C

17.属于非核苷酸类HIV逆转录酶抑制剂的是

A：奈韦拉平

B：沙奎那韦

C：扎西他滨

D：恩夫韦替

答案：A

18.有关胰岛素的使用注意事项，错误的是

A：未开封时需冷处贮存，开封后室温贮存

B：经常变换注射部位，两次注射点要间隔2cm

C：冷冻后的胰岛素经室温放置融化后，可继续使用

D：使用中的胰岛素笔芯不宜冷藏，在室温下最长可保存4～6周

答案：C

19.用体重计算年长儿童的剂量时，一般应选择

A：剂量的上限

B：剂量的1/3

C：剂量的下限

D：剂量的1/2

答案：C

20.新生儿应用氯霉素可引起

A：核黄疸

B：高胆红素血症

C：灰婴综合征

D：新生儿溶血

答案：C

21.慢性沙眼患者禁用的药品是

A：利福平滴眼剂

B：酞丁安滴眼剂

C：醋酸可的松滴眼剂

D：硫酸锌滴眼剂

答案：C

22.洋地黄中毒的特征性表现为

A：恶心

B：视力模糊

C：快速房性心律失常伴传导阻滞

D：黄视、绿视

答案：C

23.轻度药品不良反应是指

A: 指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害

B: 指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害

C: 指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无须治疗

D: 没有临床症状，无须治疗

答案：C

24.根据英国 Cochrane 中心联合循证医学和临床流行病学专家共同制定的循证医学证据分级标准，同质病例对照研究的系统评价在循证医学评价中的证据级别属于

A: Ⅱa 级

B: Ⅲa 级

C: Ⅴ级

D: Ⅰa 级

答案：B

25.二甲双胍用于非 2 型糖尿病减肥

A: 超适应症给药

B: 盲目联合用药

C: 有禁忌症用药

D: 撒网式给药

答案：A

26.用于评估癌痛患者疼痛程度的是()

A: Cochrane 证据分级

B: 数字评分法

C：CTP评分标准

D：APACHE评分系统

答案：B

27.能显示药师的文献评价能力和技巧的是

A：对问题进行确定并归类

B：形成答案并以口头形式提供给询问者

C：对查阅的资料进行评价、分析和整理

D：随访了解效果，并建立档案

答案：C

28.服用环孢素不宜同食

A：葡萄柚汁

B：高蛋白食物

C：食醋

D：咖啡

答案：A

29.会干扰乙醇代谢过程导致双硫仑样反应,用药期间不宜饮酒的药物是()

A：阿奇霉素

B：阿司匹林

C：甲硝唑

D：对乙酰氨基酚

答案：C

30.摄入过多可导致甲状腺功能亢进症的药物是

A：甲巯咪唑

B: 胺碘酮

C: 丙硫氧嘧啶

D: 碳酸锂

答案：B

31.可作为急性胰腺炎的症状指标是

A: 淀粉酶升高

B: 淀粉酶降低

C: 磷酸激酶降低

D: 磷酸激酶升高

答案：A

32.生理盐水系将 0.9g 氯化钠加入水中配制成 100ml 而得。依百分浓度表示法该溶液属于

A: 重量体积比百分浓度

B: 摩尔浓度

C: 比例浓度

D: 体积比体积百分浓度

答案：A

33.噻托溴铵平喘的主要机制是

A: 拮抗 M 胆碱受体

B: 阻断腺苷受体

C: 抑制白三烯受体

D: 激动肾上腺素 β2 受体

答案：A

34.患者，女，30 岁。患先兆子痫，以硫酸镁治疗，适宜的给药途径是

A：吸入给药

B：直肠给药

C：口服给药

D：静脉注射

答案：D

35.服用后可引起多尿驾驶员应慎用的药物是()

A：吲达帕胺

B：氯苯那敏

C：阿司匹林

D：胰酶

答案：A

36.（2016年真题）患者，男，46岁，因心绞痛伴房颤，给予维拉帕米治疗。维拉帕米的禁忌症是（）。

A：双侧肾动脉狭窄

B：痛风

C：心力衰竭

D：冠心病

答案：C

37.给予非甾体解热镇痛药的依据是

A：腹膜透析容易丢失水溶性维生素

B：有助于合成红细胞

C：透析患者会出现骨和关节疼痛或头痛

D：肾脏功能发生衰竭时缺乏活性形式的维生素D

答案：C

38.药师应对“患者投诉”，下列说法不正确的是

A：接待者应举止大方，行为端庄

B：尽快将投诉人带离现场

C：当事人需要亲自接待

D：保存有形证据

答案：C

39.无特殊的解救药，应用利尿剂促进排泄的药物是()。

A：阿托品

B：卡马西平

C：乙酰胺

D：毒扁豆碱

答案：B

40.（2018年真题）患者,女,49岁,近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊,临床诊断为下呼吸道细菌性感染,处方如下：

A：氨溴索片给药剂量不合理

B：阿司匹林泡腾片给药剂量不合理

C：维生素C片用法用量不合理

D：左氧氟沙星片给药间隔不合理

答案：D

41.（2016年真题）患者，女，5岁，体重25kg。两天前受凉后发热，最高体温38.9℃，并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

A：酚麻美敏口服液与对乙酰氨基酚混悬滴剂都含有对乙酰氨基酚，应避免重复用药

B：酚麻美敏口服液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分对乙酰氨基酚，应避免重复用药

C：酚麻美敏口服液与盐酸麻黄碱滴鼻液含有相同成分，应避免重复用药

D：酚麻美敏口服液与小儿氨酚黄那敏颗粒含有相同成分氯苯那敏，应避免重复用药

答案：C

42.患者，男，72岁，以“间断发热、纳差、精神抑郁半年，再发高热1天”为主诉入院，既往体健，无高血压、糖尿病、冠心病史。入院时查体：T36.9℃，P88次/分，R22次/分，BP112/77mmHg，可触及颈部、锁骨上、腋下多部位浅表淋巴结肿大。经实验室检查、影像学检查，确诊为非霍奇金淋巴瘤。

A：顺铂+利妥昔单抗+格拉司琼+芬太尼

B：环磷酰胺+阿霉素+长春新碱+泼尼松

C：伊立替康+环磷酰胺+甲氨蝶呤+地塞米松

D：紫杉醇+吉非替尼+环磷酰胺+美司钠

答案：B

43.血小板计数正常值范围是（/L）

A：（50～100）×109

B：（200～250）×1012

C：（150～200）×1012

D：（100～300）×109

答案：D

44.适用于有完整子宫、绝经后期不希望有月经样出血的妇女()

A：雌孕激素序贯用药

B：单纯雌激素补充治疗

C：单纯孕激素补充治疗

D：雌孕激素连续联合用药

答案：D

45.能刺激骨骼、肌肉和组织生长发育的是

A：麻醉药品

B：利尿剂

C：蛋白同化激素

D：肽类激素

答案：D

46.提示有潜在的风险，需要继续密切监测的信号属于

A：驳倒的信号

B：尚不确定的信号

C：部分确认信号

D：确认的信号

答案：B

47.丙烯腈、氟化物、一氧化碳、重金属等中毒的特殊解毒剂

A：谷胱甘肽

B：纳洛酮

C：二巯丁二钠

D：乙酰半胱氨酸

答案：A

48.人体的生物钟规律即指在人体内调控某些生化、生理和行为现象有节奏地出现的生理机制，很多药物的作用和毒性、不良反应与人体的生物节律(生物钟)有着极其密切的关系，同一种药物在同等剂量可因给药时间不同而产生不同的作用和疗效。

A: 抗抑郁药

B: 平喘药

C: 调节血脂药

D: 抗过敏药

答案：A

49.作为退热首选药，尤其适用于老年人和儿童的药品是

A: 布洛芬胶囊

B: 对乙酰氨基酚片

C: 贝诺酯片

D: 阿苯片

答案：B

50.可引起血清尿素氮降低的是

A: 胃溃疡

B: 慢性肾炎

C: 中毒性肝炎

D: 急性胰腺炎

答案：C

51.肝脏具有十分重要和复杂的生理功能。首先是人体内各种物质代谢和加工的中枢，其次是有生物转化和解毒功能，所有进入人体的药物或毒物，都会在肝脏发生氧化、还原、水解、结合等化学反应，最后以原形药或代谢物的形式排出体外。

A：糖尿病

B：急性胰腺炎

C: 缺铁性贫血

D: 肝硬化

答案：D

52.能监测用药过程中错误的真实发生率的方法是

A: 计算机检测方法

B: 直接观察

C: 岗位工作问责

D: 病历审查

答案：B

53.痛风患者急性关节炎期间常见单个关节出现红、肿、热、痛，最常见的病变部位是

A: 第一跖趾关节

B: 腰椎关节

C: 胸椎关节

D: 颈椎关节

答案：A

54.可能影D向儿童骨骼发育的药物是

A: 头孢克洛

B: 阿莫西林

C: 华法林

D: 诺氟沙星

答案：D

55.患者，男，35岁，髋关节置换术后7天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

A：下肢深静脉血栓形成

B：病理性骨折

C：肺动脉栓塞

D：下肢动脉栓塞

答案：A

56.肝功能不全者服用由肝脏清除，但并无明显毒性反应的药物时

A：一般无需调整剂量

B：必须减量应用

C：避免使用

D：须谨慎使用，必要时减量给药

答案：D

57.必须立即用清水冲洗至少5分钟的是

A：皮肤污染酚类毒物

B：眼内污染毒物

C：眼内进入固体腐蚀性颗粒

D：毛发被毒物污染

答案：B

58.（2017年真题）患者,男,80岁,因发热、咳嗽、咳痰2天就诊诊断为社区获得性肺炎,给予左氧氟沙星、甘草合剂、氨溴索、对乙酰氨基酚、维生素C等治疗。患者用药3天后出现失眠、烦躁不安等症状最可能引起该症状的药物是（）

A：甘草合剂

B：氨溴索

C：左氧氟沙星

D：对乙酰氨基酚

答案：C

59.菌群失调性腹泻常见的病因是

A：肠道正常细菌的数量或比例失去平衡

B：直肠或结肠溃疡、肿瘤或炎症

C：外界的各种刺激，如受寒、过食辛辣食物等

D：细菌、真菌、病毒、寄生虫感染

答案：A

60.引起视网膜变性而致失明，服药半年左右应查眼底的DMARDs是

A：硫唑嘌呤

B：环孢素

C：利妥昔单抗

D：氯喹

答案：D

61.剧烈频繁干咳宜选用的药物是

A：多奈哌齐

B：阿司匹林

C：吗啡

D：可待因

答案：D

62.服药后饮水可能会引起水潴留的药物是

A：抗利尿药

B：利胆药

C：抗尿结石药

D：苦味健胃药

答案：A

63.环磷酰胺可引起

A：末梢神经炎

B：心脏毒性

C：出血性膀胱炎

D：溶血性尿毒症

答案：C

64.支气管哮喘急性发作期(轻度)可选用的药物是

A：孟鲁司特

B：沙丁胺醇

C：异丙托溴铵

D：沙美特罗

答案：B

65.“室温”所指温度范围是

A：30℃～40℃

B：-5℃～10℃

C：2℃～10℃

D：10℃～30℃

答案：D

66.骨髓造血功能较为活跃，某些药物可引起贫血、粒细胞减少、过敏性紫癜等

A：运动系统

B：水盐代谢

C：内分泌系统

D: 血液系统

答案：D

67.以下所列药物中，使用不当可能导致新生儿发生核黄疸的是

A: 维生素C

B: 苯妥英钠

C: 磺胺类药

D: 吲哚美辛

答案：C

68.可引起排尿困难，尿潴留患者禁用的药物是

A: 阿米替林

B: 奥美拉唑

C: 法莫替丁

D: 加兰他敏

答案：A

69.用于治疗前列腺增生症的高选择性a1A受体阻断剂为

A: 特拉唑嗪

B: 坦索罗辛

C: 托特罗定

D: 索利那新

答案：B

70.香豆素类杀鼠药中毒呈现

A: 出血、凝血时间延长

B: 抽搐、进行性加重

C: 恶心、呕吐、口内有金属味

D: 呼出气体中可有苦杏仁气味

答案：A

71.混合型高脂血症，首选的治疗药物是

A: 贝特类

B: ω-3脂肪酸制剂

C: 烟酸类

D: 他汀类

答案：D

72.属于癌痛治疗第三阶梯的止痛药物为

A: 可待因

B: 曲马多

C: 羟考酮

D: 对乙酰氨基酚

答案：C

73.牙痛等轻度疼痛宜选用的药物是

A: 吗啡

B: 可待因

C: 阿司匹林

D: 多奈哌齐

答案：C

74.根据时辰药理学，选择最适宜的给药时间，可增强药物疗效、避免不良反应、提高用药依从性避免导致肾上腺皮质功能下降的是

A: 清晨服糖皮质激素

B: 清晨服氨基糖苷类

C: 清晨服抗抑郁药

D: 清晨服利尿药

答案：A

75.患者，女，50岁，体重60kg，因咳嗽、咳痰伴发热就诊，查体：体温38.5℃、双肺可闻及湿性啰音，查血常规提示：WBC12.4×10

A: 1.5片qd

B: 1/2片qd

C: 1片qd

D: 1片bid

答案：C

76.维生素C用于

A: 习惯性流产的辅助治疗

B: 防治坏血病

C: 防治佝偻病

D: 防治夜盲症

答案：B

77.振奋精神增加供氧能力的兴奋剂是

A: 甲睾酮

B: 苯丙胺

C: 阿托品

D: 呋塞米

答案：B

78.可能导致γ-谷氨酰转移酶升高的药物是

A: 氯氮平

B：阿司匹林

C：苯妥英钠

D：胰岛素

答案：C

79.静脉滴注给予万古霉素，滴注时间应该控制的时间是

A：1小时以上

B：4小时以上

C：6小时以上

D：2小时以上

答案：D

80.下列药物中属于弱阿片类药物的为（）

A：哌替啶

B：吗啡

C：羟考酮

D：可待因

答案：D

81.由护士双人核对监测

A：医师处方差错

B：药师调配处方差错

C：患者执行医嘱差错

D：护士执行医嘱差错

答案：D

82.新生儿白细胞计数的正常范围值

A：（15.0～20.0）×109/L

B: （10.0～20.0）×109/L

C: （3.5～10.0）×109/L

D: （11.0～12.0）×109/L

答案：A

83.下列选项中，关于老年人药动学方面的改变的叙述，错误的是()。

A: 肝微粒体酶系的活性降低，肝脏代谢药物能力下降，药物血浆半衰期延长

B: 肝细胞合成白蛋白的能力降低，某些易与血浆蛋白结合的药物游离型浓度增高

C: 脂肪组织增加而总体液及非脂肪组织减少，某些药物分布容积减小

D: 胃酸分泌减少，一些酸性药物解离减少，吸收增加

答案：D

84.胰岛素的给药时间适宜餐前5~10分钟给药的胰岛素制剂种类是

A: 赖脯胰岛素

B: 精蛋白锌胰岛素

C: 门冬胰岛素

D: 普通胰岛素

答案：C

85.按上述方案治疗3个月后,查空腹血糖7.5mmo|/L,餐后血糖12.2mmo/L糖化血红蛋白7.0%。该患者经常出差,进食不规律,希望选择每日使用一次的降糖药。宜选用的药物是（）

A: 二甲双胍片

B: 阿卡波糖片

C: 瑞格列奈片

D: 格列美脲片

答案：D

86.患者接受索拉非尼治疗时，药师应重点监测的不良反应是（）

A：心脏毒性

B：肝脏毒性

C：生殖系统毒性

D：肺纤维化

答案：C

87.中成药舒筋活络酒具有祛风除湿、活血通络、养阴生津的功效，与其合用可加强对中枢神经系统抑制作用的药物是

A：甲氧氯普胺

B：氯苯那敏

C：地高辛

D：复方利血平

答案：B

88.已知对乙酰氨基酚的成人剂量为一次400mg。一个体重为10kg的11个月大的婴儿感冒发热，按体表面积计算该患儿的处方剂量应为

A：75mg

B：90mg

C：50mg

D：100mg

答案：D

89.“1天给药1次；如需要立即达到治疗浓度，可首剂加倍”是针对

A：半衰期小于30分钟的药品

B：半衰期大于 24 小时的药品

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/308143104043007022