机场急救中心理论考核试题

一、选择题

1 抽搐的病因中，属于全身非感染性疾病的是（）［单选题］*

A、败血症

B、狂犬病

C、破伤风

D、代谢性疾病 √

2 .抽搐伴脑膜刺激征见于（）［单选题］*

A、狂犬病

B、病毒性肝炎

C、癫痫大发作

D、蛛网膜下腔出血 √

3 .患者抽搐发作时操作正确的是（）［单选题］*

A、放入开口器，解开衣扣裤带 V

B、取仰卧，位头偏向 T 则低

C、抽搐时按压肢体

D、不必限制

4 .惊厥伴脑功能障碍见于（）［单选题］*

A、破伤风

B、药物中毒

C、癫痫

D、低钙血症 √

5 .多发性抽搐症的好发年龄为（） [单选题] *

A、1-2 岁

B、2-12 岁 2

C、3-4 岁

D、5-6 岁

6 .抽搐造成缺氧，应及时给氧，减轻脑损伤，一般采取鼻导管，氧流量为（） [单选题] *

A、1-2l/min√

B、3-4l/min

C、5-6l/min

D、3-5l/min

7 .癫痫持续状态判断的标准之一，是指一次发作的时间至少超过（） [单选题] *

A、10 分钟

B、15 分钟

C、25 分钟

D30 分钟 √

8 .世界卫生组织新规定的高血压诊断标准是收缩压/舒张压大于或等于（）（） [单选题] *

A、140/90mmHg

B、150/90mmHg

C、160/90mmHg

D、170/95mmHg√

9 .患者男性，45 岁，护士为其测得的血压值为 145⁄95mmHg ,该患者的血压属于（）［单选题］*

A、理想血压

B、正常血压

C、临界高血压

D、高血压√

10 .预防高血压病应该（） ［单选题］*

A、不与高血压病人接触

B、合理膳食、适量运动√

C、戒烟限酒

D、多食补品

I1 下列哪项不是缓解高血压的有效措施?。（）［单选题］*

A、合理膳食

B、戒烟限酒

C、保持心理平衡

D、适量有规律的无氧运动√

12 .在引起高血压的危险因素中，哪些是不可以改变的（1（） ［单选题］*

A、年龄√

B、饮酒

C、吸烟

D、肥胖

13 .下面哪一种饮食习惯容易导致高血压？（） ［单选题］*

A、咸鱼肥肉√

B、低盐饮食

C、不吸烟少饮酒

D、常吃蔬菜水果

14 .家庭高血压急症一时不能送医院，下列哪些急救方法错误？（） [单选题] *

A、拨打 120 急救电话

B、心痛定 1~2 片舌下含服

C、头高脚低坐或卧位

D、背在背上往医院跑 √

15 .下列说法正确的是（） [单选题] *

A、血压控制下来，就不用服药了

B、不能长时间服用某种降压药，不然就不管用了

C、降压药可以联合在一起用 √

D、吃药发生副作用就不能服用了

16 .高血压早期病理变化主要是（） [单选题] *

A、早期出现动脉内膜增生，管腔变窄

B.高血压出现即有各脏器缺血改变

C、周身细小动脉痉挛 V

D、动脉内膜钙化

17 .原发性高血压急症患者，首选的降压药是：（） [单选题] *

A、硝酸甘油

B、氢氯睡嗪

C、硝普钠 √

D、阿替洛尔

E、利舍平

18 .癫痫的主要发病机制（） [单选题] *

A、循环血量不足导致血压急剧下降

B、心率失常或急性心腔排除受阻导致心排血量锐减

C、严重脑血管蔽塞性病变引起全脑供血不足

D、严重贫血√

E、大脑神经元过度异常放电引起的短暂神经功能障碍

19 .癫痫患者服药最不应（） [单选题] *

A、服药量太少

B、两药同时服

C、在夜间服药

D、服药次数太少

E、突然停药 V

20 .癫痫患者的首选检测是什么（） [单选题] *

A、脑电图√

B、头颅 CT

C、头颅 MRI

D、脑脊液穿刺

E、X 线

21 .治疗癫痫的持续状态的首选药物是（） [单选题] *

A、苯妥英钠，缓慢静脉注射

B、异戊巴比妥钠，缓慢静脉注射

C、副醛，缓慢静脉注射

D、10% 水合氯醛，保留灌肠

E、地西泮，缓慢静脉注射 √

22 .以下哪项不属于影响癫痫发作因素（）［单选题］*

A、发热

B、失眠

C、疲劳

D 年龄 V

E、性别

23 .癫痫持续状态必须是（）［单选题］*

A、全面强直-阵发作频繁发生，持续 24 小时

B、连续的失神发作

C、局部抽搐持续数小时或数日

D、发作自一处开始，按大脑皮质运动区逐渐扩展

E、全面强直-阵挛发作频繁发生，伴意识持续不清 √

24 .特发性全面强直-阵挛发作，首选药物为（）［单选题］*

A、丙戊酸钠 √

B、卡马西平

C、苯妥英钠

D、已琥胺

E、苯巴比妥

25 .尿失禁最常见于癫痫（）［单选题］*

A、全面性强直-阵挛性发作 √

B、失神发作

C、部分性发作

D、精神运动性发作

E、自主神经性发作

26 .苯妥英钠对癫痫疗效最好的类型是（）［单选题］*

A、小发作

B、大发作

C、精神运动性发作 V

D、间脑发作

E、婴 J 隆挛

27 .患者，男性，29 岁。因突然发作性全身抽搐，口吐白沫，大小便失禁入院，既往有癫痫病史，针对患者进行健康教育指导，叙述错误的是（）［单选题］*

A.生活有规律，劳逸结合

B、不能从事攀高、驾驶等工作

C、癫痫停止发作 3 个月后及时停药 √

D、随身携带有患者姓名住址、联系电话的个人卡片

E、定期复查血常规、肝肾功能

28 .一氧化碳中毒的主要依据（）［单选题］*

A、煤气泄漏

B、意识障碍

C、皮肤、黏膜发组 √

D、血液碳氧血红蛋白浓度升高

E、血氧饱和度下降

29 .一氧化碳中毒最好的氧疗措施是（） [单选题] *

A、持续低流量吸氧

B、间歇高流量吸氧

C、氧气湿化瓶内加酒精

D、静脉注射双氧水

E、高压氧 √

30 .一氧化碳中毒患者发生昏迷应尽早给予:（） [单选题] *

A、高压氧治疗 √

B、低流量氧治疗

C、鼻导管吸氧

D、脱水降卢页内压

E、盐皮质激素

31 .一氧化碳中毒时最容易遭受损害的脏器是:（） [单选题] *

A、肺和脑

B、脑和心脏 V

C、肝和肾

D、胰腺

E、肾和肺

32 .中度中毒时血液碳氧血红蛋白浓度为（） [单选题] *

A、10%~20%

B、20%~30%

C、25%~3O%

D、30%~40% √

E、50% 以上

33 .一氧化碳中毒首选的抢救措施为（）［单选题］*

A、应用脱水剂

B、使用利尿剂

C、使用高压氧舱 V

D、迅速脱离中毒环境

E、应用呼吸中枢兴奋剂

34 .关于社区开展预防一氧化碳中毒的健康教育，正确的叙述是（）［单选题］*

A、关闭门窗

B、煤气淋浴器安装在浴室里

C、定期检查管道安全 V

D、使用不带有自动熄火装置的煤灶

E、通气开关可长期开放

35 .预防一氧化碳中毒错误做法为（） ［单选题］*

A、多开门窗

B、煤气淋浴器安装在浴室外

C、定期检查管道安全

D、使用带有自动熄火装置的煤灶

V

36 .口唇呈樱桃红色、意识丧失，常提示（ [单选题] *

A、有机磷农药中毒

B、阿托品中毒

C、铅中毒

D、氯丙嗪中毒

E、一氧化碳中毒 √

37 .患者女性,58岁。因煤气中毒 1 天后入院,深昏迷休克尿少血 血压:80/50mmHg, 急性一氧化碳中毒的病情属哪一度中毒（） [单选题] *

A、重度中毒 √

B、中度中毒

C、轻度中毒

D、慢性中毒

E、极度中毒

38 .具备以下（） 哪些症状即可以临床诊断急性酒精中毒？（） [单选题] *

A、明确的过量酒精或含酒精饮料摄入史

B、呼出气体或者呕吐物有酒精气味

C、出现较深的意识障碍

D、以上全对 √

39 .长期饮酒的危害包括（） [单选题] *

A、营养不良、胃炎

C、记忆力减退智力下降

D、以上全对 √

40 .下列关于酒精中毒患者的护理，错误的是？（）［单选题］*

A、保持呼吸道通畅

B、观察意识状态、瞳孔及生命体征的变换

C、不能对患者使用保护性约束 V

D、按医嘱尽快使用纳洛酮

E、适当提高室温，加盖棉被等保暖措施并补充能量

41 .急性酒精中毒躁动不安、过度兴奋者禁用药不包括（）［单选题］*

A、吗啡

B、氯丙嗪

C、纳洛酮 √

D、苯巴比妥

42 .急性酒精中毒的特效解毒药（）［单选题］*

A、阿司匹林

B、纳洛酮 √

C、氯毗格雷

D、肾上腺素

43 .大部分酒精主要经过人体那部分吸收（）［单选题］*

A、胃

B、小肠上段 √

C、大肠

. *

A、喝酒后半小时内,无呕吐，深度昏迷

B、喝酒后半小时到两小时，无呕吐，深度昏迷

C、无法判断是否服用其他药物，

45 .下列关于酒精中毒患者洗胃的说法正确的是（）[单选题]*

A、洗胃液越多越好

B、洗胃出现频繁呕吐时不应停止洗胃

C、洗胃时应避免误吸和胃损伤穿孔√

46 .一个神志不清的患者送入急诊室，呼气带有大蒜味，急查全血胆碱酶活力为 58% ,最可能的原因是（）[单选题]*

A、大量饮酒

B、糖尿病酮症酸中毒

C、有机磷农药中毒√

D、月干性躯 I 病

E、尿毒症

47 .患者男性 28 岁。参加同事聚会饮酒后，被送入医院，表现为呼吸慢而有鼾音，伴有呕吐，心率快，132 次/分，血压 1 l（400mg/d 1）,处于昏迷状态，患者护士应该首先考虑的护理措施是（）[单选题]*

A、测量体温

B、催吐

C、注意保暖

E、保持呼吸道通畅 V

. 78 岁。饮用红酒 600m1 后出现脸色潮红，轻微眩晕，语言增多，诊断为酒精中毒，下列措施对酒精中毒无效的是() [单选题] *

A、静推纳洛酮

B、静推利尿剂

C、静推抗生素 √

D、静脉滴注维生素

E、静滴电解质

49 .患者男性，46 岁。饮酒史近 20 年，昨天与同事一起饮白酒约 400m1，出现明显的烦躁、过度兴奋状。针对目前患者的状况，可选用的冷静药物是() [单选题] *

A、小剂量地西泮 √

B、吗啡

C、氯丙嗪

D、苯巴比妥类

E、水合氯醛

50 .患者男性，45 岁，昨晚聚会饮酒陷入昏迷状态，心率 130 次/分，血压 ,呼吸慢而有鼾音。处于严重酒精中毒状态，血液透析可以促使体内乙醇排出。透析指征是：当血乙醇含量到达() [单选题] *

A$_x$＞108mmo1 〆(500mg⁄d 1) √

B、＜54mmo1 〆(250mg⁄d 1)

C、＞87mmo1 〆(400mg⁄d 1)

D、＜108108mmo1 〆(500mg⁄d 1)

E、＜87mmo1 〆（400mg⁄d 1）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/315120320321011330