

2024 江西省樟树市《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题大全含答案（实用）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2016 年真题）属于 5α 受体还原酶抑制剂的抗良性前列腺增生症的药品是

- A: 酚妥拉明
- B: 特拉唑嗪
- C: 度他雄胺
- D: 普适秦

答案：C

2. 患者，男，62 岁。高血压病史 10 年，既往有骨关节炎和血脂异常，轻度心功能不全。近期体检发现血压 162/80mmHg，心率 72 次/分。该患者日前服用的药物处抗高血压药外有辛伐他汀、双氯芬酸、氨基葡萄糖、甲钴胺及碳酸钙 D。

- A: 氢氯噻嗪
- B: 特拉唑嗪
- C: 美托洛尔
- D: 双氯芬酸

答案：A

3. 属于 II 类抗心律失常药且能引起金鸡纳反应的是（）

- A: 利多卡因
- B: 普萘洛尔

C: 胺碘酮

D: 奎尼丁

答案: D

4. 门冬酰胺酶能抑制蛋白质的合成，使细胞停止于()，从而降低其对甲氨蝶呤的敏感性，限制甲氨蝶呤的骨髓毒性

A: G

B: G

C: M 期

D: G

答案: D

5. 治疗肺孢子菌肺病的首选药物的是()

A: 磺胺米隆

B: 复方磺胺甲噁唑

C: 磺胺嘧啶

D: 柳氮磺吡啶

答案: B

6. 患者，女，12 岁，身高 140cm，体重 32kg，因"脊柱侧弯"入院。入院后完善相关检查，拟行"脊柱侧弯截骨矫形檀骨融合内固定术"。既往有头孢类过敏史。

A: 克林霉素

B: 依替米星

C: 左氧氟沙星

D: 阿奇霉素

答案: A

7. 很少单独缺乏，常伴其他维生素缺乏，大量服用可使尿液变黄，该物质是

- A: 精氨酸
- B: 维生素 AD
- C: 维生素 B2
- D: 维生素 C

答案：C

8. 有耳毒性的药物是

- A: 呋塞米
- B: 乙酰唑胺
- C: 氢氯噻嗪
- D: 螺内酯

答案：A

9. 患者，男，38 岁。因“发作性喘息”3 个月入院，发作时憋喘、全身大汗、端坐不能平卧，肺部可闻及哮鸣音。诊断为支气管哮喘，静脉滴注地塞米松。

- A: 异丙托溴铵
- B: 特布他林
- C: 氨茶碱
- D: 氟替卡松

答案：D

10. 对中、重度持续哮喘患者的长期维持治疗的推荐方案是

- A: 吸入性糖皮质激素+长效 β
- B: 长效 β
- C: 长效 M 胆碱受体阻断剂+白三烯受体阻断剂

D: 吸入性糖皮质激素+短效 β

答案：A

11. 应用强心苷期间或停用后 7 日内不宜使用的药物是

A: 枸橼酸钾

B: 氯化钾

C: 氯化钙

D: 氯化钠

答案：C

12. 下述药物中长期使用易产生耐受性的是()

A: β

B: 白三烯受体阻断药

C: 磷酸二酯酶抑制剂

D: M 受体拮抗剂

答案：A

13. 强效(使 LDL-ch 水平降低 $\geq 50\%$)的他汀类调血脂药是()

A: 小剂量阿托伐他汀

B: 依折麦布

C: 小剂量氟伐他汀

D: 大剂量阿托伐他汀

答案：D

14. (2017 年真题) 前庭功能失调(眩晕) ()

A: 哌拉西林

B: 左氧氟沙星

C: 米诺环素

D: 甲硝唑

答案: C

15. (2018 年真题) 患者, 女, 28 岁, 因 “多汗、心慌、消瘦、易怒半月余” 就诊, 实验室检查显示 FT4 和 FT3 均升高, TSH 降低, 甲状腺 I 度肿大, 心率 92 次/分, 诊断为 “甲状腺功能亢进症” 简称甲亢”。给予甲巯咪唑片 10mg, 一日 3 次盐酸普萘洛尔片 10mg, 日 3 次。患者 1 月后复查, FT3 和 FT4 恢复正常, 但出现膝关节疼痛。

A: 可以妊娠, 选择适当的抗甲状腺药物以最小剂量维持

B: 甲状腺激素水平恢复正常后即可停药准备妊娠

C: 妊娠期间应将甲状腺功能维持在正常下限

D: 不可停药妊娠, 应手术切除甲状腺后再准备妊娠

答案: A

16. 患者女, 55 岁。晨练时突发窦性心动过速, 症状持续不缓解, 紧急入院, 查体: 138 / 90mmHg, 心率 120 次 / 分, 眼压高, 医嘱普萘洛尔治疗。

A: 4 周

B: 3 周

C: 2 周

D: 1 周

答案: C

17. 关于镇咳药作用强度的比较, 正确的是

A: 喷托维林>苯丙哌林>可待因

B: 苯丙哌林>喷托维林>可待因

C: 苯丙哌林>可待因>喷托维林

D: 可待因>苯丙哌林>喷托维林

答案：C

18. 引起睫状肌麻痹，适用于治疗虹膜睫状体炎、检查眼底前的散瞳、验光配镜屈光度检查的药物是

- A: 阿托品
- B: 20%甘露醇
- C: 碘苷
- D: 奥布卡因

答案：A

19. （2021 年真题）可致超敏反应综合征（AHS），推荐用药前做 HLA-B*5801 基因筛查的抗痛风药物是（）

- A: 非布司他
- B: 苯溴马隆
- C: 别嘌醇
- D: 秋水仙碱

答案：C

20. 哮喘急性发作首选的治疗药物是

- A: 白三烯受体阻断剂
- B: 吸入性糖皮质激素
- C: 短效 β_2 受体激动剂
- D: 磷酸二酯酶抑制剂

答案：C

21. 作用于细菌二氢叶酸还原酶而发挥作用的抗菌药物是

- A: 磺胺甲唑
- B: 甲氧苄啶

C: 利奈唑胺

D: 呋喃妥因

答案：B

22. 用于功能性子宫出血、妊娠早期先兆流产、习惯性流产的是

A: 噻啉啉

B: 硝苯地平

C: 绒促性素

D: 米非司酮

答案：C

23. (2018 年真题) 关于钙通道阻滞剂 (CCB 类) 药物的说法, 错误的是 ()

A: 对既往有脑卒中病史的老年高血压患者, 优先选择 CCB 类降压药

B: CCB 类对冠状动脉痉挛所致的变异型心绞痛无效

C: CCB 类主要扩张小动脉, 对小静脉和毛细血管作用较小, 可导致下肢或脚踝水肿

D: 红霉素可显著增加硝苯地平或非洛地平的生物利用度

答案：B

24. 与醛固酮受体竞争性结合, 拮抗醛固酮作用的保钾排钠药物是

A: 乙酰唑胺

B: 螺内酯

C: 甘露醇

D: 氨苯蝶啶

答案：B

25. 容易引起视神经炎的抗结核药物是

- A: 异烟肼
- B: 链霉素
- C: 乙胺丁醇
- D: 利福平

答案：C

26. 下述关于抗皮肤寄生虫感染药物的描述中，不正确的是()

- A: 克罗米通具有局部麻醉作用
- B: 升华硫具有杀灭细菌、真菌及寄生虫的作用
- C: 林旦是杀灭疥虫的有效药物，但不能灭虱卵
- D: 苯甲酸苄酯高浓度可杀灭疥虫

答案：C

27. 通过激动胰高血糖素样肽-1 受体降低血糖的药物

- A: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素
- B: 二甲双胍
- C: 艾塞那肽
- D: 胰岛素皮下注射

答案：C

28. 治疗重型幼年型糖尿病的是

- A: 胰岛素
- B: 二甲双胍
- C: A 和 B 均无效
- D: 磺酰脲类

答案：A

29. 甲状腺功能亢进的内科治疗宜选用

- A: 大剂量碘
- B: 甲状腺素
- C: 小剂量碘
- D: 甲巯咪唑

答案：D

30. 属于白三烯受体阻断剂的是

- A: 乙酰半胱氨酸
- B: 奥关拉唑
- C: 右美沙芬
- D: 孟鲁司特

答案：D

31. 雷尼替丁用于治疗消化性溃疡的机制是

- A: 直接中和胃酸
- B: 竞争性拮抗 H₂ 受体
- C: 抑制胃壁细胞 H⁺，K⁺-ATP 酶
- D: 竞争性拮抗 H₁ 受体

答案：B

32. 静脉注射可出现舌头麻木及口内特殊气味的是

- A: 左氧氟沙星
- B: 氯霉素
- C: 四环素
- D: 青霉素

答案：A

33. 红霉素易被胃酸破坏，口服吸收少，故临床一般服用其肠衣片或酯化物。

- A: 万古霉素
- B: 罗红霉素
- C: 克拉霉素
- D: 红霉素

答案：D

34. 患者，男，35 岁，农民。感觉头昏乏力入院。查体：粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白 60g/L，诊断为钩虫感染、缺铁性贫血。

- A: 硫酸亚铁
- B: 琥珀酸亚铁
- C: 蔗糖铁
- D: 叶酸

答案：C

35. 使用后可出现口腔苦味

- A: 氯霉素
- B: 更昔洛韦
- C: 四环素可的松
- D: 利巴韦林

答案：A

36. (2018 年真题) 关于奥司他韦作用特点的说法, 错误的是 ()

- A: 1 岁以上儿童可以使用奥司他韦
- B: 应严格掌握奥司他韦适应证, 不能用于流感的预防
- C: 治疗流感时, 首次使用奥同他韦应当在流感症状出现后的 36 小时以内

D: 奥司他韦可用于甲型和乙型流感的治疗

答案: B

37. 关于铂类药物的描述，下列说法错误的是

A: 广谱抗肿瘤药物

B: 细胞增殖周期非特异性抑制剂

C: 顺铂是结、直肠癌的首选药之一

D: 作用机制是破坏 DNA 的结构和功能

答案: C

38. 多柔比星

A: 干扰 RNA 转录

B: 直接破坏 DNA 结构和功能

C: 影响蛋白质合成和功能

D: 干扰核酸生物合成

答案: A

39. 长期使用糖皮质激素不会导致

A: 骨质疏松

B: 高血压

C: 糖尿病

D: 高钾血症

答案: D

40. 患者，女 52 岁，因“闭经 1 年，潮热、情绪波动严重失眠半年”就诊，临床诊断为“更年期综合征”。拟给予的药物治疗方案为：戊酸雌二醇片，每日 1 次，每次 1mg，醋酸甲羟孕酮片每日 1 次，每次 2mg。

A: 骨质疏松症

B: 泌尿系统感染四

C: 血栓性静脉炎

D: 血脂异常

答案：C

41. 解救大剂量甲氨蝶呤中毒

A: 氟他胺

B: 昂丹司琼

C: 地塞米松

D: 亚叶酸钙

答案：D

42. (2015 年真题) 李女士来到药房咨询，主诉最近服用下列药品后体重有所增加，请药师确认可能增加体重的药品是 ()。

A: 米氮平

B: 二甲双胍

C: 辛伐他汀

D: 阿司匹林

答案：A

43. 下列关于胺碘酮的叙述错误的是

A: 对室上性和室性心律失常均有效

B: 适用于合并器质性心脏病的心率失常

C: 可以用于窦房传导阻滞

D: 促心率失常反应少

答案：C

44. 关于治疗功能性胃肠病药的叙述，不正确的是

- A: 匹维溴铵为钡灌肠做准备时，应于检查前 3 日开始用药
- B: 匹维溴铵可用于对症治疗与胆道功能紊乱有关的疼痛
- C: 曲美布汀可使胃排空功能的减弱得到改善
- D: 匹维溴铵宜空腹吞服

答案：D

45. 阻断 H₂ 受体的药物是

- A: 雷尼替丁
- B: 哌仑西平
- C: 氢氧化铝
- D: 奥美拉唑

答案：A

46. 适用于合并有肾功能损害的高血压患者的药物是

- A: 多巴酚丁胺
- B: 维拉帕米
- C: 氯沙坦
- D: 卡维地洛

答案：C

47. （2015 年真题）属于 H₂ 受体阻断剂的是（ ）。

- A: 法莫替丁
- B: 多潘立酮
- C: 奥美拉唑
- D: 氯苯那敏

答案：A

48. (2021 年真题) 关于抗心力衰竭药物沙库巴曲缬沙坦的说法，错误的是 ()

- A: 与血管紧张素转换酶抑制剂 (ACEI) 合用具有协同作用
- B: 血钾水平 >5
- C: 通过抑制脑啡肽酶，同时阻断血管紧张素 II 的 1 型受体 (AT1) 起效
- D: 适用于射血分数降低的慢性心力衰竭 (NYHA II-IV 级，LVEF $\leq 40\%$) 成年患者

答案: A

49. 氯霉素的最严重的不良反应是

- A: 肝脏损害
- B: 胃肠道反应
- C: 二重感染
- D: 抑制骨髓造血功能

答案: D

50. 患儿，男，5 日。昨起拒食、反应差，今日皮肤明显黄染入院。体检：颈周、前胸多个小脓疱，心肺无异常，肝右肋下 2.5cm，脾肋下 1cm，诊断为新生儿败血症，给予头孢曲松治疗。

- A: 头孢噻肟
- B: 头孢他啶
- C: 阿莫西林
- D: 头孢唑林

答案: C

51. 作用于前列腺平滑肌，减轻膀胱出口梗阻的是 ()

- A: 吡达帕胺

B: 坦洛新

C: 西地那非

D: 普适泰

答案: B

52. 吡喹酮的抗虫作用首选用于

A: 蛔虫

B: 牛肉绦虫

C: 丝虫

D: 血吸虫

答案: D

53. 多巴胺受体阻断药的代表药物为()

A: 托烷司琼

B: 格雷司琼

C: 昂丹司琼

D: 甲氧氯普胺

答案: D

54. 用于抗艾滋病病毒的药物是

A: 利巴韦林

B: 更昔洛韦

C: 拉米夫定

D: 阿昔洛韦

答案: C

55. (2018 年真题) 不属于血管紧张素转换酶抑制剂 (ACEI) 类药物作用特点是 ()

- A: ACEI 禁用于双侧肾动脉狭窄者
- B: ACEI 可防治高血压患者心肌细胞肥大
- C: ACEI 对肾脏有保护作用
- D: ACEI 可引起反射性心率加快

答案：D

56. 氯丙嗪常见的不良反应

- A: 过敏反应
- B: 恶心、腹痛、腹泻、食欲减退
- C: 锥体外系反应
- D: 细胞缺氧、酸中毒、休克

答案：C

57. 患者,男,52岁,BMI28kg/m²,既往有动脉粥样硬化性心血管病、高尿酸血症、痛风病,患者诉昨晚8点起右大脚趾关节处疼痛难忍宜使用的药物是

- A: 秋水仙碱
- B: 别嘌醇
- C: 非布司他
- D: 碳酸氢钠

答案：A

58. 利福平联用伏立康唑使

- A: 肝毒性增加
- B: 月经不规则
- C: 疗效减弱
- D: 吸收减少

答案：C

59. 宜选用塞来昔布治疗的疾病是

- A: 痛风
- B: 肾绞痛
- C: 骨关节炎
- D: 胃溃疡

答案：C

60. 肾毒性大的是

- A: 头孢哌酮
- B: 阿莫西林
- C: 庆大霉素
- D: 头孢噻肟

答案：C

61. 患者男性，56 岁。有糖尿病史 15 年，近日并发肺炎，呼吸 35 次/分，心率 105 次/分，血压 160/90mmHg，呼出气体有丙酮味，意识模糊，尿酮呈强阳性，血糖 500mg/dl，诊断为糖尿病酮症酸中毒。

- A: 静脉
- B: 舌下含服
- C: 口服
- D: 皮下

答案：A

62. 作用于微管的抗肿瘤药物是

- A: 顺铂
- B: 来曲唑
- C: 紫杉醇

D: 依托泊苷

答案：C

63. 下列哪种药物能抑制尿酸生成的是

A: 别嘌醇

B: 呋塞米

C: 秋水仙碱

D: 丙磺舒

答案：A

64. 属于第四代头孢菌素的药物是()

A: 头孢噻吩

B: 头孢噻肟

C: 头孢哌酮

D: 头孢吡肟

答案：D

65. 弱效(使 LDL-ch 水平降低<30%)的他汀类调血脂药是()

A: 依折麦布

B: 大剂量阿托伐他汀

C: 小剂量氟伐他汀

D: 小剂量阿托伐他汀

答案：C

66. (2021 年真题) 血培养结果为耐甲氧西林金黄色葡萄球菌，首选的抗菌药物是()

A: 青霉素 G

B: 万古霉素

C: 头孢唑林

D: 左氧氟沙星

答案: B

67. 静脉滴注过量可消除噻嗪类利尿剂的利尿和降压作用的是

A: 枸橼酸钾

B: 氯化钙

C: 氯化钠

D: 氯化钾

答案: C

68. 可降低极低密度脂蛋白胆固醇和三酰甘油，主要升高高密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是

A: 利血平

B: 瑞舒伐他汀

C: 阿昔莫司

D: 依折麦布

答案: C

69. 下列药物组合混合可减弱抗菌活性的是

A: 青霉素+四环素

B: 青霉素+阿米卡星

C: 青霉素+红霉素

D: 青霉素+氯霉素

答案: B

70. 抗酸作用较弱而慢，但持久，对溃疡面有保护作用的是

A: 氢氧化镁

B: 氢氧化铝

C: 碳酸钙

D: 三硅酸镁

答案：D

71. 患者,女,55 岁诊断为“甲癣”宜使用的药物是

A: 氟胞嘧啶

B: 特比萘芬

C: 卡泊芬净

D: 氟康唑

答案：B

72. 增加肌肉和脂肪组织对胰岛素的敏感性而降低血糖的是()

A: 那格列奈

B: 阿卡波糖

C: 罗格列酮

D: 瑞格列奈

答案：C

73. (2015 年真题) 易导致牙齿黄染的药品是 ()。

A: 头孢哌酮

B: 庆大霉素

C: 加替沙星

D: 多西环素

答案：D

74. 可导致凝血酶原时间延长的是

A: 替硝唑+苯巴比妥

B: 替硝唑+华法林

C: 奥硝唑+乙醇

D: 甲硝唑+乙醇

答案：B

75. 蒽醌类抗肿瘤药柔红霉素可引起心脏毒性,临床应用的解毒方案是()
()

A: 在用柔红霉素后 30min,使用柔红霉素 2 倍量的右雷佐生

B: 在用柔红霉素同时,使用柔红霉素等量的右雷佐生

C: 在用柔红霉素前 30min,使用柔红霉素 10 倍量的右雷佐生

D: 在用柔红霉素前 30min,使用柔红霉素 2 倍量的氟马西尼

答案：C

76. 辛伐他汀用于心血管事件高危人群的初始剂量是

A: 10mg

B: 15mg

C: 5mg

D: 20~40mg

答案：D

77. 阿奇霉素()
()

A: 肾毒性较大

B: 用于非典型致病原感染

C: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

D: 脑脊液中浓度较高,酶稳定性高,适用于脑膜炎

答案：B

78. 沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下,请结合问题作答。

- A: 患者, 男, 47 岁, 慢性心力衰竭伴高钾血症 (血 K⁺5
- B: 患者, 男, 47 岁, 诊断为难治性高血压, 使用依那普利、氯氯噻嗪、氢氯地平治疗仍未达标
- C: 患者, 男, 47 岁, 诊断为高血压, 生活方式干预无效, 随机血压 155/95mmHg
- D: 患者, 男, 47 岁, 慢性心力衰竭, LVEF=35%, 血压 120/65mmHg

答案: D

79. 关于他扎罗汀治疗银屑病的叙述, 错误的是

- A: 对严重的银屑病效果显著
- B: 育龄期妇女用药前 2 周, 应进行血清或尿液妊娠试验
- C: 成人每晚(睡前半小时)1 次, 一般 12 周, 使用面积应不超过 20% 体表面积
- D: 不用于 18 岁以下银屑病患者

答案: A

80. 与长春新碱合用可增强神经系统及血液系统毒性

- A: 非格司亭
- B: 替尼泊苷
- C: 异烟肼
- D: 铂类

答案: C

81. (2016 年真题) 属于碳青霉烯类

- A: 头孢美唑
- B: 亚胺培南

C: 头孢吡肟

D: 氨曲南

答案：B

82. (2016 年真题) 可以碱化尿液，用于代谢性酸中毒的药品是

A: 氯化钾

B: 谷氨酸

C: 硫酸镁

D: 乳酸钠

答案：D

83. 可用于治疗非何杰金(非霍奇金)淋巴瘤的单克隆抗体是()

A: 曲妥珠单抗

B: 利妥昔单抗

C: 贝伐单抗

D: 西妥昔单抗

答案：B

84. 肥胖性 2 型糖尿病患者控制血糖的一线药物是

A: 格列吡嗪

B: 格列齐特

C: 二甲双胍

D: 格列本脲

答案：C

85. (2021 年真题) 促进尿酸排泄的抗痛风药物是()

A: 秋水仙碱

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 双醋瑞因

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/315330242114012033>