

预防接种人员上岗考试-犬伤门诊题库与答案

(一) 判断题

1.减少各剂次疫苗的时间间隔可干扰抗体反应和降低保护作用。 [单选题] *

A 是✓

B 否

2.供应的国家免疫规划疫苗和注射器的最小外包装的显著位置 ,应标明 “免费” 字样以及 “免疫规划” 专用标识。 [单选题] *

A 是✓

B 否

3.注射器使用后应先回套针帽，然后再丢弃，以避免意外扎伤。 [单选题] *

A 是

B 否✓

4.运送和储存疫苗时，应在冷藏箱底部放入纱布。 [单选题] *

A 是✓

B 否

5.冻制冰排时，冰排与低温冰箱箱壁之间应留有 5-8 厘米的间隙。 [单选题] *

A 是

B 否✓

6.每次冰排使用后，应将其放入冷藏包，保存于低温冰箱或低温冷库内，以便下次使用。 [单选题] *

A 是

B 否✓

7.液晶温度计适用于常温冰箱的温度测定。 [单选题] *

A 是

B 否✓

8.每次冷链运转结束后，应将冰排的水倒出，清洗干净、晾干后与冷藏箱或冷藏包存放在一起。 [单选题] *

A 是✓

B 否

9.定点接种是县级及以上卫生行政部门设立的固定或临时接种单位。 [单选题] *

A 是

B 否✓

10.预防接种个案信息包括疫苗生产企业。 [单选题] *

A 是✓

B 否

11.群体性 AEFI 是指短时间内同一接种单位的受种者中，发生的 2 例及以上相同或类似临床症状的严重 AEFI；或短时间内同一接种单位的同种疫苗受种者中，发生相同或类似临床症状的非严重 AEFI 明显增多。 [单选题] *

A 是✓

B 否

12.接种事故不属于预防接种异常反应，不需要报告。 [单选题] *

A 是

B 否✓

13.死亡病例调查诊断需要尸检结果的，受种方有权拒绝尸检，而不需要承担责任。 [单选题] *

A 是

B 否✓

14.NRA（国家监管机构）评估是指对疫苗从生产到使用各环节的国家监管机构的职能进行评价。 [单选题] *

A 是✓

B 否

15.受种者或其监护人为 AEFI 的责任报告人，当受种者在接种后出现反应时，家长应立即向接种单位进行报告。 [单选题] *

A 是

B 否✓

16.偶合症不是由疫苗的固有性质引起的。 [单选题] *

A 是✓

B 否

17.宣传资料是各级各类接种单位均应收集的资料。 [单选题] *

A 是✓

B 否

18.进购二类疫苗时索取的证明文件，需保存至超过疫苗有效期 5 年备查。 [单选题] *

A 是✓

B 否

19.接种单位应接受所在地的县级疾病预防控制机构的技术指导。 [单选题] *

A 是✓

B 否

20.疫苗生产企业不可以向疾控预防控制机构、接种单位销售本企业生产的第二类疫苗。 [单选题] *

A 是

B 否✓

21.疫苗批发企业不可以向疾控预防控制机构、接种单位销售本企业生产的第二类疫苗。 [单选题] *

A 是

B 否✓

22.疾病预防控制机构或接种单位发现假劣或者质量可疑的疫苗，应当立即停止接种、分发、供应和销售，并立即向所在地的县级人民政府卫生主管部门和药品监督管理部门报告，不得自行处理。 [单选题] *

A 是✓

B 否

23.二类疫苗是指由公民自费并自愿接种的疫苗。 [单选题] *

A 是✓

B 否

24.PH>10 的环境可灭活狂犬病毒。 [单选题] *

A 是✓

B 否

25.被蜥蜴咬伤后，除了进行必要的外科处置，还需接种狂犬疫苗。 [单选题] *

A 是

B 否✓

26.被浣熊咬伤后，除了进行必要的外科处置，还需接种狂犬疫苗。 [单选题] *

A 是✓

B 否

27.被金丝熊咬伤后必须进行规范的狂犬病暴露后处置。 [单选题] *

A 是

B 否✓

28.狂犬病被动免疫制剂只有在浸润注射后有所剩余的情况下才可以进行肌肉注射 [单选题] *

A 是✓

B 否

29.暴露后超过 24 小时，就没有必要进行狂犬病暴露后处置。 [单选题] *

A 是

B 否✓

30.翼手目既是狂犬病毒的传播宿主，也是储存宿主。 [单选题] *

A 是✓

B 否

(二) 单选题

31.接种单位应多久上报下一次疫苗和注射器领取计划？ [单选题] *

A 半个月

B 1 个月✓

C 一个季度

D 半年

32.接种单位购进、分发、供应疫苗时应填写《疫苗出入库登记表》，记录应当保存至 备查。 [单选题]

*

A 超过疫苗生产日期 2 年

B 超过疫苗有效期 5 年✓

C 疫苗有效期

D 超过疫苗有效期 1 年

33.预防接种前如何准备接种器材？ [单选题] *

A 按受种者人数的 1.1 倍准备✓

B 按受种者人数的 1.2 倍准备

C 按受种者人数的 1.3 倍准备

D 按受种者人数的 1.4 倍准备

34.存放疫苗时，疫苗和冰箱壁、疫苗与疫苗之间应留有多大空隙？ [单选题] *

A 可以不留空隙

B 疫苗和冰箱壁留有 1-2cm，疫苗与疫苗之间不用留空隙

C 疫苗和冰箱壁、疫苗与疫苗之间均要留有 1-2cm 空隙✓

D 以上都不对

35.关于疫苗外观质量，下列说法正确的是： [单选题] *

A 有摇不散块状物时，需用振荡器多次振荡后使用

B 疫苗如冻结，应放置温水中缓慢解冻后使用

C 安瓿有裂纹但未破裂时可使用

D 无标签或标签不清时不得使用✓

36.冰箱蒸发器结霜厚度达到多大时应进行除霜处理： [单选题] *

A 3mm

B 4mm✓

C 5mm

D 6mm

37.长期停用的冰箱为保持其制冷功能，应每周开机多长时间为宜： [单选题] *

A 15 分钟

B 30 分钟

C 1 小时

D 数小时✓

38.冷库或冰箱等冷链设备使用时进行的每日温度记录称为： [单选题] *

A 常规监测✓

B 定期监测

C 主动监测

D 被动监测

39.适用于冷库进行温度监测的设备是： [单选题] *

A 指针温度计

B 液晶温度计

C 自动温度记录仪✓

D 监测卡

40.接种单位或接种点在领取完疫苗后必须填写： [单选题] *

A 疫苗入库记录

B 疫苗运转记录

C 疫苗出入库登记表✓

D 以上均需填写

41.皮肤常规消毒涂擦直径应不小于： [单选题] *

A 2cm

B 3cm

C 4cm

D 5cm✓

42.接种狂犬疫苗时，下列说法正确的是： [单选题] *

A 针头斜面向上，与皮肤呈 30-40 度角，快速刺入针头长度的 1/3-2/3，放松皮肤，左手固定针管，回抽无血，注入疫苗。

B 右手持注射器，(以执毛笔式)，与皮肤呈 90 度角，快速刺入针头长度的 2/3，松左手，固定针管，放松皮肤，回抽无血，注入疫苗后快速拔出针头。✓

C 针头斜面向下，与皮肤呈 30-40 度角，快速刺入针头长度的 1/3-2/3，放松皮肤，左手固定针管，回抽无血，注入疫苗。

D 右手持注射器，(以执毛笔式)，与皮肤呈 70-90 度角，快速刺入针头长度的 1/3-2/3，固定针管，绷紧皮肤，回抽无血，注入疫苗后快速拔出针头。

43.如果实施不安全注射引起了局部感染性脓肿，下列说法正确的是： [单选题] *

A 可能由于接种器材消毒不严✓

B 属于非感染性危害

C 可能由于注射物质不当

D 是不安全注射造成的非常罕见的危害

44.下列哪种情况不可能引发过敏性休克？ [单选题] *

A 晕针时✓

B 不安全注射后

C 安全注射后

D 注射物质不当

45.对受种者安全是指： [单选题] *

A 使用安全的消毒器材

B 使用安全的注射器材✓

C 正确处理使用过的器材

D 操作过程中避免误伤

46.对实施接种者安全是指： [单选题] *

A 使用安全的消毒器材

B 使用安全的注射器材

C 正确处理使用过的器材

D 操作过程中避免误伤✓

47.下列哪些是安全注射的行为？ [单选题] *

A 使用过的注射器回套针帽

B 预防接种人员在实施接种前清洗双手，穿白大衣，戴口罩✓

C 使用过的注射器和针管都可以放在毁型盒中储存

D 只有超过退休年龄的接种人员从事预防接种服务的才需要定期体检

48.自毁型注射器的使用可分为几个步骤？ [单选题] *

A 4

B 5

C 6✓

D 7

49.自毁型注射器的使用的步骤正确的是： [单选题] *

A 取针-吸液-排气-注射-毁型

B 检查-取针-吸液-排气-毁型-回收

C 取针-吸液-排气-毁型-回收

D 检查-取针-吸液-排气-注射-毁型✓

50.受种者接种灭活疫苗的发热一般不会超过多长时间？ [单选题] *

A 1 天

B 2 天

C 3 天✓

D 4 天

51.接种减毒活疫苗比接种灭活疫苗出现发热的时间要： [单选题] *

A 稍早

B 稍晚✓

C 存在个体差异，不确定

D 二者一样

52.下列属于轻度一般反应的是： [单选题] *

A 发热 37.0-37.5℃；红肿硬结直径小于 19mm

B 发热小于 37.1-37.5℃；红肿硬结直径小于 15mm✓

C 发热 37.1-37.6℃；红肿硬结直径小于 19mm

D 发热 37.0-37.6℃；红肿硬结直径小于 20mm

53.以下关于预防接种一般反应的描述中不正确的是： [单选题] *

A 发生在预防接种后

B 由疫苗本身固有的特性引起

C 对机体只造成一过性生理功能障碍

D 对机体造成组织器官的损害✓

54.预防接种后 24 小时内可能发生的 AEFI： [单选题] *

A 过敏性休克

B 不伴休克的过敏反应（荨麻疹、斑丘疹、喉头水肿等）

C 中毒性休克综合征、晕厥、癍症等

D 以上都是✓

55.何为预防接种事故？ [单选题] *

A 在预防接种实施过程中或接种后因受种者心理因素发生的个体或者群体性反应。

B 预防接种事故是由疫苗固有性质引起的。

C 在预防接种实施过程中违反预防接种工作规范、免疫程序、疫苗指导原则、接种方案，造成受种者
机体组织器官、功能损害✓

D 由于疫苗质量不合格，接种后造成受种者机体组织器官、功能损害。

56.接种医生接到 AEFI 报告后，应向哪个部门报告？ [单选题] *

A 药品监督管理部门

B 所在地区县级疾病预防控制机构✓

C 县级卫生行政部门

D 疫苗生产企业

57.以下关于 AEFI 描述正确的是？ [单选题] *

A 是指在预防接种后发生的怀疑与预防接种有关的反应或事件✓

B 是指在预防接种前或接种后发生的，怀疑与预防接种有关的反应或事件

C 是指在预防接种后发生的诊断与预防接种有关的反应或事件

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/315333310321011103>