

学习及考试资料整理汇编

—— 备考冲刺篇 ——

（考点或配套习题突击训练专用）

药理学模拟练习题含答案

1、具有组胺样作用和拟胆碱作用的药物是

- A、酚苄明
- B、酚妥拉明
- C、普萘洛尔
- D、阿替洛尔
- E、美托洛尔

答案：B

2、目前四环素类药物中，首选的药物是

- A、四环素
- B、土霉素
- C、多西环素
- D、米诺环素
- E、替加环素

答案：C

3、治疗梅毒的首选药是

- A、庆大霉素
- B、四环素
- C、青霉素 G
- D、氯霉素
- E、红霉素

答案：C

4、降压不引起重要器官血流量减少，不影响脂和糖代谢的药物是：

- A、拉贝洛尔
- B、可乐定
- C、依那普利
- D、普萘洛尔
- E、米诺地尔

答案：C

5、胃溃疡病人宜选用何种解热镇痛药

- A、扑热息痛
- B、水杨酸钠
- C、阿司匹林
- D、吲哚美辛
- E、保泰松

答案：A

6、对拉贝洛尔药理作用叙述正确的是

- A、对 α 、 β 受体阻断活性相等
- B、对 α 受体阻断强, 对 β 受体阻断弱
- C、对 α 受体阻断弱, 对 β 受体阻断强
- D、阻断 β_2 受体, 无内在拟交感活性
- E、可降低心输出量, 不引起直立性低血压

答案：C

7、关于药酶诱导剂的叙述, 错误的是

- A、能增加药酶活性
- B、加速其他经肝代谢药物的代谢
- C、使其他药物血药浓度升高
- D、使其他药物血药浓度降低
- E、苯妥英钠是肝药酶诱导剂之一

答案：C

8、轻型肥胖型糖尿病人, 单用饮食控制无效时宜选用

- A、甲苯磺丁脲
- B、格列本脲
- C、精蛋白锌胰岛素
- D、正规胰岛素
- E、二甲双胍

答案：E

9、氨基糖苷类药物中过敏反应发生率最高, 仅次于青霉素的是

- A、链霉素
- B、奈替米星
- C、庆大霉素
- D、阿米卡星
- E、依替米星

答案：A

10、下列关于普萘洛尔的叙述, 错误的是

- A、阻断 β_1 受体
- B、阻断 β_2 受体
- C、具有膜稳定作用
- D、使肾素释放减少
- E、具有内在拟交感活性

答案：E

11、下列受体兴奋后可引起支气管平滑肌松弛的是

- A、M受体
- B、 α_1 受体
- C、 α_2 受体
- D、 β_1 受体
- E、 β_2 受体

答案：E

12、下列哪种效应不是通过激动M受体实现的

- A、心率减慢
- B、胃肠道平滑肌收缩
- C、胃肠道括约肌收缩
- D、膀胱括约肌舒张
- E、瞳孔括约肌收缩

答案：C

13、首过消除发生于

- A、肌肉注射
- B、静脉给药
- C、口服给药
- D、舌下给药
- E、吸入给药

答案：C

14、多巴胺舒张肾及肠系膜血管的机制是

- A、阻断 α 受体
- B、激动 β_1 受体
- C、激动 β_2 受体
- D、激动DA受体
- E、激动M受体

答案：D

15、东莨菪碱与阿托品的作用相比较，前者最显著的差异是

- A、抑制腺体分泌
- B、松弛胃肠平滑肌
- C、松弛支气管平滑肌
- D、中枢抑制作用
- E、扩瞳、升高眼内压

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/316001215201010141>