

产妇跌倒护理查房

演讲人：

2024-05-03



PROJECT

目录

CONTENTS

- 产妇跌倒概述
- 产妇跌倒预防措施
- 产妇跌倒后应急处理
- 产妇跌倒后护理要点
- 产妇跌倒案例分析
- 产妇跌倒护理质量监控
- 总结与展望





01 产妇跌倒概述





定义与分类

产妇跌倒是指在妊娠期间或产后，产妇因各种原因导致的意外跌倒。


定义

分类

根据跌倒的严重程度，可分为轻微跌倒、中度跌倒和重度跌倒。



发生率及危害



发生率

产妇跌倒的发生率因地区、医院等级、产妇群体等因素而异。

危害

产妇跌倒可能导致身体受伤、心理创伤、胎盘早剥、胎儿窘迫等严重后果。



高危因素与风险评估

高危因素

- 包括产妇年龄、身体状况、妊娠期并发症、环境因素等。

风险评估

- 通过对产妇的详细询问和体格检查，结合医院的相关数据和统计资料，对产妇跌倒的风险进行评估。评估内容包括产妇的跌倒史、平衡能力、步态稳定性、视力状况、药物使用情况等。同时，还需要对医院的环境进行评估，包括地面状况、照明情况、扶手设置等，以确定是否存在可能导致跌倒的安全隐患。



02 产妇跌倒预防措施





环境安全改善



确保病房、走廊、卫生间等区域地面干燥、清洁，无障碍物，避免滑倒风险。



在易滑倒区域如卫生间、浴室等设置防滑垫、扶手等设施。



保持室内光线充足，夜间应有适当的照明，便于产妇行动。





个人防护措施

产妇应穿着合适的鞋子，避免穿拖鞋、高跟鞋等不稳固的鞋类。



行动时应保持缓慢、平稳，避免突然改变体位或快速转身。

如有头晕、乏力等不适，应立即坐下或躺下休息，并寻求医护人员帮助。





健康教育及指导



对产妇及其家属进行跌倒预防的健康教育，强调跌倒的危害性和预防措施。



指导产妇正确使用辅助器具如拐杖、助行器等，以增加行走稳定性。



提醒产妇在起床、如厕等时段要特别小心，遵循“三部曲”原则：即平躺30秒、坐起30秒、站立30秒后再行走。



03 产妇跌倒后应急处理





现场初步处理流程



01

立即到达现场，评估产妇意识、呼吸、脉搏等生命体征。



02

询问产妇是否有疼痛、不适等症状，并检查是否有外伤、出血等情况。



03

如产妇无法动弹，应避免随意搬动，防止二次伤害。



04

立即通知医生和其他医护人员，做好救治准备。



报告制度与上报流程



发现产妇跌倒后，应立即报告给当班医生或护士长。

填写跌倒事件报告表，详细记录跌倒时间、地点、原因、经过及处理措施等信息。



根据医院规定，将跌倒事件上报至相关部门，以便进行根本原因分析和改进措施制定。



协同救治与多学科合作



01

产妇跌倒后，可能需要多学科协同救治，如产科、外科、骨科、神经科等。

02

医护人员应根据产妇的具体情况，迅速联系相关科室，请求会诊或协助救治。

03

在救治过程中，各科室应密切配合，共同制定治疗方案，确保产妇得到及时、有效的救治。



04 产妇跌倒后护理要点



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/317066036004006155>