

病理学(医学高级)《诊断学基础考试题》模拟卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

| 题型 | 选择题 | 填空题 | 解答题 | 判断题 | 计算题 | 附加题 | 总分 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 得分 | | | | | | | |

| 评卷人 | 得分 |
|-----|----|
| | |

- 1、单项选择题:前列腺触诊时,下列哪项不正确()。A. 检查者示指戴套,并涂以润滑剂,徐徐插入肛门,向腹侧触诊
B. 前列腺按摩先向前向内,后向尿道外口方向滑行
C. 正常前列腺质韧而弹性
D. 前列腺肿大而表面光滑,质韧,无压痛,见于前列腺癌早期
E. 被检查者取肘膝卧位
- 2、多项选择题:用于肝癌诊断的指标有()。A. ALT
B. AFP
C. ALP
D. P III P
E. GGT
- 3、单项选择题:男,45岁,近2个月来感胸闷、心悸、气促、乏力,逐渐出现少尿、下肢水肿。查体:颈静脉充盈,血压90/60mmHg,心浊音界向两侧扩大并随体位而改变,心音低钝,肝大,肝颈静脉回流征阳性。X线提示心脏阴影普遍性向两侧扩大,心脏搏动减弱。如需与心力衰竭鉴别,最重要的心脏体征是有无()。A. 心率增快
B. 心音低钝
C. 舒张期奔马律
D. 心房颤动
E. 三尖瓣区或心尖区收缩期吹风样杂音
- 4、单项选择题:可作为动脉粥样硬化独立的危险因素的是()。A. I B. 慢性支气管炎
C. 大叶性肺炎
D. 大量胸腔积液
E. 慢性左心衰竭
- 8、多项选择题:在I、II、III导联中正确的正负极连接方式是()。A. III导联:左腿(+)、左臂(-)
B. I导联:右臂(+)、左臂(-)
C. II导联:左腿(+)、右臂(-)
D. II导联:左腿(+)、左臂(-)
E. I导联:左臂(+)、右臂(-)
- 9、单项选择题:血管舒缩障碍所致的晕厥见于()。A. 低血糖综合征
B. 换气过度综合征

- C. 颈动脉窦综合征
 - D. 高原晕厥
 - E. 心源性晕厥
- 10、单项选择题：下列关于瞳孔的叙述，错误的是（ ）。A. 正常的瞳孔双侧等圆、等大
- B. 青光眼，瞳孔可呈椭圆形
 - C. 虹膜粘连时形状可不规则
 - D. 婴幼儿瞳孔较大
 - E. 进入老年瞳孔大小变化不大
- 11、单项选择题：不符合渗出液的是（ ）。A. 比重高于 1.018
- B. 呈现不同颜色或混浊
 - C. 自凝
 - D. Rivalta 试验阴性
 - E. 细胞数常 $500 \times 10^6/L$
- 12、单项选择题：男性，66 岁，反复咳嗽、咳痰 30 年，加重伴呼吸困难 3 天入院。查体：T $38.7^{\circ}C$ ，BP150/90mmHg，口唇发绀，双下肺闻及大量干湿啰音，P $2 > A2$ ，三尖瓣区可闻及收缩期杂音。急查血糖 7.8mmol/L。
- 该患者最可能的诊断是（ ）。A. 肺栓塞
- B. 风湿性心脏病
 - C. 高血压心脏病
 - D. 肺源性心脏病
 - E. 冠状动脉硬化性心脏病
- 13、单项选择题：引起心悸最常见的病因是（ ）。A. 高血压
- B. 心律失常
 - C. 冠心病
 - D. 神经官能症
 - E. 心肌病
- 14、多项选择题：有关补体的描述正确的有（ ）。A. 可以单独执行灭活病原体的功能
- B. 是糖蛋白
 - C. 是抗体发挥溶解细胞作用的必要补充条件
 - D. 不参与破坏自身组织或细胞的免疫损伤反应
 - E. 具有酶原活性
- 15、单项选择题：Northern 印迹杂交是（ ）。A. 检测 DNA 的方法
- B. 检测 RNA 的方法
 - C. 检测蛋白的方法
 - D. 检测酶的方法
 - E. 既可检测 DNA，又可检测 RNA 的方法
- 16、单项选择题：男，60 岁，主诉近 2 天头晕、胸闷、心悸，来院就诊。若非同日 3 次及以上测量血压在（150~165） / （95~105） mmHg 之间波动，则其血压水平为（ ）。A. 正常高值
- B. 1 级高血压
 - C. 2 级高血压
 - D. 3 级高血压

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/317156123003006105>