2024贵州省罗甸县《执业药师之西药学专业二》考试必刷200题真题题库及参考答案（实用）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.属于硝基呋喃类的是

A：呋喃妥因

B：磺胺甲

C：甲硝唑

D：夫西地酸

答案：A

2.头孢噻吩

A：与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注

B：脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染

C：肾毒性较大

D：用于非典型病原体感染

答案：C

3.患者，男，50岁。旅游登山时突发头晕，症状持续不缓解。查体：148／90mmHg，心率80次／分，医嘱卡托普利、氢氯噻嗪治疗。

A：卡托普利可减轻氢氯噻嗪的低血糖反应

B：卡托普利可提高氢氯噻嗪的血尿酸水平

C：氢氯噻嗪可拮抗卡托普利的高血钾倾向

D：氢氯噻嗪可增加卡托普利的肾血流量

答案：C

4.患者，女，49岁，间断上腹部饱胀、恶心1年。患者1年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药(具体不详)治疗后症状好转。2个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部B超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3次/日。

A: 胰酶

B: 莫沙必利

C: 甲氧氯普胺

D: 多潘立酮

答案：A

5.容易引起周围神经炎的抗结核药物是

A: 乙胺丁醇

B: 利福平

C: 异烟肼

D: 链霉素

答案：C

6.可用于治疗青光眼的是

A: 哌替啶

B: 毛果芸香碱

C: 新斯的明

D: 阿托品

答案：B

7.作用于微管的抗肿瘤药物是

A: 依托泊苷

B: 来曲唑

C: 紫杉醇

D: 顺铂

答案：C

8.属于贝丁酸类调节血脂药的是

A: 非诺贝特

B: 阿托伐他汀

C: 阿昔莫司

D: 依折麦布

答案：A

9.氟尿嘧啶的前体药物，对结肠和直肠癌疗效较高

A: 羟喜树碱

B: 卡莫氟

C: 来曲唑

D: 甲氨蝶呤

答案：B

10.甲羟孕酮口服用于功能性闭经的用法用量是

A: 于月经后半周期(撤药性出血的第16～25日)开始口服，一次10mg，一日1次，连用10～14日，酌情应用3～6个周期

B: 口服，一次10～20mg，每4～8小时一次，连用2～3日；血止后每隔3日递减1/3剂量，直至维持量每日100mg，连续用药至血止后21日停药

C: 一日30mg，连服6个月

D: 口服一日4～8mg，连服5～10日

答案：D

11.以下不属于干扰核酸生物合成的药物是

A: 卡培他滨

B: 甲氨蝶呤

C: 培美曲塞

D: 表柔比星

答案：D

12.患者，男，60岁。入院诊断为:高胆固醇血症、支原体肺炎。医师拟选用克拉霉素治疗支原体肺炎，同时需进行调血脂治疗，不宜与克拉霉素合用的调血脂药是

A: 辛伐他汀

B: 依折麦布

C: 非诺贝特

D: 氟伐他汀同德

答案：A

13.使用氨甲环酸可导致

A: 肺动脉高压

B: 支气管痉挛

C: 高胆红素血症

D: 血栓形成

答案：D

14.对于急性红斑、水疱可选择的剂型不包括

A: 洗剂

B: 乳膏剂

C: 粉剂

D: 油剂

答案：B

15.小剂量碘主要用于

A: 黏液性水肿

B: 呆小病

C: 抑制甲状腺素的释放

D: 单纯性甲状腺肿

答案：D

16.可作为氨基糖苷类的替代品，与其合用可加强对铜绿假单胞菌和肠杆菌作用的药物是

A: 氨曲南

B: 阿莫西林

C: 克拉维酸

D: 亚胺培南

答案：A

17.茶碱属于

A: 黄嘌呤类药物

B: M胆碱受体阻断剂

C: 白三烯调节剂

D: β肾上腺素受体激动剂

答案：A

18.阿托品在使用中应注意

A: 对食管有刺激性，需整片吞服

B: 糖尿病患者避免使用

C: 感染性腹泻早期无效，后期可辅助治疗

D: 痉挛性麻痹与脑损伤的婴幼儿禁用

答案：D

19.柔红霉素可能与()存在交叉耐药性。

A: 环磷酰胺

B: 甲氨蝶呤

C: 阿糖胞苷

D: 多柔比星

答案：D

20.患者，男，56岁。有糖尿病病史15年，近日并发肺炎，呼吸35次/分，心率105次/分，血压160/90mmHg，呼出气体有丙酮味，意识模糊，尿酮呈强阳性，血糖500mg/dl。

A: 舌下含服

B: 皮下注射

C: 口服

D: 静脉注射

答案：D

21.延长动作电位时程的广谱抗心律失常药物是()

A: 维拉帕米

B: 胺碘酮

C: 美西律

D: 奎尼丁

答案：B

22.退乳药溴隐亭的临床应用注意不包括

A: 口服后个体差异较大

B: 治疗期间禁止妊娠

C: 消化道溃疡患者慎用

D: 用于治疗闭经或乳溢，可产生短期疗效，但不宜久用

答案：B

23.阿托品2mg时，出现的症状为()

A: 略有口干

B: 语言不清

C: 瞳孔轻度散大

D: 瞳孔扩大

答案：D

24.关于单克隆抗体抗肿瘤药物的描述错误的是()

A: 对癌细胞和正常体细胞都有"杀灭"作用

B: 利妥昔单抗主要用于淋巴瘤的治疗

C: 贝伐珠单抗作用于血管内皮生长因子

D: 静脉滴注可致过敏样反应

答案：A

25.癫痫大发作合并小发作选用

A: 丙戊酸钠

B: 苯妥英钠

C: 乙琥胺

D: 苯巴比妥

答案：A

26.糖尿病合并心血管疾病者可选用()

A: 格列喹酮

B: 格列吡嗪

C: 胰岛素

D: 格列齐特

答案：B

27.助消化药不包括

A: 乳酶生

B: 乳酸菌素

C: 胰酶

D: 多潘立酮

答案：D

28.多巴胺受体阻断药的代表药物为()

A: 昂丹司琼

B: 甲氧氯普胺

C: 格雷司琼

D: 托烷司琼

答案：B

29.下述药物中用于缓解鼻黏膜充血肿胀引起的鼻塞的是

A: 硼酸

B: 链霉素溶剂

C: 盐酸麻黄碱滴鼻液

D: 利巴韦林滴鼻液

答案：C

30.脂溶性较高，起效快，属于巴比妥类的镇静催眠药是()。

A：异戊巴比妥

B：阿普唑仑

C：佐匹克隆

D：地西泮

答案：A

31.（2015年真题）不易导致便秘或腹泻不良反应的抗酸药是（）。

A：铝碳酸镁

B：碳酸钙

C：氢氧化铝

D：三硅酸镁

答案：A

32.（2017年真题）可抑制维生素K环氧化酶活性的抗凝血药是（）

A：依诺肝素

B：华法林

C：达比加群酯

D：氨甲环酸

答案：B

33.利伐沙班的药理作用是

A：抑制游离凝血酶

B：抑制已与纤维蛋白结合的凝血酶

C：抑制血小板聚集

D：阻止了Xa对凝血酶原的作用

答案：D

34.可用于金黄色葡萄球菌等革兰阳性菌所致严重感染的是

A：磷霉素钠+万古霉素

B：磷霉素氨丁三醇

C：利奈唑胺+哌替啶

D：利奈唑胺+苯丙醇胺

答案：A

35.患儿，男，7岁。长期偏食。近1个月面色渐苍白，自诉全身无力。体检：肝肋下4cm，脾肋下1cm。血常规：Hb70g／L，RBC3.0×1012／L，Ret2．0%，WBC、P1t均正常，MCV74fl，MCH26pg，MCHC30%，考虑为缺铁性贫血。

A：蓝色

B：黑色

C：红色

D：绿色

答案：B

36.妊娠糖尿病患者，为控制血糖，主张使用

A：胰岛素

B：瑞格列奈

C：二甲双胍

D：格列苯脲

答案：A

37.由于分子结构上的差异，导致铂类化合物的各自毒性亦有所区别典型不良反应为恶心、呕吐、肾毒性和耳毒性的是

A：奥沙利铂

B：顺铂

C：亚叶酸钙

D: 卡铂

答案：B

38.治疗各种类型的癫痫选用

A: 布桂嗪

B: 佐匹克隆

C: 丙戊酸钠

D: 多奈哌齐

答案：C

39.对视网膜的功能起重要作用的是

A: 视黄醇

B: 视黄酸

C: 视黄醛

D: 维生素A

答案：D

40.茶碱类主要用于

A: 气管炎

B: 肺不张

C: 支气管扩张

D: 支气管哮喘

答案：D

41.吸收后代谢成活性产物而发挥抗甲型和乙型流感病毒的前体药物是（）

A: 金刚乙胺

B: 奥司他韦

C：金刚烷胺

D：扎那米韦

答案：B

42.中度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选()

A：奥美拉唑+口服地塞米松

B：5-HT

C：5-HT

D：每日化疗前，应用5-HT

答案：C

43.对组胺H

A：哌仑西平

B：雷尼替丁

C：甲硝唑

D：丙谷胺

答案：B

44.天然的雌激素是()

A：黄体酮

B：雌二醇

C：炔雌醚

D：戊酸雌二醇

答案：B

45.可引起胃内压力增加和便秘的抗酸药是

A：莫沙必利

B：枸橼酸铋钾

C：奥关拉唑

D：碳酸钙

答案：D

46.双香豆素与保泰松合用可

A：诱导肝药酶加速灭活，作用减弱

B：竞争性对抗

C：产生协同作用

D：与其竞争结合血浆蛋白

答案：D

47.通过抑制5-HT和去甲肾上腺素（NA）再摄取，增加突触间隙5-HT和NA浓度从而增强中枢5-HT和NA能神经功能而发挥抗抑郁作用的药物是

A：舍曲林

B：阿米替林

C：度洛西汀

D：吗氯贝胺

答案：C

48.青光眼患者应慎用

A：沙丁胺醇

B：孟鲁司特

C：沙美特罗

D：噻托溴铵

答案：D

49.（2018年真题）因抑制血管内皮的前列腺素的生成,使血管内的前列腺素和血小板中的血栓素动态平衡失调而致血栓形成风险增加的非甾体抗炎药是（）

A: 阿司匹林

B: 双氯芬酸

C: 塞来昔布

D: 吲哚美辛

答案：C

50.患者，女，41岁，因进食不洁食物后发生腹泻，伴有恶心、呕吐及下腹痛，大便每日6～8次，为糊状或稀水状，伴有黏液。血常规检查提示：白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规：白细胞8～10/HP，红细胞3～5/HP。诊断：急性腹泻。医嘱：复方地芬诺酯片，2片，口服，3次/日；诺氟沙星胶囊，300mg，口服，2次/日。

A: 急、慢性功能性腹泻

B: 肠梗阻患者

C: 细菌性小肠结肠炎患者

D: 2岁以下婴幼儿

答案：A

51.头孢拉定

A: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染

B: 肾毒性较大

C: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染

D: 口服，肌内注射或静脉注射均可用于全身感染

答案：B

52.可与对氨基苯甲酸竞争二氢叶酸合成酶，阻碍叶酸合成的药物是

A: 磺胺嘧啶

B: 利福平

C: 两性霉素

D: 氧氟沙星

答案：A

53.具有双向作用，小剂时抑制骨吸收，大剂量时抑制骨形成的药物是()

A: 帕米膦酸二钠

B: 氯屈膦酸二钠

C: 阿仑膦酸钠

D: 依替膦酸二钠

答案：D

54.作用机制是有丝分裂抑制剂的是

A: 吉非替尼

B: 枸橼酸他莫昔芬

C: 紫杉醇

D: 巯嘌呤

答案：C

55.属于GLP-1受体激动剂的是()。

A: 阿卡波糖

B: 二甲双胍

C: 那格列奈

D: 艾塞那肽

答案：D

56.患者，男性，26岁，因“咳嗽、咳痰伴间断发热1周”入院，查体：T38．9℃，P90次／分，R21次／分，BP110／70mmHg，血常规：白细胞16．9×109／L，中性粒细胞百分比84．6%；胸部CT示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”，入院后使用莫西沙星和氨溴索治疗。

A: 红人综合征

B: 高血压危象

C: 急性肝衰竭

D: 血糖异常

答案：C

57.（2016年真题）属于抗雄激素类，可用于晚期前列腺癌治疗的首选药品是

A: 氟他胺

B: 他莫昔芬

C: 乙烯雌酚

D: 托瑞米芬

答案：A

58.以降低总胆固醇(TC)和低密度脂蛋白(LDL)含量为主的药物是

A: 辛伐他汀

B: 非诺贝特

C: 氯贝丁酯

D: 烟酸

答案：A

59.（2020年真题）患者，男，66岁。BMI24kg/m2，高血压病史15年，冠心病史3年，目前规律服用阿司匹林、贝那普利、氨氯地平、美托洛尔、阿托伐他汀、螺内酯、呋塞米、单硝酸异山梨酯治疗。患者饮酒饱餐后出现胸闷，心前区疼痛，自服1片硝酸甘油不能缓解，来急诊科就诊。查体:血压163/83mmHg，心率80次1分。临床诊断为:(1)心绞痛急性发作;(2)心功能不全、心功能III级;(3)高血压病3级;(4)高脂血症。

A: 氨氯地平

B: 呋塞米

C: 阿托伐他汀

D: 贝那普利

答案：B

60.下列唯一被批准用于临床的选择性胆固醇吸收抑制剂是

A: 瑞舒伐他汀

B: 盐酸

C: 依折麦布

D: 非诺贝特

答案：C

61.头孢曲松

A: 口服，肌内注射或静脉注射均可用于全身感染

B: 肾毒性较大

C: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染

D: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染

答案：C

62.30岁，农民，头昏乏力，粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白60g/L。诊断：钩虫感染，缺铁性贫血。

A: 对胃酸缺乏者，宜与稀盐酸并用，有利于铁剂的解离

B: 尽量选择三价铁

C：选择适宜的病期、疗程和监测

D：注意预防铁负荷过重

答案：B

63.氯吡格雷与奥美拉唑因竞争共同的肝药酶而避免联合应用，该肝药酶是

A：CYP1A2

B：CYP2E1

C：CYP2C19

D：CYP2D6

答案：C

64.滴鼻剂的正确使用方法不包括()

A：使用滴鼻剂时，可以同时使用同类的滴鼻剂加强疗效

B：如果正在服用其他药品，需要遵医嘱使用滴鼻剂

C：儿童必须在成人监护下使用

D：如滴鼻液过多流入口腔，可将其吐出

答案：A

65.在痛风急性期，应禁用的抗痛风药

A：秋水仙碱

B：舒林酸

C：布洛芬

D：别嘌醇

答案：D

66.睾酮治疗原发性和继发性男性性功能低下最有效的给药方法是

A：注射给药

B：肠道外给药

C：口服给药

D：透皮给药

答案：A

67.（2020年真题）属于肝药酶诱导剂，与华法林合用会减弱后者抗凝作用的药物是

A：氯苯那敏

B：苯妥英钠

C：唑吡坦

D：丙戊酸钠

答案：B

68.糖皮质激素在临床上一般不用于

A：真菌感染

B：中毒性感染

C：支气管哮喘

D：全身性红斑狼疮

答案：A

69.易引起刺激性干咳的抗高血压药是()

A：非洛地平

B：卡托普利

C：厄贝沙坦

D：阿托伐他汀

答案：B

70.可用于吗啡中毒解救的药物是

A：纳洛酮

B：阿托品

C：苯甲酸钠咖啡因

D：氟马西尼

答案：A

71.西咪替丁治疗消化性溃疡病的机制是()

A：阻断H

B：抑制胃壁细胞的H

C：抗幽门螺杆菌

D：阻断CTZ的D

答案：A

72.属于叶酸类抗代谢类药物的是

A：甲氨蝶呤

B：吉西他滨

C：巯嘌呤

D：长春瑞滨

答案：A

73.茶碱浓度15-20ug/ml时可出现

A：心动过速、心律失常

B：恶心、呕吐、失眠

C：为有效的治疗浓度

D：呼吸、心跳停止

答案：B

74.华法林应用过量可选用的拮抗药是

A: 鱼精蛋白

B: 氨基己酸

C: 维生素K1

D: 葡萄糖酸钙

答案：C

75.糖皮质激素诱发或加重感染的主要原因是()

A: 患者对激素不敏感，未反映出相应的疗效

B: 激素用量不足，无法控制症状

C: 激素促使许多病原微生物繁殖

D: 抑制机体的免疫功能

答案：D

76.抢救糖尿病合并酮症酸中毒患者

A: 刺激胰岛β细胞释放胰岛素

B: 胰岛素皮下注射

C: 二甲双胍

D: 静脉用胰岛素

答案：D

77.β-溶血性链球菌产生的一种蛋白质，现已有基因重组产品的是()

A: 尿激酶

B: 链激酶

C: 叶酸

D: 重组人促红素

答案：B

78.（2018年真题）患者，男，60岁诊断为房性心律失常，医生给予胺碘酮治疗。近日，因胃溃疡开始用西咪替丁，出现窦性心动过缓症状。

A：①③⑤

B：①②④⑤

C：③④⑤

D：②④⑤

答案：B

79.关于利多卡因的叙述正确的是

A：为窄谱抗心律失常药，仅用于室性心律失常

B：可用于房颤的复律治疗和复律后的维持

C：可治疗房性期前收缩

D：可治疗阵发性室上性心动过速

答案：A

80.肝素的抗凝作用特点

A：仅在体外有效

B：体内、体外均有效

C：仅在体内有效

D：必须有维生素K辅助

答案：B

81.为鲨烯环氧酶的非竞争性、可逆性抑制剂，用于手癣、足癣、体癣及皮肤念珠菌病的药物是

A：阿莫罗芬

B：特比萘芬

C：联苯卡唑

D: 制霉菌素

答案：B

82.男性，70岁，进食后饱胀不适伴反酸5年余，黑便1天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡（A1期）伴出血。

A: 硝苯地平缓释片

B: 克拉霉素

C: 埃索美拉唑

D: 胶体果胶铋胶囊

答案：C

83.其他 β-内酰胺类抗生素的主作用靶位是

A: 细菌胞浆膜上特殊蛋白PBPs

B: 二氢叶酸合成酶

C: DNA螺旋酶

D: 细菌核蛋自体50S亚基

答案：A

84.无抗结核作用的是

A: 异烟肼

B: 吡嗪酰胺

C: 乙胺丁醇

D: 红霉素

答案：D

85.可用于治疗假膜性肠炎的糖肽类药物是

A: 克林霉素

B: 替硝唑

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/318027027042007022