

眼科测试题库与答案

1、一人原来为正视, 40 岁以后最有可能和最常发生的视力问题是 。

- A、 近视
- B、 远视
- C、 散光
- D、 弱视
- E、 老花

答案： E

2、有关球后视神经炎的诊断标准中, 错误的为 。

- A、 视诱发电位异常
- B、 瞳孔无明显异常
- C、 视野有中心暗点
- D、 急性时可有眼动疼痛
- E、 远视力、近视力均有障碍, 无法矫正

答案： B

3、某女, 12 岁, 双眼自幼视物不清, 眼部检查: 右眼矫正视力: 0. 2, 左眼矫正视力: 0. 1。该患者诊断为 。

- A、 双眼低视力
- B、 单眼低视力
- C、 单眼盲
- D、 视力正常
- E、 双眼盲

答案： A

4、巩膜最厚处位于 。

- A、 眼外肌附着处
- B、 赤道部
- C、 视神经穿出处
- D、 视神经周围
- E、 后极部

答案： D

5、下列哪项不是大泡性角膜病变的原因 。

- A、 角膜内皮营养不良晚期
- B、 自身免疫
- C、 无晶体眼的玻璃体疝
- D、 长期高眼压所致的绝对青光眼

E、眼前节手术损伤角膜内皮

答案：B

6、关于过敏性结膜炎,何者不对。

A、乳头增生

B、常有药物或花粉接触史

C、结膜囊分泌物中可见大量脓细胞

D、结膜轻度充血

E、可有滤泡形成及少量黏性分泌物

答案：C

7、女,55岁,小梁切除后第二天,眼压34mmHg,球结膜滤过泡扁平,前房深。最可能的原因是。

A、恶性青光眼

B、滤过泡瘢痕化

C、脉络膜脱离

D、滤过过强

E、巩膜切除口阻塞

答案：E

8、晶状体囊外摘除术后,后囊膜发生混浊,称为。

A、后发性白内障

B、并发性白内障

C、假性白内障

D、瞳孔膜闭

E、外伤性白内障

答案：A

9、关于玻璃体积血错误的是。

A、出血来自邻近组织

B、以上全对

C、可引起PVD

D、可引起视网膜脱离

E、出血来自玻璃体本身血管

答案：E

10、下列后发性白内障的说法哪项错误。

A、影响视力的程度与后囊膜混浊程度和厚度无关

B、可用激光将瞳孔区的后囊膜切开

C、儿童期白内障术后几乎均发生

- D、 常伴有虹膜后粘连
- E、 可发生白内障囊外摘除术后

答案： A

11、 睫状充血的特点不包括 。

- A、 围绕角膜呈毛刷状
- B、 为前睫状动脉充血
- C、 滴用肾上腺素液后充血并不减轻
- D、 推动结膜时血管不移动
- E、 愈靠近角膜缘充血愈不显著

答案： E

12、 关于树枝状和地图状角膜炎的治疗,何者错误 。

- A、 可全身应用抗病毒药物
- B、 必要时可应用干扰素
- C、 局部点用正大捷普、无环鸟苷眼药水等
- D、 可适量应用糖皮质激素
- E、 局部涂红霉素眼膏

答案： D

13、 眼在调节放松状态下所能看清的最远点称 。

- A、 节点
- B、 近点
- C、 主点
- D、 远点
- E、 中和点

答案： D

14、 以下有关 Goldmann 压平眼压计说法不正确的是 。

- A、 眼压值基本不受球壁硬度影响
- B、 眼压值受角膜弯曲度影响大
- C、 目前最准确的眼压计
- D、 可附装在裂隙灯显微镜上
- E、 目前国际较通用

答案： B

15、 早期出现明显视力障碍的是 。

- A、 核性白内障
- B、 后囊膜下白内障
- C、 晶状体溶解性青光眼

D、 皮质性白内障的初发期

E、 皮质性白内障的膨胀期

答案： B

16、 患者男性, 30 岁, 左眼细菌性角膜溃疡愈合后遗留角膜瘢痕性混浊, 较厚, 白色, 但仍可透见虹膜的称为 。

A、 角膜云翳

B、 角膜白斑

C、 角膜斑翳

D、 角膜瘻

E、 角膜溃疡

答案： C

17、 散瞳后, 应用检眼镜彻照法, 可在眼底红光反射中看到轮辐状混浊的阴影的是 。

A、 皮质性白内障的初发期

B、 皮质性白内障的过熟期

C、 皮质性白内障的膨胀期

D、 皮质性白内障的成熟期

E、 核性白内障

答案： A

18、 睫毛根部的睑缘处红肿, 初起眼睑红肿范围较弥散, 剧烈疼痛, 有硬结, 压痛明显, 同侧耳前淋巴结也可肿大。此种情况可见于 。

A、 接触性皮炎

B、 内睑腺炎

C、 外睑腺炎

D、 溃疡性睑缘炎

E、 眦部睑缘炎

答案： C

19、 眼眶蜂窝组织炎最常见病灶源是 。

A、 手术感染

B、 外伤

C、 眶异物残留

D、 鼻旁窦

E、 急性泪囊炎

答案： D

20、 成人双侧眼球突出的最常见的原因因为 。

- A、 甲状腺相关性眼病
- B、 淋巴管瘤
- C、 转移性眼眶肿瘤
- D、 泪腺混合瘤
- E、 颈动脉海绵窦瘤

答案： A

21、角膜基质炎的治疗方法是 。

- A、 局部用糖皮质激素点眼
- B、 结膜下注射激素
- C、 伴有虹膜炎者,用 1%阿托品点眼
- D、 针对病因治疗,如抗病毒、抗结核等
- E、 以上全是

答案： E

22、下列哪种角膜炎最危险 。

- A、 绿脓杆菌性角膜炎
- B、 真菌性角膜炎
- C、 匍行性角膜溃疡
- D、 棘阿米巴性角膜炎
- E、 病毒性角膜炎

答案： A

23、可使用房角开放药物是 。

- A、 20%甘露醇
- B、 苏打片
- C、 1%匹罗卡品
- D、 0.5%噻吗心安眼药水
- E、 乙酰唑胺

答案： C

24、下列有关配戴接触镜的角膜氧的供应叙述错误的是 。

- A、 氧的供氧量更重要的是取决于镜片透氧率
- B、 缺氧的角膜容易发生细菌感染
- C、 硬镜片与角膜相贴过紧,最终导致角膜变性和新生血管
- D、 硬镜片的曲率半径与角膜适应,有利于角膜得到足够的氧
- E、 尽管软镜片具有一定的透氧性,但泪液交换困难,使戴镜片的角膜呈现慢性缺氧状态

答案： A

25、下列哪项不是白内障囊外摘除术的适应症 。

- A、 严重的后囊膜增厚混浊
- B、 有视网膜脱离病史者
- C、 虹膜广泛后粘连的并发性白内障
- D、 外伤性白内障, 晶体囊膜已经破裂者
- E、 接近成熟期或成熟期老年性白内障

答案：A

26、虹视最常见于 。

- A、 虹膜睫状体炎
- B、 急性闭角型青光眼
- C、 开角型青光眼
- D、 急性结膜炎
- E、 继发性青光眼

答案：B

27、关于原发性闭角型青光眼的解剖学特征哪项不正确 。

- A、 眼轴过长
- B、 晶状体较厚, 位置相对靠前
- C、 前房角狭窄
- D、 角膜直径较小
- E、 前房浅

答案：A

28、视神经全长 42~50mm, 被分为 4 段, 不包括在内的是 。

- A、 颅内段
- B、 眶内段
- C、 管内段
- D、 肌内段
- E、 眼内段

答案：D

29、青光眼可引起下列哪种类型的白内障 。

- A、 并发性白内障
- B、 糖尿病性白内障
- C、 手足搐搦性白内障
- D、 半乳糖性白内障
- E、 中毒性白内障

答案：A

30、突然视力下降无眼痛的眼病不包括 。

- A、 白内障
- B、 视神经炎
- C、 视网膜脱离
- D、 视网膜静脉阻塞
- E、 视网膜动脉阻塞

答案： A

31、房水充满前房和后房,全量约为 。

- A、 0.10~0.12ml
- B、 0.06~0.10ml
- C、 0.20~0.40ml
- D、 0.12~0.15ml
- E、 0.15~0.30ml

答案： E

32、关于 β -肾上腺受体阻滞剂治疗青光眼不正确的是 。

- A、 可影响到瞳孔的大小
- B、 主要机制是通过抑制房水生成而降低眼压
- C、 降压作用长效,一般可持续 12~24 小时,通常每日只需点药 2 次
- D、 可出现心率减慢,血压下降,支气管痉挛等
- E、 局部应用有刺激症状

答案： A

33、关于盘状基质炎,何者错误 。

- A、 角膜中央区基质呈盘状水肿
- B、 视力障碍较重
- C、 患者刺激症状较轻
- D、 角膜上皮完整
- E、 治疗时禁用糖皮质激素

答案： E

34、巩膜三大薄弱处位于 。

- A、 角巩膜缘、赤道部、巩膜筛板
- B、 角巩膜缘、肌肉附着点、赤道后
- C、 角巩膜缘、肌肉附着点、巩膜筛板
- D、 巩膜筛板、赤道部、赤道后
- E、 肌肉附着点、赤道部、赤道后

答案： B

35、下列后发性白内障的说法哪项错误 。

- A、 影响视力的程度与后囊膜混浊程度和厚度无关
- B、 可用激光将瞳孔区的后囊膜切开
- C、 儿童期白内障术后几乎均发生
- D、 常伴有虹膜后粘连
- E、 可发生白内障囊外摘除术后

答案： A

36、哪项不是原发性开角型青光眼的特征 。

- A、 出现旁中心暗点, 弓形暗点
- B、 病人多无自觉症状
- C、 $C/D > 0.6$, 双眼 C/D 之差值 > 0.2
- D、 眼压多正常或眼压昼夜波动范围大
- E、 前房极浅, 房角开放

答案： E

37、一般不会出现双颞侧偏盲的病变有 。

- A、 视交叉处的损害
- B、 脱髓鞘疾病
- C、 视束病变
- D、 屈光性暗点
- E、 双眼高度近视

答案： C

38、暴露性角膜炎的治疗关键是 。

- A、 睑缘缝合
- B、 抗生素消炎
- C、 去除暴露原因
- D、 眼罩遮盖
- E、 戴软性角膜接触镜

答案： C

39、对于单纯性角膜伤口, 长度超过多少以上, 需手术缝合 。

- A、 1mm
- B、 5mm
- C、 2mm
- D、 3mm
- E、 4mm

答案： D

40、0.5%噻吗心安眼药水对哪种青光眼最合适。

- A、 慢性闭角型青光眼
- B、 先天型青光眼
- C、 急性闭角型青光眼
- D、 新生血管性青光眼
- E、 慢性单纯性青光眼

答案：E

41、过敏性结膜炎治疗原则。

- A、 去除过敏原
- B、 服抗过敏药物
- C、 短期应用类固醇眼药水
- D、 可静脉推注葡萄糖酸钙
- E、 以上全对

答案：E

42、与远视眼无关的是。

- A、 高度远视时有远近视力均降低
- B、 调节性内斜
- C、 视神经乳头炎
- D、 老视出现早
- E、 视疲劳

答案：C

43、检影验光时,90。方向用-3.00D 柱镜中和,180。方向用-1.00D 柱镜中和,该例验光结果为。

- A、 -3.00DS/-2.00DC×90
- B、 -1.00DS/-2.00DC×180
- C、 -3.00DS/-1.00DC×180
- D、 -2.00DS/-1.00DC×180
- E、 -1.00DS/-3.00DC×90

答案：B

44、关于翼状胬肉的手术适应症,何者不对。

- A、 胬肉妨碍眼球运动
- B、 静止期胬肉
- C、 胬肉有碍美观
- D、 做白内障或角膜移植术前
- E、 胬肉遮盖部分或全部瞳孔

答案：B

45、患者女性, 50 岁, 右眼胀痛伴视力下降 2 天, 以往有类似发作。检查: 右眼视力 0.5, 结膜充血, 角膜轻度水肿, 角膜后见羊脂状角膜后沉着物, 房水闪辉阴性, 瞳孔大小正常, 测眼压 40mmHg。目前最主要的治疗措施是 。

- A、 皮质类固醇与降眼压治疗
- B、 降眼压与抗生素治疗
- C、 皮质类固醇
- D、 缩瞳治疗
- E、 扩瞳治疗

答案：A

46、对于蒸发过强型干眼症, 其治疗措施主要有 。

- A、 以上均可
- B、 按摩挤压睑板腺内分泌物
- C、 治疗睑缘炎
- D、 口服抗生素
- E、 短期激素使用

答案：A

47、脑垂体瘤压迫出现的典型视野缺损为 。

- A、 左侧同侧偏盲
- B、 双颞侧偏盲
- C、 下侧偏盲
- D、 右侧同侧偏盲
- E、 双鼻侧偏盲

答案：B

48、关于中间部葡萄膜炎的临床表现哪项不正确 。

- A、 可见羊脂状 KP, 房水闪辉及房水细胞较少
- B、 玻璃体可出现雪球样混浊
- C、 易致视网膜损害
- D、 雪堤样改变多见于上方, 是特征性改变
- E、 症状轻重不一

答案：D

49、患者男, 64 岁, 左眼白内障手术后 1 年发生后囊膜混浊 (PCO), 以下哪项与 PCO 发生无关 。

- A、 术中皮质残留
- B、 术后虹膜睫状体炎症反应强

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/318052105046006037>