

2023 年护师类之主管护师题库及精品答案

单选题（共 60 题）

1、低位性肠梗阻呕吐物为（ ）。

- A. 不含胆汁
- B. 含胆汁
- C. 粪臭味呕吐物
- D. 血性呕吐物
- E. 咖啡色呕吐物

【答案】 C

2、风湿性瓣膜病二尖瓣狭窄病人，左房附壁血栓脱落最常见的栓塞部位是

- A. 肺栓塞
- B. 脑栓塞
- C. 下肢静脉栓塞
- D. 上肢动脉栓塞
- E. 肠系膜动脉栓塞

【答案】 B

3、女，42 岁。警察。与歹徒搏斗时，左侧腰部被刺后入院，血压75/50mmHg，伤口持续溢出淡红色液体。左上腹触痛，但无肌紧张及反跳痛。为明确诊断应首选

- A. B 超检查
- B. 排泄性尿路造影
- C. 腹腔穿刺

D. 腹部 X 线平片

E. CT

【答案】 A

4、妊娠高血压综合征孕妇于妊娠晚期出现腹痛伴阴道出血，最可能的诊断是（ ）。

A. 妊娠合并宫颈息肉

B. 胎盘早期剥离

C. 前置胎盘

D. 子宫破裂

E. DIC

【答案】 B

5、会阴擦洗的目的不包括（ ）。

A. 保持会阴及肛门部清洁

B. 促进患者舒适

C. 促进会阴伤口愈合

D. 增加受孕机会

E. 防止泌尿，生殖系统感染

【答案】 D

6、普通高血压病人的降压目标是将血压降至（ ）。

A. 120/70mmHg 以内

B. 130/80mmHg 以内

C. 140/90mmHg 以内

D. 150/90mmHg 以内

E. 150/95mmHg 以内

【答案】 C

7、某男，28岁，患巨幼细胞性贫血，确诊的最重要指标是

A. 骨髓象

B. 叶酸和维生素 B

C. 血常规

D. 内因子抗体测定

E. 胃液分析

【答案】 B

8、患者男，65岁。患脑卒中后一侧肢体偏瘫，同时合并肺心病。患者不宜采取的体位是（ ）。

A. 仰卧位

B. 健侧卧位

C. 半坐卧位

D. 俯卧位

E. 坐位

【答案】 D

9、乙型肝炎的被动免疫生物制品是（ ）。

A. 丙种球蛋白

- B. 高效价乙肝免疫球蛋白
- C. 胎盘球蛋白
- D. 抗毒素
- E. 乙型肝炎疫苗

【答案】 B

10、患者男，32岁。有“支气管扩张症”病史。近日慢性咳嗽咳痰加重，经痰培养后，医嘱在头孢抗生素基础上加用替硝唑治疗，提示痰培养发现了（ ）。

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 铜绿假单胞菌
- C. 阴沟肠杆菌
- D. 厌氧菌
- E. 克雷伯肺炎杆菌

【答案】 D

11、患者女，24岁。停经40天。血清hCG 1500IU/L。B超示左侧卵巢有一个1cm×2cm大小的肿块。入院诊断为异位妊娠。经过与主治医生沟通，决定接受非手术治疗。不正确的护理措施是（ ）。

- A. 如果阴道出血量少于月经量可予继续观察
- B. 可以适当活动
- C. 严密观察一般生命体征，对患者主诉仅供参考
- D. 协助正确提取血液标本，以检测治疗效果
- E. 饮食以清淡饮食为主，以患者的喜好为准

【答案】 C

12、关于骨牵引的护理，错误的叙述是（ ）。

- A. 床尾或床头抬高 15~30cm
- B. 牵引针不可左右移动
- C. 及时去除牵引针孔的血痂
- D. 维持肢体在整复或固定的位置
- E. 鼓励患者功能锻炼

【答案】 C

13、某孕妇 25 岁，孕 1 产 0，早孕出现较重的呕吐。现孕 8 周，皮肤黏膜苍白，毛发干燥无光泽，活动无力、易头晕。实验室检查：血红蛋白 70g/L，红细胞比容 0.15，血清铁 6.0 $\mu\text{mol/L}$ 。下列孕期健康宣教内容，错误的是

- A. 重点监测胎心率变化
- B. 如果服用铁剂时胃肠道反应较轻，则不需同服维生素
- C. 应列为高危妊娠，加强母子监护
- D. 重点评估胎儿宫内生长发育状况
- E. 给予心理支持，减少心理应激

【答案】 B

14、慢性疾病的发展规律，不正确的是（ ）。

- A. 慢性病起病隐匿
- B. 慢性病可以治愈或根除
- C. 慢性病潜伏期较长，病情迁延
- D. 部分轻型慢性病人，可以通过非药物治疗控制病情
- E. 应重视心理、精神因素在慢病发生中的作用

【答案】 B

15、有利于家庭及其成员健康发展的外部资源为（ ）。

- A. 家庭对其成员提供的各种财物支持
- B. 家庭中具有高学历人员
- C. 家庭及其成员对家庭中患病成员提供的医疗照顾
- D. 完善的医疗卫生服务体系
- E. 家庭成员提供的爱的支持

【答案】 D

16、关于卵巢良性肿瘤临床表现的叙述，正确的是

- A. 排尿困难多见
- B. 早期多无症状
- C. 下腹胀痛为主要症状
- D. 较小的肿瘤即可引起腹胀
- E. 多有发热

【答案】 B

17、传染病病房，物体表面卫生学标

- A. $\leq 200\text{cfu} / \text{cm}^2$
- B. $\leq 10\text{cfu} / \text{cm}^2$
- C. $\leq 15\text{cfu} / \text{cm}^2$
- D. $\leq 5\text{cfu} / \text{cm}^2$
- E. $\leq 500\text{cfu} / \text{cm}^2$

【答案】 C

18、检查胸腔引流管是否通畅的最简单方法是（ ）。

- A. 检查引流管有无扭曲
- B. 检查引流管内有无液体
- C. 观察水封瓶中长管内水柱的波动
- D. 观察病人呼吸音是否正常
- E. 观察水封瓶内有无胸液

【答案】 C

19、患者男，5岁。先天性巨结肠术后，慢性肠炎，患儿腹泻1年余，伴口渴、乏力、烦躁。查体：皮肤干燥、弹性差、眼窝凹陷，其缺水量约占体重的（ ）。

- A. 1~4%
- B. 5~10%
- C. 10~14%
- D. 15~20%
- E. 21~25%

【答案】 B

20、急性胰腺炎患者禁用的药物是（ ）。

- A. 雷尼替丁
- B. 吗啡
- C. 阿托品
- D. 杜冷丁
- E. 生长抑素

【答案】 B

21、患者男，60岁。大便后突发右手无力，讲话不清，约1h后昏迷，查体：浅昏迷，瞳孔等大，血压220/108mmHg，右侧肢体瘫痪，肌张力低，腱反射未引出，右侧巴氏征阳性。该患者可能发生（ ）。

- A. 脑出血
- B. 脑栓塞
- C. 脑血栓形成
- D. 脑梗死
- E. 蛛网膜下腔出血

【答案】 A

22、持续性非卧床腹膜透析患者出现腹膜炎，下列护理措施哪项是错误的？（ ）

- A. 用1000mL透析液连续冲洗3~5次
- B. 暂时改做间歇性腹透
- C. 腹膜透析内加抗生素
- D. 立即拔管
- E. 全身应用抗生素

【答案】 D

23、患者女，20岁。未婚，否认性生活史。突发性右下腹部疼痛，伴恶心、呕吐20小时，发热5小时。肛一腹诊检查：子宫前位，正常大小，右附件区扪及6cm×5cm×4cm大小的囊实性包块，边界清楚，压痛明显。

- A. 剖腹探查术
- B. 抗炎

C. 止痛

D. 镇静

E. 止血

【答案】 A

24、采用洗胃的方式抢救消化道中毒患者，其洗胃时间一般不超过（ ）。

A. 6 小时

B. 5 小时

C. 4 小时

D. 3 小时

E. 2 小时

【答案】 A

25、依沙吡啶引产术需准备物品中不包括

A. 穿刺包

B. 无菌手套

C. 0.5%~1%依沙吡啶溶液

D. 阴道窥器

E. 胶布

【答案】 D

26、患者男，41岁。大量饮酒后突然出现持续性上腹部刀割样剧痛，很快扩散至全腹，伴有恶心、呕吐，呕吐物为咖啡色液体伴胃内容物。查体：面色苍白，四肢厥冷。腹式呼吸减弱，腹肌紧张，全腹压痛反跳痛明显。X线检查示

膈下游离气体，腹腔穿刺抽出黄色浑浊液体，体温 38.7℃，脉搏 116 次/分。血压 128/88mmHg，此时的护理措施错误的是（ ）。

- A. 禁饮食，持续胃肠减压
- B. 热敷上腹部，缓解疼痛
- C. 迅速建立静脉通道，输血补液
- D. 遵医嘱应用止血药物和抗生素
- E. 密切观察胃管内引流液的颜色和量

【答案】 B

27、产褥期妇女的临床表现下列哪项不正确

- A. 产后 2~3 天有宫缩痛
- B. 产后 10 天左右子宫复旧
- C. 血性恶露持续 2 周左右
- D. 浆液恶露持续 10 天左右
- E. 白色恶露持续 3 周

【答案】 C

28、为了解社区环境状况，社区护士可首选的方法是（ ）。

- A. 查阅文献
- B. 实地考察
- C. 人物访谈
- D. 参与性观察
- E. 问卷调查

【答案】 B

29、关于艾滋病病人抗机会性感染的治疗措施，错误的是（ ）。

- A. 鹅口疮选用制霉菌素治疗
- B. 带状疱疹选用两性霉素 B 治疗
- C. 戊烷脒治疗卡氏肺孢子虫肺炎
- D. 卡波西肉瘤选用 AZT 与 α -干扰素联合治疗
- E. 白假丝酵母菌感染可选用制霉菌素治疗

【答案】 B

30、由一对夫妇与其父母、未婚子女构成的家庭属于

- A. 丁克家庭
- B. 核心家庭
- C. 联合家庭
- D. 主干家庭
- E. 单亲家庭

【答案】 D

31、急性甲型肝炎的隔离期为起病后（ ）。

- A. 1 月
- B. 3 周
- C. 5 周
- D. 8 周
- E. 12 周

【答案】 B

32、血栓闭塞性脉管炎局部缺血期的症状是（ ）。

- A. 下肢溃疡
- B. 指端坏死
- C. 间歇性跛行
- D. 静息痛
- E. 足背动脉搏动消失

【答案】 C

33、门静脉高压致上消化道急性出血时的护理措施，错误的是（ ）。

- A. 禁食、补液输血治疗
- B. 大量呕血时应取半卧位
- C. 及时清理呕吐物和血液
- D. 做好心理护理，减轻恐惧
- E. 用冰盐水或冰盐水加血管收缩剂进行胃灌洗

【答案】 B

34、慢性阻塞性肺气肿最重要的慢性并发症是

- A. 肺结核
- B. 自发性气胸
- C. 肺不张
- D. 慢性肺源性心脏病
- E. 肺炎

【答案】 D

35、诊断性刮宫的适应症不包括（ ）。

- A. 不孕症
- B. 阴道排液
- C. 子宫性闭经
- D. 急性宫颈炎
- E. 子宫异常出血

【答案】 D

36、患者男，50岁。肝癌，做肝动脉栓塞化疗。术后出现腹痛，发热，恶心，呕吐。检查发现转氨酶升高，血清白蛋白降低。

- A. 白蛋白
- B. 维生素
- C. 电解质
- D. 脂肪乳
- E. 水分

【答案】 A

37、维持子宫在盆腔正中央的韧带是

- A. 圆韧带
- B. 主韧带
- C. 阔韧带
- D. 宫骶韧带
- E. 骨盆漏斗韧带

【答案】 C

38、男性，68岁，脊柱手术后3日伤口轻度发红，体温37.8℃。下列哪项处理较为合适

- A. 考虑伤口感染，即换广谱抗菌药物
- B. 考虑伤口感染，加大抗菌药物剂量
- C. 无特殊处理，密切观察病情变化
- D. 做血液细菌培养
- E. 伤口探查冲洗

【答案】 C

39、一般情况下全子宫切除术后可以恢复性生活的时间是术后（ ）。

- A. 1个月
- B. 42天
- C. 2个月
- D. 3个月
- E. 6个月

【答案】 D

40、患者女，36岁。孕3个月，自然流产后7天，阴道出血不多，脓血性，伴发热，下腹疼痛5天，今晨加重。体检：体温39.5℃，痛苦面容，腹痛拒按，子宫略大而软，压痛，右侧附件区压痛明显，有一边界不清包块，白细胞 $15 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.9。最可能的诊断是（ ）。

- A. 急性盆腔炎
- B. 右侧卵巢囊肿继发感染

- C. 流产诱发阑尾炎
- D. 腹膜炎
- E. 卵巢囊肿蒂扭转

【答案】 B

41、脑室外引流管的引流量每天不应超过（ ）。

- A. 1000mL
- B. 800mL
- C. 600mL
- D. 500mL
- E. 300mL

【答案】 D

42、原发性肝癌的预防，最重要的措施是

- A. 保持心情舒畅
- B. 不吃腌制食品
- C. 防治病毒性肝炎、肝硬化
- D. 戒烟、忌酒
- E. 控制饮食，加强运动

【答案】 C

43、以下哪项不是右心衰竭的临床表现

- A. 恶心、呕吐
- B. 早期在身体疏松部位出现水肿

C. 肝大、肝区胀痛

D. 颈静脉怒张

E. 口唇发绀

【答案】 B

44、20岁男性，发热起病，体温38℃，三天后体温下降伴周身乏力，食欲缺乏，恶心呕吐，近2天发现尿色深如豆油样，胆红素定量80 μmol/L，抗HBs(+)，抗HAV-IgM(+)，巩膜及皮肤中等度黄疸，肝区轻度叩痛，肝肋下触及1.0cm质软，脾侧卧未及，胆囊区无压痛。此病人目前的主要治疗措施是

A. 保肝治疗

B. 卧床休息

C. 调节免疫功能治疗

D. 抗病毒治疗

E. 支持治疗

【答案】 B

45、患者女，35岁。2个月前被诊断为1型糖尿病，遵医嘱注射胰岛素，1个月后自感无不适，自行中断胰岛素药物治疗。1周后突然昏迷，呕吐，伴头痛，呼吸深快，嗜睡，压眶无反应。最可能的诊断是（ ）。

A. 低血糖昏迷

B. 糖尿病酮症酸中毒

C. 糖尿病肾病尿毒症昏迷

D. 高渗性非酮症糖尿病昏迷

E. 乳酸性酸中毒

【答案】 B

46、有关会阴擦洗的适应证，应除外

- A. 长期卧床的妇女
- B. 产后 1 个月的妇女
- C. 外阴部手术后的病人
- D. 阴道手术后的病人
- E. 腹部术后留置尿管的病人

【答案】 B

47、血栓闭塞性脉管炎病人的护理中哪项是错误的？（ ）

- A. 要求病人绝对戒烟
- B. 指导病人做伯尔格运动
- C. 患肢局部加热水袋保暖
- D. 观察局部皮肤温度
- E. 防止患肢外伤

【答案】 C

48、李女士，怀孕 36 周，第 1 胎。昨晚突然阴道出血，出血量约 400ml，无腹痛。检查：血压 100/60mmHg，宫底高度与孕月相符，腹软无压痛，胎位清楚，胎心音 110 次/分。

- A. 先兆早产
- B. 正常临产
- C. 前置胎盘
- D. 胎盘早剥
- E. 流产

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/318070135021006036>