临床执业医师考试考试真题及答案

一、A1 题型

1.2025 年，某地区发生暴力伤害医务人员事件，医院对于这种暴力伤害所采取的措施，下述有误的是

A.加强安全保卫措施

B.推行感动服务

C.积极化解纠纷

D.加强媒体沟通

E.加强临床风险管理

【正确答案】E

【答案解析】加强临床风险管理，属于患者安全及防范措施中的内容，而医务人员安全防范措施并不包含此项。

2.以下属于心包穿刺术的禁忌证的是

A.生命体征平稳的少量、包裹性或心脏后部心包积液

B.无法纠正的凝血异常

C.无心脏压塞的少量、包裹性或心脏后部心包积液

D.正在接受抗凝治疗且 PT-INR＞1.5 或血小板数＜50×109/L

E.以上均是心包穿刺术的禁忌证

【正确答案】E

【答案解析】心包穿刺术的禁忌证 1）无心脏压塞或生命体征平稳的少量、包裹性或心脏后部心包积液。2）无法纠正的凝血异常、正在接受抗凝治疗且 PT-INR＞1.5 或血小板数＜50×109/L。3）需要紧急手术治疗的胸部创伤、心脏破裂或主动脉夹层引起

的心包积液。需要注意的是，由于心包腔穿刺是抢救病人生命的重要措施，在患者生命体征不稳定需要紧急处理时，不存在绝对禁忌证。

3.男性，52 岁，因反复出现头晕、鼻出血 5 年就诊。有疟疾病史。查体：巩膜无黄染，肝未触及，脾左肋下 8cm，无腹水征。肝功能正常，骨髓检查增生骨髓象。食道吞钡透视检查无食道静脉曲张。最有效的治疗方法是

A.应用补血药

B.用止血药

C.内科化疗

D.脾切除术

E.观察

【正确答案】D

【答案解析】对于疟疾引起的巨脾者，可手术切除，防止巨脾、脾亢引起的出血。

4.男，45 岁，因患严重精神分裂症，用氯丙嗪治疗，两年来用的氯丙嗪量逐渐增加至600mg/d，才能较满意的控制症状，但近日出现肌肉震颤，动作迟缓，流涎等症状，对此，应选何药纠正

A.苯海索

B.左旋多巴

C.金刚烷胺

D.地西泮

E.溴隐亭

正确答案：A

答案解析：苯海索

5.女，60 岁。右膝关节严重疼痛，步行距离少于 400 米。查体：右膝关节屈曲挛缩畸形，活动受限，负重位膝关节正位 X 线片显示右膝内侧关节间隙消失，骨质硬化，边缘骨赘增生。最可能的诊断是

A.骨关节炎

B.痛风关节炎

C.化脓性关节炎

D.骨关节结核

E.风湿性关节炎

【正确答案】A

【答案解析】老年人膝关节的变形+关节间隙消失＋边缘骨赘增生=老年性骨关节炎，故本题选 A。

6.根除幽门螺杆菌治疗后，不宜选用的复查方法是

A.13C 或 14C 尿素呼气试验

B.血清幽门螺杆菌抗体检查

C.组织学检查

D.快速尿素酶试验

E.幽门螺杆菌培养

【正确答案】B

【答案解析】血清抗幽门螺杆菌抗体测定：为非侵入性间接检查幽门螺杆菌感染的方法，阳性表明受试者曾感染了幽门螺杆菌，但不表示幽门螺杆菌现症感染。

7.女性，32 岁，持续心前区疼痛 2 天，深吸气或咳嗽可加重，胸骨左缘第 3、4 肋间闻及抓刮样粗糙音，盖过心音。该患者最可能的诊断是

A.心绞痛

B.急性心包炎

C.急性心肌梗死

D.肥厚型心肌病

E.感染性心内膜炎

【正确答案】B

【答案解析】急性纤维蛋白性心包炎的典型体征是心包摩擦音，因炎症而变得粗糙的壁层与脏层在心脏活动时相互摩擦而产生，呈抓刮样粗糙音，与心音的发生无相关性。

8.抗肿瘤免疫最重要的杀伤细胞是

A.NK 细胞

B.巨噬细胞

C.CD8+CTL

D.IgG

E.Th 细胞

正确答案：C

答案解析：抗肿瘤免疫的效应机制：NK 细胞可天然杀伤 MHC Ⅰ类分子下调的肿瘤细胞，是早期监视和清除肿瘤的重要效应细胞，是机体抗肿瘤的第一道防线。CD8+CTL 是抗肿瘤免疫最重要的杀伤细胞，通过特异性杀伤肿瘤细胞或分泌 IFN-γ/TNF-β 等激活 NK、巨噬细胞间接杀伤肿瘤细胞。CD4+Th1 细胞通过分泌 IL-2、IFN-γ 辅助激活 CD8+CTL，在抗肿瘤免疫应答中起重要作用。IgG 无直接抗肿瘤作用，但通过激活补体介导的攻膜破坏、ADCC 激活 NK 杀伤发挥抗肿瘤作用。

9.贮存铁的是

A.血红蛋白铁

B.肌红蛋白铁

C.白蛋白中的铁

D.乳铁蛋白结合的铁

E.铁蛋白

【正确答案】E

【答案解析】铁的贮存有两种形式:铁蛋白和含铁血黄素。

10.下述关于三叉神经痛的特点与之不符的是

A.半月神经节退行性变

B.多发于 40 岁以上女性

C.疼痛以上颌、鼻唇沟处疼痛明显

D.可引起引起面肌抽搐

E.间歇期完全正常

【正确答案】C

【答案解析】三叉神经痛主要疼痛以下颌、面颊或舌最明显。

11.男，69 岁。动作缓慢、走路前倾小步 2 年，伴手部震颤。查体：对答切题，面具脸，四肢肌力正常，肌张力增高。头颅 CT 未见明显异常。最可能的诊断是

A.脊髓血管病

B.亚急性脊髓联合变性

C.帕金森病

D.进行性脊髓萎缩症

E.脊髓空洞症

【正确答案】C

【答案解析】动作缓慢、震颤，CT 未见异常是帕金森病的表现，帕金森病由于面肌强直使表情和瞬目动作减少，造成“面具脸”。

12.女，20 岁。头晕、乏力 1 年。实验室检查：Hb70g/L，RBC3.0×1012/L，WBC4.1×109/L，Plt200×109/L，血清铁蛋白 4μg/L。最可能的诊断是

A.慢性病性贫血

B.巨幼细胞贫血

C.缺铁性贫血

D.地中海贫血

E.骨髓增生异常综合征

【正确答案】C

【答案解析】患者血红蛋白低于正常值；血清铁蛋白是体内储存铁的指标，低于 12μg/L 可作为缺铁的依据。

13.肉瘤最常见的转移方式是

A.直接蔓延

B.淋巴道转移

C.血道转移

D.种植性转移

E.混合转移

正确答案：C

答案解析：血道转移是肉瘤最常见的转移方式。

14.女性，20 岁。发热、咳嗽、流涕 2 周后热退，但又出现胸闷心悸，心率 120 次/分，心律不齐，偶闻早搏。心电图：低电压，T 波低平。心肌酶谱检查 CK-MB 80IU/L。最有可能的诊断是

A.急性心包炎

B.扩张型心肌病

C.病毒性心肌炎

D.风湿性心肌炎

E.风湿性心脏病

【正确答案】C

【答案解析】患者 2 周前有病毒感染的症状，现出现胸闷心悸、心律不齐，心电图 T 波低平， CK-MB 升高，支持病毒性心肌炎的诊断。

15.早产儿，男性，体重 1450g，人工喂养。出生后 6 天出现腹胀，伴有呕吐，呕吐物中含有胆汁，继而出现腹泻，有黏液血便。查体：T38℃，腹膨隆，叩诊鼓音，腹部未触及包块，肠鸣音弱。为明确诊断需进行一系列检查。1)此时下列检查哪项是不适宜的

A.化验血常规

B.大便培养

C.X 线腹部平片

D.腹部 B 超

E.钡灌肠造影

【正确答案】E

【答案解析】钡灌肠造影可引起肠穿孔，故应禁做。

16.女性，50 岁。直肠癌切除术后 3 天，晨起时突发左下肢肿胀，左腿皮温增高，股三角区有深压痛。最可能的诊断是左下肢

A.淋巴水肿

B.动脉栓塞

C.大隐静脉曲张

D.深静脉血栓形成

E.血栓性浅静脉炎

【正确答案】D

【答案解析】下肢深静脉血栓主要表现为起病急骤，全下肢明显肿胀，股三角区有疼痛和压痛，浅静脉扩张，患肢皮温及体温均升高。

17.初始血尿病变部位为

A.肾脏

B.输尿管

C.肾盂

D.膀胱

E.膀胱颈部或尿道

【正确答案】E

【答案解析】血尿依出现的先后顺序分为初始血尿、终末血尿及全血尿，初始血尿仅在排尿开始时尿内有血，提示病变位于膀胱颈部或尿道。

18.关于原发性甲状旁腺功能亢进症的描述错误的是

A.血钙值＞3.0mmol/L，血磷值＜0.65～0.97mmol/L

B.分为无症状型及症状型两类

C.以药物治疗为主

D.甲状旁腺素（PTH）测定值升高

E.甲状旁腺瘤、增生及腺癌分泌过多的 PTH

【正确答案】C

【答案解析】原发性甲状旁腺功能亢进包括无症状型及症状型两类。

19.关于霍乱的临床表现，错误的是

A.容易发生休克

B.易出现代谢性碱中毒

C.容易出现腓肠肌痉挛

D.低血钾

E.感染霍乱的患者，可迅速死亡

【正确答案】B

【答案解析】霍乱病人腹泻导致丢失大量 HCO-，引起代谢性酸中毒，表现为呼吸深快，严重者出现酸中毒大呼吸，所以 B 叙述是错误的。

20.E 直接接触药品的包装材料和容器未经批准的药品

A.超过有效期的药品

C.未标明有效期或者更改有效期的药品

D.国务院药品监督管理部门规定禁止使用的药品

正确答案：E

答案解析：有下列情形之一的药品，按假药论处：①国务院药品监督管理部门规定禁止使用的；②依照本法必须批准而未经批准生产、进口，或者依照本法必须检验而未

经检验即销售的；③变质的；④被污染的；⑤使用依照本法必须取得批准文号而未取得批准文号的原料药生产的；⑥所标明的适应证或者功能主治超出规定范围的。

21.男，25 岁。反复腹痛、腹泻、便血 10 个月。近日加重伴发热，体温 39℃，1 天前因腹痛肌注阿托品治疗 6 小时后腹胀明显。查体：70/50mmHg，心率 120 次/分。最可能出现的情况是

A.肠套叠

B.肠穿孔

C.肠梗阻

D.肠出血

E.中毒性巨结肠

【正确答案】E

【答案解析】患者的临床表现考虑溃疡性结肠炎，应用阿托品后引起中毒性巨结肠，病情加重。中毒性巨结肠，多发生在暴发型或重症溃疡性结肠炎患者。此时结肠病变广泛而严重，累及肌层与肠肌神经丛，肠壁张力减退，结肠蠕动消失，肠内容物与气体大量积聚，引起急性结肠扩张，一般以横结肠为最严重。常因低钾、钡剂灌肠、使用抗胆碱能药物或阿片类制剂而诱发。临床表现为病情急剧恶化，毒血症明显，有脱水与电解质平衡紊乱，出现鼓肠、腹部压痛，肠鸣音消失。血常规白细胞计数显著升高。X 线腹部平片可见结肠扩大，结肠袋消失。

22.癌细胞来自小叶的终末导管及腺泡，未穿破基底膜，累及小叶

A.乳腺小叶原位癌

B.乳腺导管内原位癌

C.paget 病

D.乳腺浸润性癌

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/318135014062007035