

药物应用护理专业知识考试复习题库(含答案)

单选题

1. 关于丙硫氧嘧啶的叙述，错误的是

- A、抑制过氧化物酶，抑制甲状腺激素合成
- B、需用药2-3周后才能充分显效
- C、合用大剂量的碘能增效
- D、可用于重症甲亢的治疗
- E、可用于治疗甲状腺危象

标准答案: C

2. 缓解心绞痛发作最有效、作用最快的药物是(2012执业护考真题)

- A、硝苯地平
- B、普萘洛尔
- C、阿司匹林
- D、硝酸甘油
- E、阿托品

标准答案: D

3. 变异型心绞痛首选()

- A、硝酸甘油
- B、普萘洛尔
- C、维拉帕米
- D、硝苯地平

E、硝酸异山梨酯

标准答案: D

4. 使用糖皮质激素治疗的患者宜采取

A、高盐、低糖、高蛋白饮食

B、低盐、低糖，高蛋白饮食

C、低盐、低糖、低蛋白饮食

D、高盐、高糖、低蛋白饮食

E、高盐、高糖、高蛋白饮食

标准答案: B

5. 药物中毒时，为了加速药物的排泄应选药

A、山梨醇

B、螺内酯

C、乙酰胜胺

D、呋塞米

E、50%葡萄糖

标准答案: D

6. 某新生儿诊断为低钙血症。医嘱：静脉注射10%葡萄糖酸钙。护士要注意观察的是

A、防止心动过缓，保持心率 $\geq$ 80次/分

B、防止心动过缓，保持心率 $\geq$ 90次/分

C、防止心动过缓，保持心率 $\geq$ 100次/分

D、防止心动过速，保持心率 $\leq$ 80次/分

E、防止心动过速，保持心率 <100次/分

标准答案：A

7. 强心苷的最佳适应证是(

- A、高血压性心力衰竭伴心房纤颤
- B、严重二尖瓣狭窄诱发的心力衰竭
- C、肺源性心脏病导致的心力衰竭
- D、甲状腺功能亢进诱发的心力衰竭
- E、重度贫血引起的心力衰竭

标准答案：A

8. 高血压危象首选

- A、卡托普利
- B、尼群地平
- C、硝普钠
- D、利血平
- E、硝苯地平

标准答案：C

9. 下列不属于硫脲类药物的是

- A、甲硫氧嘧啶
- B、格列本脲
- C、甲巯咪唑
- D、丙硫氧嘧啶
- E、卡比马唑

标准答案：B

10. 一代H1受体阻断药最常见的不良反应是

- A、变态反应
- B、烦躁、失眠
- C、致畸
- D、消化道反应
- E、镇静、嗜睡

标准答案：E

11. 苯巴比妥中毒导泻选用()

- A、硫酸镁
- B、硫酸钠
- C、酚酞
- D、液体石蜡
- E、甘油

标准答案：B

12. 具有抗利尿作用、可用于治疗尿崩症的药物是

- A、呋塞米
- B、氢氯噻嗪
- C、氢氟噻嗪
- D、螺内酯
- E、氨苯蝶啶

标准答案：B

13. 下列哪种药物通过拮抗醛固酮而产生利尿作用

- A、呋塞米
- B、阿米洛利
- C、氨苯蝶啶
- D、螺内酯
- E、氢氯噻嗪

标准答案：D

14. 高血压伴溃疡病患者，禁用下列哪种药物

- A、甲基多巴
- B、哌唑嗪
- C、可乐定
- D、利血平
- E、卡托普利

标准答案：D

15. 补充小剂量糖皮质激素用于治疗

- A、肾病综合征
- B、严重感染
- C、湿疹
- D、慢性肾上腺皮质功能减退症
- E、过敏性休克

标准答案：D

16. 轻中度心源性水肿患者首选

- A、氢氯噻嗪
- B、螺内酯
- C、呋塞米
- D、乙酰唑胺
- E、氨苯蝶啶

标准答案: A

17. 苯海拉明可用于治疗

- A、反流性食管炎
- B、晕动病
- C、过敏性休克
- D、支气管哮喘
- E、胃溃疡

标准答案: B

18. 患者，男，63岁，慢性胃炎，幽门螺杆菌(+)，需要采用抗菌药物治疗，其用药原则是(2016年)

- A、剂量宜大
- B、宜静脉给药
- C、联合用药
- D、宜长期使用
- E、药物种类不受限制

标准答案: C

19. 下列哪项不是洋地黄类药物的常见毒性反应(2011年)

- A、食欲不振、恶心、呕吐
- B、室性期前收缩二联律
- C、窦性心动过缓
- D、出血性膀胱炎
- E、头痛、视力模糊、黄绿色视

标准答案: D

20. 以下哪个药物可用于抗早孕

- A、催产素
- B、麦角新碱
- C、前列腺素
- D、麦角胺
- E、麦角毒

标准答案: C

21. 缓解心绞痛发作最有效、作用最快的药物是(2012执业护考真题)

- A、硝苯地平
- B、普萘洛尔
- C、阿司匹林
- D、硝酸甘油
- E、阿托品

标准答案: D

22. 患者。女40岁，近1月来自觉疲乏、无力、头晕，医嘱硫酸亚铁溶液口服，为减少不良反应，正确的给药方法是

- A、饭前服用
- B、直接喝
- C、茶水送服
- D、牛奶送服
- E、服药后及时漱口

标准答案： E

23. 补充小剂量糖皮质激素用于治疗

- A、肾病综合征
- B、严重感染
- C、湿疹
- D、慢性肾上腺皮质功能减退症
- E、过敏性休克

标准答案： D

24. 高血压合并支气管哮喘者，应避免使用

- A、普萘洛尔
- B、卡托普利
- C、甲基多巴
- D、可乐定
- E、硝苯地平

标准答案： A

25. 麦角新碱不用于催产和引产的原因是

- A、作用较弱

- B、妊娠子宫对其敏感性较低
- C、起效缓慢
- D、引起血压下降
- E、作用强而持久，剂量稍大即可引起子宫强直性收缩

标准答案： E

26. 能阻断外周D.受体，产生止吐作用的药物是()

- A、东莨菪碱
- B、西咪替丁
- C、多潘立酮
- D、哌仑西平
- E、丙谷胺

标准答案： C

27. 缩宫素对子宫平滑肌的作用特点是

- A、小剂量即可引起强直性收缩
- B、作用快速、短暂
- C、孕激素可以提高其敏感性
- D、雌激素可以降低其敏感性
- E、妊娠早期敏感性高

标准答案： B

28. 高血压伴溃疡病患者，禁用下列哪种药物

- A、甲基多巴
- B、哌唑嗪

- C、可乐定
- D、利血平
- E、卡托普利

标准答案：D

29. 以下何种药为基础降压药

- A、普萘洛尔
- B、氢氯噻嗪
- C、托洛尔
- D、利血平
- E、卡托普利

标准答案：B

30. 主要通过保护胃黏膜治疗消化性溃疡的药物是()

- A、碳酸氢钠
- B、哌仑西平
- C、西咪替丁
- D、丙谷胺
- E、硫糖铝

标准答案：E

31. 糖皮质激素治疗系统性红斑狼疮的主要机制是

- A、抗休克，改善循环
- B、抑制过敏反应
- C、控制炎症，抑制免疫反应

- D、降低内毒素反应
- E、抑菌，避免继发感染

标准答案：C

32. 以下哪种药物抑制胃酸分泌最强(2012年)

- A、奥美拉唑
- B、法莫替丁
- C、氢氧化铝
- D、枸橼酸铋钾
- E、硫糖铝

标准答案：A

33. 某女士，28岁，因患系统性红斑狼疮两次住院。本次住院面部红斑明显，有少许鳞屑，尿常规阴性，肾功能正常，血抗核抗体阳性，抗双链-DNA抗体阳性。治疗本病的主要药物是

- A、糖皮质激素
- B、乙酸水杨酸
- C、布洛芬
- D、免疫抑制剂
- E、苯妥英钠

标准答案：A

34. 伴有高血压和哮喘的心绞痛患者，宜选用

- A、硝酸甘油
- B、麻黄碱

- C、普蔡洛尔
- D、硝苯地平
- E、硝酸异山梨酯

标准答案：D

35. 下列药物中保钾利尿剂为

- A、双氢克尿噻
- B、环戊甲噻嗪
- C、螺内酯、氨苯蝶啶
- D、呋塞米
- E、利尿酸

标准答案：C

36. 炎症后期使用糖皮质激素的目的是

- A、稳定溶酶体膜
- B、降低毛细血管通透性
- C、促进炎症消散
- D、降低毒素对机体的损害
- E、抑制肉芽组织生长，防止粘连和瘢痕形成

标准答案：E

37. 叶酸用于治疗何种贫血

- A、溶血性贫血
- B、缺铁性贫血
- C、妊娠期巨幼红细胞性贫血

D、乙胺嘧啶所致的巨幼红细胞性贫血

E、再生障碍性贫血

标准答案：C

38. 口服液体铁剂的正确方法是

A、饭前服

B、饭前测心率

C、吸管吸入

D、茶水送服

E、服后不宜立即饮水

标准答案：C

39. 患者，男，70岁，高血压15年。昨天受凉后出现剧烈头痛，头晕，呕吐。查：血压200/130mmHg。遵医嘱给予硝普钠降压。用药护理正确的是(2012年执业护考真题)

A、提前配制

B、肌肉注射

C、静脉推注

D、快速滴注

E、避光滴注

标准答案：E

40. 低效利尿药的作用部位是

A、髓袢升支粗段皮质部

B、髓袢升支粗段髓质部

- C、髓攀降支粗段皮质部
- D、髓祥降支粗段髓质部
- E、远曲小管和集合管

标准答案: E

41. 氯沙坦属于

- A、利尿药
- B、钙拮抗药
- C、血管扩张药
- D、血管紧张素I 转化酶抑制药
- E、血管紧张素I 受体阻断药

标准答案: E

42. 急性脑水肿首选

- A、螺内酯
- B、甘露醇
- C、呋塞米
- D、氢氯噻嗪
- E、高渗葡萄糖

标准答案: B

43. 关于哌仑西平，以下叙述正确的是(

- A、阻 断H受体，抑制胃酸分泌
- B、阻 断H₂受体，抑制胃酸分泌
- C、断 G受体，减少胃酸分泌

- D、阻 断M受体，抑制胃酸分泌
- E、促进胃黏液分泌，保护胃黏膜

标准答案：D

44. 下列哪种药不宜与氨基糖苷类抗生素合用

- A、氢氯噻嗪
- B、氨苯蝶啶
- C、螺内酯
- D、阿米洛利
- E、呋塞米

标准答案：E

45. 治疗以胆固醇升高为主的高脂血症的药物是

- A、非诺贝特
- B、吉非贝齐
- C、烟酸
- D、考来烯胺
- E、阿托伐他汀

标准答案：E

46. 患者，男，55岁。因心力衰竭使用洋地黄进行治疗。治疗期间的下列医嘱中，护士的健康教育不正确的是(2012年)

- A、氯化钾溶液静脉滴注
- B、生理盐水静脉滴注
- C、5%葡萄糖溶液静脉滴注

D、葡萄糖酸钙溶液静脉滴注

E、乳酸钠溶液静脉滴注

标准答案: D

47. 麦角新碱临床上主要用于

A、催产

B、低血压

C、偏头痛

D、产后出血

E、引产

标准答案: D

48. 临床上选用抗菌药的依据是

A、抗菌活性

B、抗菌谱

C、最低抑菌浓度

D、最低杀菌浓度

E、抗生素后效应

标准答案: B

49. 强心苷增强心肌收缩力的作用机制是

A、激活心肌细胞上的 $\text{Na}^+-\text{K}^+-\text{ATP}$ 酶, 提高细胞内 Ca^{2+} 浓度

B、抑制心肌细胞膜上的 $\text{Na}^+-\text{K}^+-\text{ATP}$ 酶, 提高细胞内 Ca^{2+} 浓度

C、激动心肌的 β 受体, 增强心肌收缩力

D、提高交感神经活性

E、阻止细胞外Ca²⁺内流

标准答案： B

50. 消化性溃疡使用抗菌药的主要目的是(

A、抑制胃酸分泌

B、杀幽门螺杆菌(HP)

C、清除肠道寄生菌

D、减轻溃疡病的症状

E、保护胃黏膜

标准答案： B

51. 以下哪个药物可用于抗早孕

A、催产素

B、麦角新碱

C、前列腺素

D、麦角胺

E、麦角毒

标准答案： C

52. 治疗肾病综合征主要是利用糖皮质激素的

A、抗毒作用

B、免疫抑制作用

C、抗过敏作用

D、抗炎作用

E、抗休克作用

标准答案: B

53. 糖皮质激素治疗系统性红斑狼疮的主要机制是

- A、抗休克，改善循环
- B、抑制过敏反应
- C、控制炎症，抑制免疫反应
- D、降低内毒素反应
- E、抑菌，避免继发感染

标准答案: C

54. 肺咯血及门脉高压引起的上消化道出血宜选用

- A、维生素K
- B、氨甲苯酸
- C、酚磺乙胺
- D、垂体后叶素
- E、肝素

标准答案: D

55. 既能杀灭幽门螺杆菌，又能在溃疡表面形成保护膜的药物是()

- A、枸橼酸铋钾
- B、奥美拉唑
- C、雷尼替丁
- D、庆大霉素
- E、色甘酸钠

标准答案: A

56. 关于糖皮质激素的应用，下列哪项是错误的

- A、水痘和带状疱疹
- B、风湿和类风湿性关节炎
- C、血小板减少症和再生障碍性贫血
- D、过敏性休克和心源性休克
- E、中毒性肺炎、重症伤寒和急性粟粒性肺结核

标准答案：A

57. 糖皮质激素禁用于

- A、急性淋巴细胞性白血病
- B、全身性红斑狼疮
- C、活动性消化性溃疡
- D、支气管哮喘
- E、感染中毒性休克

标准答案：C

58. 麦角胺常与以下哪个药物合用治疗偏头痛

- A、阿司匹林
- B、咖啡因
- C、吗啡
- D、哌替啶
- E、扑热息痛

标准答案：B

59. 能明显缓解甲状腺功能亢进患者交感神经兴奋症状，并能抑制T4

变为T3,但不引起粒细胞缺乏的药物是

- A、普萘洛尔
- B、甲硫氧嘧啶
- C、丙硫氧嘧啶
- D、甲巯咪唑
- E、卡比马唑

标准答案: A

60. 患者，男，70岁，高血压15年。昨天受凉后出现剧烈头痛，头晕，呕吐。查：血压200/130mmHg。遵医嘱给予硝普钠降压。用药护理正确的是(2012年执业护考真题)

- A、提前配制
- B、肌内注射
- C、静脉推注
- D、快速滴注
- E、避光滴注

标准答案: E

61. 心绞痛急性发作时，为迅速缓解症状，应立即

- A、皮下注射阿托品
- B、肌内注射哌替啶
- C、口服阿司匹林
- D、口服硝酸甘油
- E、舌下含服硝酸甘油

标准答案： E

62. 高血压伴消化性溃疡的患者宜用

- A、可乐定
- B、利血平
- C、卡托普利
- D、哌唑嗪
- E、硝苯地平

标准答案： A

63. 肿瘤化疗引起的呕吐选用 ()

- A、东莨菪碱
- B、西沙比利
- C、昂丹司琼
- D、多潘立酮
- E、比沙可啶

标准答案： C

64. 强心苷中毒，最严重的不良反应是

- A、胃肠道反应
- B、心律失常
- C、头痛
- D、失眠
- E、黄视症、绿视症

标准答案： B

65. 下列哪种药物通过拮抗醛固酮而产生利尿作用

- A、呋塞米
- B、阿米洛利
- C、氨苯蝶啶
- D、螺内酯
- E、氢氯噻嗪

标准答案：D

66. 麦角胺常与以下哪个药物合用治疗偏头痛

- A、阿司匹林
- B、咖啡因
- C、吗啡
- D、哌替啶
- E、扑热息痛

标准答案：B

67. 患者，男，50岁。因钝器击伤头部1h入院。患者昏迷、呕吐、双侧瞳孔不等大。血压180/102mmHg.行硬膜下血肿清除术+碎骨片清除术，留置引流管送回病房，医嘱：250mL甘露醇快速滴入，滴完的时间是

- A、5min内
- B、30min内
- C、60min内
- D、90min内

E、90min以上

标准答案： B

68. 糖皮质激素诱发和加重感染的主要原因是

A、使用激素时未应用有效抗菌药物

B、激素抑制免疫反应

C、激素用量过大

D、激素用量不足

E、激素能促进病原微生物繁殖

标准答案： B

69. 治疗黏液性水肿可选用

A、碘制剂

B、甲状腺素

C、他巴唑

D、甲亢平

E、丙硫氧嘧啶

标准答案： B

70. 临床治疗心肌梗死、脑血栓等疾病应选用

A、叶酸

B、尿激酶

C、铁剂

D、酚磺乙胺

E、维生素K

标准答案：B

71. 抗生素发挥抗菌作用后，血药浓度低于最低抑菌浓度或被消除后，细菌生长仍然受到抑制的效应，称为

- A、后遗效应
- B、变态反应
- C、继发反应
- D、特异质反应
- E、抗生素后效应

标准答案：E

72. 患者。女40岁，近1月来自觉疲乏、无力、头晕，医嘱硫酸亚铁溶液口服，为减少不良反应，正确的给药方法是

- A、饭前服用
- B、直接喝
- C、茶水送服
- D、牛奶送服
- E、服药后及时漱口

标准答案：E

73. 糖皮质激素对血液系统的影响是使循环血中

- A、血小板的数量减少
- B、中性粒细胞的数量减少
- C、红细胞的数量减少
- D、血红蛋白的含量减少

E、淋巴细胞的数量减少

标准答案：E

74. 青少年甲状腺功能亢进患者，内科常规治疗的药物为

A、碘化钾

B、普萘洛尔

C、甲状腺素

D、 ^{131}I

E、丙硫氧嘧啶

标准答案：E

75. 硫酸亚铁用于治疗

A、恶性贫血

B、产后大出血

C、巨幼红细胞性贫血

D、再生障碍性贫血

E、小细胞低色素性贫血

标准答案：E

76. 长期应用糖皮质激素，突然停药引起肾上腺危象是因为

A、ACTH分泌突然增多

B、病情尚未完全控制

C、原病复发或恶化

D、肾上腺皮质功能不全

E、肾上腺激素大量释放

标准答案：D

77. 利尿剂降低血压的主要作用机制是(2012年执业护考真题)

- A、减少血容量
- B、阻断 β 受体
- C、阻断 α 受体
- D、阻滞钙通道
- E、扩张小动脉

标准答案：A

78. 某慢性呼吸衰竭痰多的患者，在使用哪种药后可能因为痰液粘稠度增加而使排痰困难加重

- A、波尼松
- B、沙丁胺醇
- C、呋塞米
- D、氨茶碱
- E、烟酸氨溴索

标准答案：C

79. 关于糖皮质激素的应用，下列哪项是错误的

- A、水痘和带状疱疹
- B、风湿和类风湿性关节炎
- C、血小板减少症和再生障碍性贫血
- D、过敏性休克和心源性休克
- E、中毒性肺炎、重症伤寒和急性粟粒性肺结核

标准答案：A

80. 患者，男，50岁。因钝器击伤头部1h入院。患者昏迷、呕吐、双侧瞳孔不等大。血压180/102mmHg.行硬膜下血肿清除术+碎骨片清除术，留置引流管送回病房，医嘱：250mL甘露醇快速滴入，滴完的时间是

- A、5min内
- B、30min 内
- C、60min内
- D、90min内
- E、90min以上

标准答案：B

81. 下列哪项不是强心苷的毒性反应

- A、胃肠道反应
- B、心律失常
- C、中枢神经系统症状
- D、粒细胞减少
- E、黄视症、绿视症

标准答案：D

82. 临床治疗心肌梗死、脑血栓等疾病应选用

- A、叶酸
- B、尿激酶
- C、铁剂

D、酚磺乙胺

E、维生素K

标准答案: B

83. 激素长期应用，下列哪种给药方法对肾上腺皮质功能影响最小

A、大剂量突击疗法

B、每晚一次给药法

C、一般剂量长程疗法

D、隔日疗法

E、小剂量替代疗法

标准答案: D

84. 具有抗利尿作用、可用于治疗尿崩症的药物是

A、呋塞米

B、氢氯噻嗪

C、氢氟噻嗪

D、螺内酯

E、氨苯蝶啶

标准答案: B

85. 患者，男，55岁。因心力衰竭使用洋地黄进行治疗。治疗期间的下列医嘱中，护士的健康教育不正确的是(2012年)

A、氯化钾溶液静脉滴注

B、生理盐水静脉滴注

C、5%葡萄糖溶液静脉滴注

D、葡萄糖酸钙溶液静脉滴注

E、乳酸钠溶液静脉滴注

标准答案: D

86. 哪种药物能防止和逆转慢性心功能不全的心室肥厚并降低病死率

A、地高辛

B、米力农

C、氢氯噻嗪

D、卡托普利

E、硝普钠

标准答案: D

87. 下列哪项不是强心苷的毒性反应

A、胃肠道反应

B、心律失常

C、中枢神经系统症状

D、粒细胞减少

E、黄视症、绿视症

标准答案: D

88. 高血压合并支气管哮喘者，应避免使用

A、普萘洛尔

B、卡托普利

C、甲基多巴

D、可乐定

E、硝苯地平

标准答案：A

89. 关于硝普钠的主要药理作用，正确的叙述是(2016年执业护考真题)

A、利尿

B、减慢心率

C、心输出量增加

D、增强心肌收缩力

E、扩张动、静脉，减轻心脏负荷

标准答案：E

90. 以下何种药为基础降压药

A、普萘洛尔

B、氢氯噻嗪

C、托洛尔

D、利血平

E、卡托普利

标准答案：B

91. 某些微生物产生的能抑制或杀灭其他微生物的物质称为

A、抗菌药

B、抗真菌药

C、抗病毒药

D、抗生素

E、抗微生物药

标准答案: D

92. 女性，45岁，自述全身乏力、心慌，每日大便3-4次，某医院诊断为甲状腺功能亢进，经治疗后病情好转自行停药，半年后心率加快，上述症状又复出现。请问抗甲状腺药物治疗甲状腺功能亢进总疗程通常是

A、1-2个月

B、3-4周

C、5-6个月

D、1-2年

E、3-4年

标准答案: D

93. 关于丙硫氧嘧啶的叙述，错误的是

A、抑制过氧化物酶，抑制甲状腺激素合成

B、需用药2-3周后才能充分显效

C、合用大剂量的碘能增效

D、可用于重症甲亢的治疗

E、可用于治疗甲状腺危象

标准答案: C

94. 女性，45岁，自述全身乏力、心慌，每日大便3-4次，某医院诊断为甲状腺功能亢进，经治疗后病情好转自行停药，半年后心率加快，上述症状又复出现。请问抗甲状腺药物治疗甲状腺功能亢进总疗程通

常是

A、1-2个月

B、3-4周

C、5-6个月

D、1-2年

E、3-4年

标准答案：D

95. 能明显缓解甲状腺功能亢进患者交感神经兴奋症状，并能抑制T₄变为T₃,但不引起粒细胞缺乏的药物是

A、普萘洛尔

B、甲硫氧嘧啶

C、丙硫氧嘧啶

D、甲巯咪唑

E、卡比马唑

标准答案：A

96. 抗癌药甲氨蝶呤引起的巨幼红细胞性贫血应用以下哪个药物

A、硫酸亚铁

B、叶酸

C、亚叶酸钙

D、维生素B₁₂

E、四环素

标准答案：C

97. 不属于硝酸甘油不良反应的是

- A、心率加快
- B、头痛
- C、支气管哮喘
- D、直立性低血压
- E、高铁血红蛋白血症

标准答案： C

98. 维生素K的作用是

- A、促进血小板释放活性物质
- B、降低毛细血管通透性
- C、参与凝血因子Ⅱ、Ⅵ、Ⅸ、X的合成
- D、减低全血粘滞度
- E、促进纤维蛋白溶解系统活性

标准答案： C

99. 抢救链霉素过敏性休克的首选药是

- A、苯海拉明
- B、氯苯那敏
- C、去甲肾上腺素
- D、异丙肾上腺素
- E、氯化钙+肾上腺素

标准答案： E

100. 地高辛引起的窦性心动过缓、房室传导阻滞用

- A、苯妥英钠
- B、异丙肾上腺素
- C、阿托品
- D、肾上腺素
- E、氯化钾

标准答案：C

101. 某冠心病患者将其每日服用的氨氯地平、阿司匹林、辛伐他汀、硝酸甘油、普萘洛尔开置于透明的塑料分药盒中，责任护士发现后立即告知患者有一种药物不宜放入此药盒中，这种药物是(2014执业护考真题)

- A、氨氯地平
- B、阿司匹林
- C、辛伐他汀
- D、硝酸甘油
- E、普萘洛尔

标准答案：D

102. 苯海拉明不具备的药理作用是

- A、镇 静
- B、抗过敏
- C、催眠
- D、减少胃酸分泌
- E、防晕止吐

标准答案：C

103. 硫酸镁急性中毒应选用下列何种药物抢救(的)

- A、肾上腺素
- B、异丙肾上腺素
- C、去甲肾上腺素
- D、氯化钙
- E、氧化钾

标准答案：D

104. 口服液体铁剂的正确方法是

- A、饭前服
- B、饭前测心率
- C、吸管吸入
- D、茶水送服
- E、服后不宜立即饮水

标准答案：C

105. 高血压伴痛风的患者不宜用

- A、可乐定
- B、肼苯哒嗪
- C、氯沙坦
- D、氢氯噻嗪
- E、硝苯地平

标准答案：D

106. 甲状腺功能亢进患者术前准备，正确的给药方法为

- A、仅给硫脲类
- B、仅给碘化钾
- C、先给硫脲类，术前2周再给小剂量碘化钾
- D、先给硫脲类，术前2周再给大剂量碘化钾
- E、先给碘化钾，术前2周再给硫脲类

标准答案：D

107. 强心苷增强心肌收缩力的作用机制是

- A、激活心肌细胞上的 $\text{Na}^+-\text{K}^+-\text{ATP}$ 酶，提高细胞内 Ca^{2+} 浓度
- B、抑制心肌细胞膜上的 $\text{Na}^+-\text{K}^+-\text{ATP}$ 酶，提高细胞内 Ca^{2+} 浓度
- C、激动心肌的 β 受体，增强心肌收缩力
- D、提高交感神经活性
- E、阻止细胞外 Ca^{2+} 内流

标准答案：B

108. 中枢镇静作用最强的H₁受体阻断药是

- A、苯海拉明
- B、氯雷他定
- C、西替利嗪
- D、赛庚啶
- E、氯苯那敏

标准答案：A

109. 1岁患儿，母乳喂养，未加辅食。约2月前发现患儿活动少，不

哭、不笑，面色苍黄，表情呆滞，手及下肢颤抖。检查发现肝脾肿大，血细胞 $1 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白 $6.5g/L$ ，血清铁、叶酸正常，血清维生素B12降低，对该患儿的正确处理是

- A、口服铁剂治疗
- B、添加山楂、鸡内金
- C、避免用维生素C治疗
- D、用维生素B12治疗
- E、避免服用维生素B12和叶酸治疗

标准答案：D

110. 治疗黏液性水肿可选用

- A、碘制剂
- B、甲状腺素
- C、他巴唑
- D、甲亢平
- E、丙硫氧嘧啶

标准答案：B

111. 护士为甲亢患者进行服用甲硫氧嘧啶的用药指导。用药后1-2个月需要观察的主要作用是

- A、静脉炎
- B、粒细胞减少
- C、肾功能损伤
- D、胃肠道不适

E、听神经损伤

标准答案：B

112. 预防心绞痛发作，选用下列哪种药物

A、普萘洛尔

B、硝酸甘油

C、硝苯地平

D、维拉帕米

E、地尔硫卓

标准答案：E

113. 肝素过量引起的出血，应选择拮抗药物是

A、鱼精蛋白

B、维生素A

C、氨甲苯酸

D、华法林

E、枸橼酸钠

标准答案：A

114. 甲状腺功能亢进患者术前准备，正确的给药方法为

A、仅给硫脲类

B、仅给碘化钾

C、先给硫脲类，术前2周再给小剂量碘化钾

D、先给硫脲类，术前2周再给大剂量碘化钾

E、先给碘化钾，术前2周再给硫脲类

标准答案：D

115. 9月龄患儿，单纯牛乳喂养，未添加辅食，因抽搐2次入院，血清钙离子 0.8mmol/L 。诊断为维生素D缺乏性手足抽搐症。对该患儿护理措施不正确的是

- A、惊厥时及时清除口鼻分泌物
- B、遵医嘱用镇静剂和钙剂
- C、补充钙剂时应快速静脉推注
- D、惊厥发作时保护患儿的安全
- E、保持安静，减少刺激

标准答案：C

116. 噻嗪类利尿药的作用部位是

- A、髓袢升支粗段皮质部
- B、髓袢降支粗段皮质部
- C、髓袢升支粗段髓质部
- D、髓袢降支粗段髓质部
- E、远曲小管和集合管

标准答案：A

117. 急性脑水肿首选

- A、螺内酯
- B、甘露醇
- C、呋塞米
- D、氢氯噻嗪

E、高渗葡萄糖

标准答案：B

118. 糖皮质激素诱发和加重感染的主要原因是

A、使用激素时未应用有效抗菌药物

B、激素抑制免疫反应

C、激素用量过大

D、激素用量不足

E、激素能促进病原微生物繁殖

标准答案：B

119. 某新生儿诊断为低钙血症。医嘱：静脉注射10%葡萄糖酸钙。护士要注意观察的是

A、防止心动过缓，保持心率 $\geq$ 80次/分

B、防止心动过缓，保持心率 $\geq$ 90次/分

C、防止心动过缓，保持心率 $\geq$ 100次/分

D、防止心动过速，保持心率 $<$ 80次/分

E、防止心动过速，保持心率 $<$ 100次/分

标准答案：A

120. 一代H1受体阻断药最常见的不良反应是

A、变态反应

B、烦躁、失眠

C、致畸

D、消化道反应

E、镇静、嗜睡

标准答案：E

121. 炎症后期使用糖皮质激素的目的是

A、稳定溶酶体膜

B、降低毛细血管通透性

C、促进炎症消散

D、降低毒素对机体的损害

E、抑制肉芽组织生长，防止粘连和瘢痕形成

标准答案：E

122. 氯苯那敏抗过敏的作用机制是

A、抑制组胺释放

B、抑制组胺合成

C、加速组胺的代谢

D、阻断H1受体，抑制组胺与H1受体结合

E、稳定肥大细胞膜，抑制组胺的释放

标准答案：C

123. 具有体内外抗凝作用的药物是

A、肝素

B、阿司匹林

C、香豆素类

D、链激酶

E、右旋糖酐

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/325244202032011242>