广东省 2024 年《执业药师之西药学综合知识与技能》考试内部题库及参考答案 AB 卷

第 I 部分 单选题（100 题）

1.药物信息按照其最初来源通常分为三级，即以期刊发表的原创性论著为主的一级信息源、引文和摘要服务为主的二级信息源以及参考书和数据库为主的三级信息源。

A：提供的信息丰富、详实

B：能看到研究细节如试验设计、数据处理等

C：内容全面、细致

D：内容广泛、使用方便

答案：D

2.适用于伴发膀胱过度活动症的良性前列腺增生症的是（）

A：米多君

B：奥昔布宁

C：特拉唑嗪

D：非那雄胺

答案：B

3.妊娠期间，药物致畸的高敏感期是

A：妊娠 3 天

B：妊娠 18 天

C：受精后 3 周～3 个月

D：受精后 3 周以内

答案：C

4.治疗急迫性尿失禁的首选药物是

A: 选择性 α1 激动剂

B: 5α 还原酶抑制剂

C: α1 阻断剂

D: 抗胆碱药物

答案：D

5.患者，男，72 岁，患有阿尔茨海默病，给予卡巴拉汀每日 3mg 治疗。药师对该患者的用药指导，正确的是（）

A: 每日清晨空腹口服

B: 每晚睡前口服

C: 每日早晚与食物同服

D: 每日早晚空腹口服

答案：C

6.患者,女,56 岁,身高 156m,体重 61kg。空腹血糖 78mmo/L,餐后血糖 11.2mmol/,糖化血红蛋白 6.7%。

A: 口服二甲双胍

B: 饮食及运动治疗

C: 口服磺酰脲类降糖药

D: 口服 α-糖苷酶抑制剂

答案：A

7.下列药物中，具有肝药酶诱导作用的是

A: 利福平

B: 克林霉素

C: 咪康唑

D: 异烟肼

答案：A

8.下列药学服务的对象中，不属于药学服务的特殊人群是

A: 特殊体质者

B: 住院患者

C: 血液透析者

D: 小儿、老人

答案：B

9.属于时间依赖性抗菌药，且抗菌作用持续时间长，评估此类药物的PK/PD参数主要为AUC0～24/MIC，一般推荐日剂量分2次给药方案的药物是

A: 利奈唑胺

B: 氨茶碱

C: 左氧氟沙星

D: 头孢克洛

答案：A

10.提供的药物信息和建议是否均来自受过专门药学培训的人员

A: 新颖性

B: 归因性

C: 合理性

D: 权威性

答案：D

11.患者因股癣前来药店购药，不宜推荐的药物是()

A: 酮康唑软膏

B: 联苯苄唑软膏

C: 氢化可的松软膏

D: 复方苯甲酸软膏

答案：C

12.粪外观所对应的疾病,霍乱

A: 暗红果酱色

B: 米泔水样

C: 柏油便，黑色有光泽

D: 白陶土便

答案：B

13.饮酒可导致患者对该药的耐受性降低的药物是

A: 维生素B

B: 苯妥英钠

C: 利血平

D: 卡马西平

答案：D

14.以下药物中，用于治疗细菌感染性腹泻应首选的是

A: 黄连素

B: 维生素

C: 抗生素

D: 谷维素

答案：A

15.博来霉素

A: 心脏毒性

B: 溶血性尿毒症

C: 出血性膀胱炎

D: 肺纤维化

答案：D

16.患者，男，60岁，有糖尿病家族史。出现口干，多饮，多尿，体重下降6个月，BMI值29.0。空腹血糖10.2mmol/L，餐后2小时血糖16.7mmol/L，血压115/80mmHg。

A: α-葡萄糖苷酶抑制剂

B: 双胍类降糖药

C: 磺酰脲类降糖药

D: 胰岛素

答案：B

17.常用于碱化尿液，促进毒性药物排泄的是

A: 麻黄碱

B: 苯巴比妥

C: 碳酸氢钠

D: 磺胺醋酰

答案：C

18.患胸膜炎伴胸痛的咳嗽患者宜选用的药物是

A: 喷托维林

B: 羧甲司坦

C: 可待因

D: 右美沙芬

答案：C

19.痉挛性便秘可选

A：比沙可啶

B：乳果糖

C：硫酸镁

D：聚乙二醇粉

答案：D

20.处方中"餐后给药"的外文缩写是

A：pc

B：po

C：ac

D：qn

答案：A

21.患活动性消化性溃疡，禁用的调脂药是

A：依折麦布

B：辛伐他汀

C：氯贝丁酯

D：烟酸类

答案：D

22.睡前服用，可使抑制肝脏合成胆固醇效果更好的药品是

A：二甲双胍片

B：甲氧氯普胺片

C：瑞舒伐他汀片

D：复方铝酸铋片

答案：C

23.对于暴发性疼痛频繁、存在吞咽困难或胃肠道功能障碍、临终患者的镇痛，可以采用患者自控镇痛泵技术输入

A: 加巴喷丁

B: 布洛芬混悬液

C: 芬太尼注射剂

D: 丁溴东莨菪碱片

答案：C

24.患者，男，80岁，患有高血压、2型糖尿病、前列腺增生，近日出现暂时性尿失禁症状，怀疑与其服用的药物有关。复核其使用的药物，可能造成其尿失禁的药物是()

A: 非那雄胺

B: 二甲双胍

C: 珍菊降压片(含氢氯噻嗪)

D: 依那普利

答案：C

25.粪外观所对应的疾病,阿米巴痢疾

A: 白陶土便

B: 米泔水样

C: 暗红果酱色

D: 柏油便，黑色有光泽

答案：C

26.（2016年真题）患者，男，50岁，诊断为高血压、冠心病。

A: 阿司匹林肠溶片

B: 氨氯地平片

C: 美托洛尔缓释片

D：贝那普利片

答案：D

27.一般高血压患者服用降压药，建议控制在

A：<120／80mmHg

B：<130／80mmHg

C：<140／80mmHg

D：<140／90mmHg

答案：D

28.可提示隐性黄疸或亚临床性黄疸的是

A：>342μmol/L

B：34.2μmol/L～171μmol/L

C：17.1μmol/L～171μmol/L

D：17.1μmol/L～34.2μmol/L

答案：D

29.可提示完全梗阻性黄疸的是

A：17.1μmol/L～34.2μmol/L

B：>342μmol/L

C：17.1μmol/L～171μmol/L

D：34.2μmol/L～171μmol/L

答案：B

30.下述“关于肺结核的治疗原则”中，不正确的是

A：整个治疗方案分为3个阶段

B：整个治疗方案分为强化期和巩固期两个阶段

C：防止耐药菌产生

D: 减少结核菌的传播

答案：A

31.不能用热水送服的药物是

A: 镇静催眠药

B: 微生态制剂

C: 磺胺类药物

D: 胃黏膜保护剂

答案：B

32.患者，男，26岁，自述头痛、咽喉痛、全身乏力、畏寒，偶尔咳嗽，并有鼻塞、流鼻涕、打喷嚏等症状。经检查后，测量口腔体温37.8℃，脉搏72次/分，白细胞计数3.7×109/L。医生为患者开具的处方如下：

A: 右美沙芬

B: 对乙酰氨基酚

C: 氯苯那敏

D: 伪麻黄碱

答案：B

33.操作失误酿成用药错误的事例是

A: 静脉用药的浓度计算错误

B: 工作环境嘈杂

C: 药品位置凌乱

D: 患者自行中断用药

答案：A

34.对有过敏倾向和特异质以及有ADR家族史的患者，最重要的是

A: 了解患者及家族的过敏史

B: 注意特殊人群用药

C: 注意ADR症状，尤其是迟发反应

D: 注意定期监测器官功能

答案：A

35.经检查，某患者A/G（白蛋白/球蛋白）＜1，提示患者可能患有

A: 慢性肝炎

B: 胰腺炎

C: 胆囊劑

D: 胃肠炎

答案：A

36.氨基糖苷类药物引起的典型药源性疾病是

A: 胃肠道疾病

B: 血液系统疾病

C: 神经系统疾病

D: 肌病

答案：C

37.能刺激骨骼、肌肉和组织生长发育的是

A: 蛋白同化激素

B: 利尿剂

C: 麻醉药品

D: 肽类激素

答案：D

38.患者男性，35岁，髋关节置换术后7天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

A：病理性骨折

B：下肢动脉栓塞

C：下肢深静脉血栓形成

D：肺动脉栓塞

答案：C

39.消化不良很常见，半数以上人群在生命过程中曾因此病症而就诊，其主要症状有上腹饱胀、食欲缺乏等表现。

A：复方阿嗪米特肠溶片

B：胰酶片

C：维生素B1

D：莫沙必利

答案：C

40.能降LDL也降HDL的药物是

A：非诺贝特

B：塞伐他汀

C：普罗布考

D：烟酸

答案：C

41.药物治疗的效果不以货币为单位表示，而是用其他量化的方法表达治疗目的的药物经济学评价方法是

A：最大成本法

B：成本-效果分析

C：最小成本法

D: 成本-效益分析

答案：B

42.处方中外文缩写OS代表()

A: 左耳

B: 双眼

C: 右耳

D: 左眼

答案：D

43.除胰岛素分泌过多外，主要引起血糖低于正常参考区间低限的疾患是

A: 颅内压增高、颅脑外伤

B: 激素分泌功能亢进

C: 肝功能亢进

D: 激素分泌功能衰退

答案：D

44.杨某，女，19岁，淋雨受凉后咳嗽、咯脓性痰并伴有胸痛，体温39℃，听诊肺部有湿啰音。WBC12×109／L。该患者对青霉素过敏。

A: 肺结核

B: 支气管炎

C: 哮喘

D: 社区获得性肺炎

答案：D

45.（2021年真题）患者，女，65岁，因乳腺癌接受第二周期化疗。禁用的止吐药物是（）

A：苯海拉明

B：地塞米松

C：昂丹司琼

D：甲氧氯普胺

答案：D

46.肺炎用药注意事项不符的是

A：体温正常 48～72h，无肺炎任何一项临床不稳定征象可停用抗菌药物。

B：肺炎的药物治疗应避免使用抗生素，其他药物无效时再考虑使用抗生素。

C：观察疗效抗菌药物治疗后 48～72h 应对病情进行评价。

D：肺炎的抗菌药物治疗应尽早进行，一旦怀疑为肺炎即马上给予首剂抗菌药物。

答案：B

47.Ⅳ期临床试验样本数为

A：100～300 例

B：常见病≥1000 例

C：20～30 例

D：常见病≥2000 例

答案：D

48.（2016 年真题）患者，男，32 岁，因细菌性扁桃体炎口服阿莫西林胶囊，出现全身瘙痒。立即停药，无特殊治疗，患者症状逐渐好转，未再给阿莫西林胶囊治疗，该 ADR 的因果关系评价结果是（）。

A：可能

B：很可能

C: 肯定

D: 可能无关

答案：B

49.患儿，男，6个月，体重9.0kg，平素健康，近日出现多汗、夜哭、易惊。体检：前囟平软，颅骨有乒乓球感，枕秃，肋骨串珠。人工喂养，尚未添加任何辅食，平素较少出门。

A: 维生素C

B: 维生素B12

C: 维生素D3

D: 维生素A

答案：C

50.一般情况下，为治疗感冒连续服用抗感冒药的时间不应该超过

A: 7日

B: 5日

C: 9日

D: 3日

答案：A

51.治疗胃食管反流病，莫沙必利的正确服药时间是

A: 症状发作时、餐后1.5h和睡前

B: 早餐前30min

C: 餐后、睡前

D: 三餐前30min

答案：D

52.有助于提高医、护、药专业人员对ADR的警惕性和识别能力

A: 为临床药物评价提供依据

B: 促进临床合理用药

C: 促进新药的研制开发

D: 减少 ADR 的危害

答案：B

53.某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第一跖趾关节剧痛．3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 500μmol／L；足部 X 线示非特征性软组织肿胀。

A: 风湿性关节炎

B: 痛风

C: 类风湿关节炎

D: 假性痛风

答案：B

54.摄入过多可增加体内血容量，促发充血性心力衰竭或高血压的是

A: 脂肪

B: 食醋

C: 食盐

D: 酒

答案：C

55.属于抗酸药的是

A: 三硅酸镁

B: 奥美拉唑

C: 替普瑞酮

D: 哌仑西平

答案：A

56.钙制剂+维生素D+雌激素（雌激素受体调节剂）

A：原发性骨质疏松

B：抗癫痫药所致的骨质疏松

C：妇女绝经后骨质疏松

D：老年性骨质疏松

答案：C

57.(消化性溃疡并发症)，幽门梗阻

A：突发上腹剧痛，继而至全腹

B：餐后加重的上腹胀痛，呕吐物有隔夜食物

C：疼痛性质改变，明显消瘦、贫血

D：规律性上腹痛

答案：B

58.缺铁性贫血、肾性贫血可呈现

A：红细胞计数减少

B：淋巴细胞增多

C：白细胞增多

D：血小板减少

答案：A

59.（2018年真题）患者，女，42岁，因成骨肉瘤使用环磷酰胺甲氨蝶呤联合化疗，用药过程中，者出现出血性膀胱炎。适宜的处理措施是（）

A：停药，水化，给予美司钠治疗

B：给予糖皮质激素冲击治疗

C：停药，给予糖皮质激素

D: 停药，给予亚叶酸钙治疗

答案：A

60.（2016 年真题）患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo，瑞格列奈片 1mgtidpo，阿托伐他汀钙片 20mgqdpo 等药物治疗。

A: 开启使用中的低精蛋白锌胰岛素必须放入冷藏保存

B: 每次调整 1-4 单位

C: 根据血糖水平调整低精蛋白锌胰岛素用量

D: 每 3-5 天调整 1 次

答案：A

61.作为女性便秘型肠易激综合征者缓解症状的短期治疗药物是

A: 洛哌丁胺

B: 乳果糖

C: 替加色罗

D: 聚乙二醇粉

答案：C

62.引起"苯妥英钠半衰期为 30～40h，羟化酶缺乏者一半剂量即出现神经毒性"是

A: 性别

B: 遗传因素

C: 年龄

D: 基础疾病

答案：B

63.服用左旋多巴不宜同食

A：食醋

B：高蛋白食物

C：咖啡

D：葡萄柚汁

答案：B

64.口服避孕药可能导致

A：血白细胞减少

B：血清血红蛋白升高

C：粪便细胞显微镜检查检出真菌

D：血清总胆固醇升高

答案：D

65.解热镇痛药用于退热，两次用药的间隔时间应该是

A：3～5小时

B：4～6小时

C：5～7小时

D：2～4小时

答案：B

66.应在睡前服用，疗效较好的是

A：噻氯匹定

B：维生素B1

C：硫酸镁

D：沙丁醇胺

答案：D

67.(用药导致的血常规异常)抗真菌药

A：血小板减少

B：中性粒细胞减少

C：血红蛋白量增多

D：嗜酸性粒细胞减少

答案：B

68.下列药品中，属于药品类易制毒化学品的兴奋剂是

A：螺内酯

B：可待因

C：芬太尼

D：麻黄碱

答案：D

69.（2019年真题）患儿，男，2岁，误服水银后，应选用的洗胃液是

A：鸡蛋清

B：淀粉溶液

C：牛奶与水等量混合

D：1:5000高锰酸钾溶液

答案：A

70.患者，男，26岁，自述头痛、咽喉痛、全身乏力、畏寒，偶尔咳嗽，并有鼻塞、流鼻涕、打喷嚏等症状。经检查后，测量口腔体温37.8℃，脉搏72次/分，白细胞计数3.7×109/L。医生为患者开具的处方如下：

A：5日

B：4日

C：2日

D：3日

答案：B

71.有机磷农药重度中毒时，血胆碱酯酶的活力下降至

A：50%～30%

B：70%～50%

C：0.7

D：30%以下

答案：D

72.（2018年真题）患者,男,58岁,体重68kg,高血压病史5年。5天前出现咳嗽、咳痰，伴发热,入院查体BP：120/80mmHg,T38.9℃。化验结果:白细胞计数14.6×109L,中性粒细胞百分比86%。胸片示:右下肺纹理增粗,诊断为社区获得性肺炎，青霉素皮试阳性。

A：阿奇霉素

B：头孢他啶

C：哌拉西林

D：头孢曲松

答案：B

73.（2017年真题）处方外文缩写OU代表（）

A：右耳

B：双眼

C：左耳

D：左眼

答案：B

74.患者，女，55岁，关节痛半年，临床诊断为类风湿关节炎，既往有十二支肠溃疡病史，应首选的NSAID类药物是

A：布洛芬

B：塞来昔布

C：双氯芬酸

D：吲哚美辛

答案：B

75.告知"培氟沙星合用糖皮质激素出现跟腱断裂"属于

A：禁忌证

B：药品不良反应

C：合理用药信息

D：药物相互作用

答案：D

76.“加”的外文缩写为()。

A：Add

B：gtt

C：qod

D：Ad

答案：D

77.（2017年真题）因可提高血液携氧量,被长跑运动员用于提高成绩,因而被列为兴奋剂管理的药物是（）

A：人促红素

B：甲睾酮

C：可卡因

D：哌替啶

答案：A

78.血栓的发生率增加的指标是

A：INR＜3

B：INR＜1.5

C：INR＞3

D：INR＞5

答案：B

79.下列药物中，属于弱阿片类药物的为

A：哌替啶

B：吗啡

C：曲马多

D：美沙酮

答案：C

80.流行性腮腺炎

A：淋巴细胞增多

B：白细胞减少

C：红细胞沉降率减慢

D：白细胞增多

答案：A

81.（2016年真题）患者，男，45岁，因男性乙型肝炎给予干扰素治疗，治疗1个月后，患者出现脱发，停用干扰素后，脱发症状好转，再次给予干扰素治疗，患者再次出现脱发。该ADR的因果关系评价结果是（）。

A：很可能

B：可能无关

C：肯定

D: 可能

答案：C

82.患者，男，72岁，既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。1个月前因出现哮喘症状就诊。医师处方：布地奈德气雾剂200μgbid吸入，沙丁胺醇气雾剂100pgpm吸入，氨氯地平片5mgqd口服及硝酸甘油片0.5mgpm舌下含服。

A: 摇匀→呼气→深吸气同时揿压阀门→屏气约10秒→漱口

B: 呼气→摇匀→揿压阀门并深吸气→屏气约10秒→漱口

C: 呼气→揿压阀门并深吸气→屏气约10秒→漱口

D: 漱口→摇匀→呼气→揿压阀门并深吸气→屏气约10秒

答案：A

83.适用于早期、轻度症状者的是

A: 恩托卡朋

B: 苯海索

C: 司来吉兰

D: 左旋多巴

答案：C

84.单纯餐后血糖高，而空腹和餐前血糖不高的2型糖尿病患者首选

A: 格列喹酮

B: 阿卡波糖

C: 比格列酮

D: 二甲双胍

答案：B

85.以下中毒后药物拮抗的叙述中，属于物理性拮抗的是

A: 二巯丙醇解救汞中毒

B: 弱碱中和强酸

C: 药用炭吸附

D: 依地酸钙钠解救铅中毒

答案：C

86.磺胺类药用于抗感染不宜食用的是

A: 脂肪

B: 食盐

C: 蛋白质

D: 食醋

答案：D

87.患者，女，45岁，1年前临床诊断为室上性心动过速，服用美托洛尔片25mgbid。近日因反复胃痛就诊，胃镜检查诊断为胃溃疡，幽门螺杆菌阳性。既往有膝关节疼痛，长期服用非甾体抗炎药。医师处方：奥美拉唑肠溶片20mgqd，甲硝唑片0.4gtid，克拉霉素片50mgbid，枸橼酸铋钾胶囊220mgtid。该处方中，给药剂量错误的药物是

A: 奥美拉唑肠溶片

B: 克拉霉素片

C: 甲硝唑片

D: 枸橼酸铋钾胶囊

答案：B

88.上市前药物临床评价阶段的临床试验分为

A: 4期

B: 1期

C：2 期

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/325312144004012040