

# 2023 年主治医师之全科医学 301 通关题库(附带答案)

## 单选题（共 30 题）

1、老年人长期卧床排便无力

- A. 甲基纤维素口服
- B. 液状石蜡口服
- C. 肥皂水灌肠
- D. 外科手术
- E. 半乳糖口服

【答案】 B

2、预防脱水

- A. 抗生素
- B. 1/2~2/3 张力含钠液静脉滴注
- C. 口服补液
- D. 2:1 等张力液迅速扩容
- E. 1/5~1/8 张力含钠液静脉滴注

【答案】 C

3、社区诊断的主要目的中不包括

- A. 提供制定社区卫生计划所需的资料
- B. 根据资料制定建设社区卫生计划
- C. 发现社区主要健康问题及排列顺序，辨明社区的需要、需求
- D. 了解社区资源及解决卫生问题的能力

E. 分析社区健康问题产生的主要原因及影响因素

【答案】 B

4、男性，40岁，因劳累近2周自感头晕、头痛，连续三次测血压值为160/100mmHg，休息后血压可自行恢复正常，诊断应首先考虑

A. 慢性肾炎

B. SLE

C. 甲亢

D. 原发性高血压

E. 急进型高血压

【答案】 D

5、抗病毒治疗用干扰素或利巴韦林，应在肾综合征出血热哪一期使用最有效

A. 发热期

B. 热退期

C. 休克期

D. 少尿期

E. 多尿期

【答案】 A

6、下列痹证的治法中最常见的是

A. 益气养血

B. 驱邪通络

C. 活血行瘀

D. 健脾化湿

E. 补益肝肾

【答案】 B

7、患者，女，65岁。急性胆汁性腹膜炎，行胆囊切除、胆总管切开引流术后第6天，突发寒战。体温36.8℃，血压84/54mmHg，少尿。血白细胞 $8.2 \times 10^9/L$

A. 革兰阳性菌败血症

B. 革兰阴性菌败血症

C. 厌氧菌败血症

D. 复数菌败血症

E. 真菌性败血症

【答案】 B

8、抽样误差的大小受到什么影响

A. 自由度

B. 样本含量

C. 理论频数

D. 行×列表中格子数的多少

E. 实际频数

【答案】 B

9、湿阻是指湿邪阻滞于

A. 经络

B. 中焦

- C. 膜原
- D. 下焦
- E. 四肢

【答案】 B

10、42岁男性高血压患者，经商。因头晕、头痛来诊，血压170/100mmHg。接受诊疗后服药3天症状消失，随即自行停药，且不愿改变其烟、酒嗜好，认为无头晕、头痛就没有病。影响该病人遵医行为的因素是

- A. 家庭支持不力
- B. 病人知识不足
- C. 用药过于复杂
- D. 医患关系不良
- E. 经济因素

【答案】 B

11、以下对十字板剪切试验成果应用的提法中，（）是错误的。

- A. 可较好地反映饱和软黏性土不排水抗剪强度随深度的变化
- B. 可分析确定软黏性土不排水抗剪强度峰值和残余值
- C. 所测得的不排水抗剪强度峰值一般较长期强度偏低30%~40%
- D. 可根据试验结果计算灵敏度

【答案】 C

12、下列哪项不是肿瘤急性溶解综合征的临床表现

- A. 高尿酸血症
- B. 高钾血症

- C. 高磷血症
- D. 高钙血症
- E. 代谢性酸中毒

【答案】 D

13、推拿按摩中的推法是

- A. 用指、掌或肘部用力稳而匀进行单向的直线平推
- B. 双手握患者肢体远端，用力做小幅度的上下颤动
- C. 用拇指或掌按压体表
- D. 用虚掌拍打患部
- E. 使关节做被动的环转运动

【答案】 A

14、常用于治疗三焦热盛的中成药是

- A. 龙胆泻肝丸
- B. 三黄片
- C. 清胃黄连片
- D. 知柏地黄丸
- E. 金胆片

【答案】 B

15、在突发公共卫生事件中不属于社区卫生服务机构应采取的措施是

- A. 负责突发公共卫生事件应急指挥工作
- B. 设立传染病隔离留观室

- C. 分配发放应急药品和防护用品
- D. 开展病人初诊、救治和转诊工作
- E. 指定专人负责突发公共卫生事件相关信息的报告与管理工作

【答案】 A

16、病因推断中，反映关联强度的指标为

- A. 归因危险度
- B. 相对危险度
- C. 人群归因危险度
- D. 特异危险度
- E. 以上都不是

【答案】 B

17、流行病学实验中研究对象的随机分组的目的是

- A. 增加参与研究对象的依从性
- B. 试验的病人能代表该试验的目标人群
- C. 提高实验组和对照组的可比性
- D. 在试验期间对干预病人和对照病人的处理与评价相似
- E. 方便对参加实验的人群进行用药

【答案】 C

18、对病人及人群的健康照顾应以什么为目标

- A. 作出正确诊断
- B. 解决健康问题

- C. 早日康复
- D. 提高生命质量
- E. 以上都是

【答案】 D

19、确诊门脉性肝硬化最可靠的依据是

- A. 肝功能明显不正常
- B. 血浆白蛋白、球蛋白比例倒置
- C. 肝、脾肿大
- D. 肝穿刺病理有假小叶形成
- E. 腹水

【答案】 D

20、一名既往健康的 25 岁教师出现发热和脸部及胸部出疹。该皮疹发痒，查体可见多个在不同的发展阶段的丘疹、水泡。一个星期后，她诉咳嗽，X 线片发现肺中有一个渗出影。最有可能感染的病原是

- A. 肺炎链球菌
- B. 肺炎支原体
- C. 卡氏肺囊虫
- D. 水痘病毒
- E. 莫拉菌

【答案】 D

21、健康教育要给人们提供

- A. 技能、卫生知识和经验

- B. 卫生宣传、经验和反馈
- C. 卫生知识、经验与物质支持
- D. 卫生知识、技能与服务
- E. 信息、技术和经营支持

【答案】 D

22、上颌窦自然窦口在

- A. 总鼻道
- B. 蝶筛隐窝
- C. 上鼻道
- D. 中鼻道
- E. 下鼻道

【答案】 D

23、慢性肺心病患者，近1周来咳嗽加剧，双肺有湿啰音，双下肢水肿，血WBC及中性分类均增高。动脉血气分析：pH7.30，PaCO

- A. 抗生素控制感染
- B. 氨茶碱解痉
- C. 西地兰强心
- D. 酚妥拉明静脉滴注
- E. 氢氯噻嗪利尿

【答案】 C

24、在一定范围的固定人群中，短时间内突然出现大量具有相同症状和体征的病人，这种现象一般被描述为



- A. 短期波动
- B. 季节性
- C. 大流行
- D. 地方性
- E. 周期性

【答案】 A

25、患者，女，32岁，婚后5年未孕，痛经3年。平素月经规律，近3年出现经期腹痛，并呈进行性加重。男方精液检查未见明显异常。妇科检查：外阴、阴道、宫颈未见异常；子宫后倾后屈位，大小正常，后壁颈峡部可及触痛性结节；右侧附件区可触及一囊肿，大小约8cm×5cm，活动差。左侧附件未触及明显异常。

- A. 经腹右侧附件切除术
- B. 腹腔镜下右侧附件切除术
- C. 经腹右侧卵巢囊肿剥除术
- D. 腹腔镜下剥除右侧卵巢囊肿+输卵管通液术，术后内分泌治疗
- E. 腹腔镜下剥除右侧卵巢囊肿

【答案】 D

26、慢性肺源性心脏病患者急性加重期慎用

- A. 镇静剂
- B. 祛痰剂
- C. 解痉平喘药
- D. 呼吸兴奋剂
- E. 抗感染药物

【答案】 A

27、上消化道大出血的典型表现是

- A. 大便潜血试验持续阳性
- B. 柏油样黑便
- C. 排便后滴鲜血，血在粪便表面
- D. 白陶土样便
- E. 脓血黏液便

【答案】 B

28、关节活动范围是指

- A. 确定妨碍功能或可产生畸形的受限程度
- B. 测定运动功能障碍
- C. 确定增加功能活动能力或减轻畸形所需要增加的范围
- D. 关节运动时所经过的运动弧
- E. 被动 ROM 比主动的 ROM 稍大

【答案】 D

29、患者，男，45岁。5年前被确诊为再障，经治疗基本痊愈。一天前因受凉导致感冒发热，服用阿司匹林一个小时后感觉剧烈腹痛，恶心呕吐，腰背酸痛，次晨尿色加深，似浓茶色。血象：RBC $2.3 \times 10^{12} / L$ ，Hb70g / L，WBC $4.1 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞 0.45，淋巴细胞 0.55，血小板  $60 \times 10^9 / L$ ，网织红细胞 0.035。为明确诊断，应进一步做哪种试验检查

- A. 尿常规检查
- B. 粪常规检查

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/327056053025006041>