

2024 年河北省雄县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题王牌题库（易错题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 长期服用苯妥英钠，可能导致

- A: 丙氨酸氨基转移酶升高
- B: 血清碱性磷酸酶升高
- C: γ -谷氨酰转移酶升高
- D: A / G 比值 <1

答案：C

2. 处方中开具"黄体酮用于排除输尿管结石"，应评判为

- A: 有禁忌证用药
- B: 联合用药不适宜
- C: 过度治疗用药
- D: 无正当理由超适应证用药

答案：D

3. 急性肠炎可出现()。

- A: 鲜血便
- B: 脓状便
- C: 脓血便
- D: 稀糊便

答案：D

4. 作为预防用药错误策略，规范处方行为与操作流程，归属于

- A: 管理规范到位
- B: 人员知识培训
- C: 环境与流程的优化与持续改进
- D: 科学发展

答案：A

5. 误服药物、服药过量以及滥用药物均可引起药物中毒。常见的致中毒药物包括西药、中药和农药。随着化学制药工业的不断发展，如果管理和解救措施跟不上，药物中毒的危害即将越来越严重。

- A: 0.5h
- B: 1.0h
- C: 1~2h
- D: 2~4h

答案：A

6. 发热在应用解热镇痛药时，老年人的用药时间间隔是

- A: 3~5 小时
- B: 3~6 小时
- C: 4~6 小时
- D: 2~5 小时

答案：C

7. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第一跖趾关节剧痛，3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 $500 \mu\text{mol/L}$ ；足部 X 线示非特征性软组织肿胀。

- A: 假性痛风
- B: 类风湿关节炎

C: 痛风

D: 风湿性关节炎

答案: C

8. (2018 年真题) 患者, 男, 36 岁, 因发热、咳嗽就诊, 查血常规: 白细胞计数 $6.28 \times 10^9/L$, 中性粒细胞百分比 65.7%, 淋巴细胞百分比 15.1%。诊断为感冒。医生处方: 阿奇霉素片 0.5gqdpo. 该处方属于 ()

A: 有禁忌证用药

B: 无适应证用药

C: 用法、用量不适宜

D: 有配伍禁忌

答案: B

9. 临床可作为氨基糖苷类药物的替代品的是

A: 氨基糖

B: 头孢哌酮

C: 克拉维酸

D: 亚胺培南

答案: A

10. 伴有焦虑症的抑郁症患者宜选用

A: 度洛西汀

B: 帕罗西汀

C: 文拉法辛

D: 阿米替林

答案: B

11. 常见药源性疾病有药源性胃肠道疾病、肝脏疾病、肾脏疾病、血液疾病、神经系疾病、高血压病。

- A: 肺
- B: 胃肠系统
- C: 肾脏
- D: 肝脏

答案：D

12. 药师应掌握处方中常用的外文缩写，“必要时”用药的缩写是()

- A: prn
- B: qid
- C: qd
- D: qn

答案：A

13. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第 1 跖趾关节剧痛，3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 $500 \mu\text{mol/L}$ ；足部 x 线示非特征性软组织肿胀。

- A: 苯溴马隆
- B: 别嘌醇
- C: 秋水仙碱
- D: 丙磺舒

答案：C

14. 药酶的活性可被部分药品所增强或灭活，能增强肝药酶活性的药品是

- A: 左氧氟沙星
- B: 丙磺舒

C: 多潘立酮

D: 利福平

答案: D

15. (2017 年真题) 因可提高血液携氧量, 被长跑运动员用于提高成绩, 因而被列为兴奋剂管理的药物是 ()

A: 甲睾酮

B: 哌替啶

C: 可卡因

D: 人促红素

答案: D

16. 患者, 女, 18 岁, 近半年来食欲亢进, 多汗, 体重明显减轻, 伴有乏力、心悸。就诊查体见双手震颤, 心率 104 次 / 分。化验结果: 血清促甲状腺激素 (TSH) $< 0.1 \text{ mU/L}$, FT3、FT4 明显升高, 肝、肾功能基本正常, 白细胞计数正常。诊断为甲状腺功能亢进症。首选的治疗方案是

A: 注意休息与补充营养, 使用甲巯咪唑治疗

B: 甲状腺全切除手术

C: 碘化钾治疗, 定期复查

D: 选用放射性 ^{131}I 治疗

答案: A

17. 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15KG，一天前发热(39℃)，咽喉痛，无咳嗽、吐血，家长主诉在家中应用退烧药治疗，发病左右出现腹泻，约 2~5 次大便，量少，黄色粘液便，呕吐一次。体格检查：T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分。咽微充血，出现轻脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃，实验室检查：WBC： 5×10

- A: 消化不良性腹泻
- B: 分泌性腹泻
- C: 感染性腹泻
- D: 动力性腹泻

答案：C

18. 肾功能不全患者宜选用的药物是

- A: 经肝肠循环消除的药物
- B: 肾毒性小、经肝代谢的药物
- C: 肝毒性小、经肾代谢的药物
- D: 经肝肾双途径消除的药物

答案：B

19. 属于长效的胰岛素制剂是

- A: 赖脯胰岛素
- B: 精蛋白锌胰岛素
- C: 甘精胰岛素
- D: 低精蛋白锌胰岛素

答案：B

20. 患者，女，27 岁，今日早起出现打喷嚏、鼻塞、流清水样鼻涕、咳嗽、少量咳痰症状，体温 37.6℃，疑似普通感冒，前来药店购买药物。药师给予其购药指导，下述错误的是

A: 适当补充水分、保持室内空气流通，避免继发细菌感染

B: 在症状出现后 24 小时内开始每天服用至少 75mg 醋酸锌或葡萄糖酸锌等含锌制剂

C: 应戴口罩，避免出入人多的公共场合，注意隔离

D: 尽早服用阿莫西林胶囊

答案：D

21. 目前推荐的绝经期激素补充治疗的窗口期是()

A: 绝经后 5 年之内

B: 大于 60 岁

C: 绝经后 10 年之内或 60 岁以前

D: 绝经后 5 年之内或大于 60 岁

答案：C

22. (肾功能不全者的药物排泄机制)弱酸性药物离子化减少

A: 肾血流量减少

B: 肾小管分泌减少

C: 肾小球滤过减少

D: 肾小管重吸收增加

答案：D

23. 以高 TG 为主血症首选

A: 氟伐他汀

B: 阿昔莫司

C: 依折麦布

D: 非诺贝特

答案：D

24. (2017 年真题) 药师在审核处方时,无需要求确认或重新开处方的情形是 ()

A: 将酚麻美敏胶囊和板蓝根颗粒开在同一张处方上

- B: 给糖尿病患者同时开具消渴丸和格列本脲
- C: 头孢曲松钠选用复方氯化钠注射液作溶媒
- D: 诊断为麻疹,使用阿莫西林抗感染治疗

答案: A

25. 属于选择性 GABAA 复合受体拮抗剂

- A: 唑吡坦
- B: 艾司唑仑
- C: 阿戈美拉汀
- D: 米氮平

答案: A

26. 结果一致的 II、III 级临床研究结论或 I 级临床研究的推论属于

- A: E 级
- B: D 级
- C: B 级
- D: C 级

答案: C

27. 滴虫性阴道炎宜选用

- A: 甲硝唑
- B: 咪康唑
- C: 庆大霉素
- D: 聚甲酚磺醛

答案: A

28. 妇女口服避孕药致阿米替林清除率下降,引起药源性疾病的因素主要为

- A: 年龄因素
- B: 性别因素
- C: 遗传因素
- D: 基础疾病因素

答案：B

29. 下列止咳药中，夜间咳嗽患者宜选用的是

- A: 喷托维林
- B: 氨溴索
- C: 右美沙芬
- D: 可待因

答案：C

30. 服用降压避风片、脉君安片、珍菊降压片等降压中成药的患者，必须慎用的化学药品是

- A: 硝苯地平
- B: 缬沙坦
- C: 螺内酯
- D: 氢氯噻嗪

答案：D

31. 使用前应用原药进行皮试的药物是

- A: 阿莫西林胶囊
- B: 左氧氟沙星片
- C: 阿奇霉素片
- D: 注射用头孢曲松钠

答案：D

32. 氨茶碱注射剂和片剂所表现的是()。

- A: 同一药物，制成同一剂型，由于处方组成不同而表现不同
- B: 同一药物，剂型不同，其起效的快慢、作用强度和持续时间不同
- C: 同一药物，制成同一剂型，由于制备工艺不同而表现不同
- D: 同一药物，剂型不同，其副作用、毒性不同

答案：B

33. 可待因属于兴奋剂中的

- A: β 受体阻断剂
- B: 麻醉药品
- C: 精神刺激剂
- D: 利尿剂

答案：B

34. 某患者，女，27 岁，多汗、多食、消瘦、心悸、烦躁 3 个月。血 FT

- A: 白细胞
- B: 血压
- C: 心率
- D: 体重

答案：B

35. 能降 LDL 也降 HDL 的药物是

- A: 塞伐他汀
- B: 烟酸
- C: 普罗布考
- D: 非诺贝特

答案：C

36. 依据咳嗽的发病时间，夜间咳嗽者宜首选()。

- A: 右美沙芬
- B: 可待因
- C: 苯丙哌林
- D: 吗啡

答案：A

37. (2019 年真题) 患者，男，34 岁，有吸毒史。因过量使用阿片类药物昏迷入急诊抢救，表现为针尖样瞳孔、呼吸抑制，可选用的解救药物是

- A: 纳洛酮
- B: 二巯丙醇
- C: 维生素 K
- D: 亚甲蓝

答案：A

38. 可升高红细胞，用于肾性及非肾性贫血的是

- A: 硫酸亚铁
- B: 非格司亭
- C: 维生素 B12
- D: 重组人促红素

答案：D

39. 下列药物服用后可引起嗜睡，对驾车、高空作业或操作机器者宜慎用的是

- A: 右美沙芬
- B: 喷托维林

C: 苯丙哌林

D: 可待因

答案: A

40. 未发生卒中前预防卒中的发生所采取的措施属于

A: 二级预防

B: 一级预防

C: 三级预防

D: 四级预防

答案: B

41. (2017 年真题) 患者，男 52 岁，身高 168cm，体重 85kg，痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖 7.8mmol/L (正常值: 3.9~6.1mmol/L)，餐后血糖 14.8mmol/L (正常值: <7.8mmol/L)，血尿酸 580 $\mu\text{mol/L}$ (正常值: 男性 180~440 $\mu\text{mol/L}$)，LDL-c 3.7mmol/L (正常值: 2.1~3.1mmol/L) 肌酐清除率 100ml/min。颈动脉彩超提示: 动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断 2 型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

A: 低血糖

B: ALT 升高

C: 心律失常

D: 腹胀

答案: D

42. 抑制黄嘌呤氧化酶，阻止次黄嘌呤和黄嘌呤代谢为尿酸，减少尿酸的生成

A: 丙磺舒

B: 阿司匹林

C: 秋水仙碱

D: 别嘌醇

答案: D

43. 用于对组织无刺激性药物

A: 动脉注药

B: 腔内注射

C: 静脉注射

D: 肌肉注射

答案: D

44. “沟通技能”在药学服务工作中最重要的作用是

A: 用药监督作用

B: 应对投诉作用

C: 双向交流作用

D: 药物警戒作用

答案: C

45. 患者，男，58 岁，高血压病史 5 年；吸烟史 40 年，日均 40 支。2 小时前出现左侧肢体无力，并逐渐加重，不能站立；家属发现其说话迟钝、言语含混，左侧鼻唇沟变浅；意识清楚。急送医院急诊，BP170/100mmHg；血常规基本正常；头颅 CT 检查未见高密度病灶。诊断为脑梗死。

A: 尼莫地平注射液 200mgqdivgtt

B: 甘油果糖注射液 500mlbidivgtt

C: 甘露醇注射液 250mlq6hivgtt

D: 呋塞米片 20mgqdp

答案: C

46. 抗高血压药物属于血管紧张素 II 受体阻断剂的是（）

- A: 氨氯地平
- B: 依那普利
- C: 氢氯噻嗪
- D: 缬沙坦

答案：D

47. 可使驾驶员视物模糊或辨色困难的药物是

- A: 阿托品
- B: 西咪替丁
- C: 苯噻啶
- D: 氨苯蝶啶

答案：A

48. 超常处方

- A: 无适应证用药
- B: 黄连素用于细菌性腹泻
- C: 二甲双胍用于糖尿病患者
- D: 无正当理由不首选国家基本药物

答案：A

49. 进一步验证药物对目标适应证患者的治疗作用和安全性是指

- A: II 期临床试验
- B: 临床预试验
- C: III 期临床试验
- D: I 期临床试验

答案：C

50. (2016 年真题) 以质量调整为生命年或者质量调整为预期寿命为指标开展的药物经济学评价方法属于 ()。

- A: 成本-效果分析
- B: 最小成本分析
- C: 成本-效用分析
- D: 成本-效益分析

答案: C

51. 有机酸排出减少

- A: 肾血流量减少
- B: 肾小球滤过减少
- C: 肾小管重吸收增加
- D: 肾小管分泌减少

答案: D

52. 具有催吐作用，在无禁忌证前提下，可用于多种毒物中毒的催吐排毒药物是

- A: 阿扑吗啡
- B: 昂丹司琼
- C: 氯丙嗪
- D: 吗啡

答案: A

53. 提示: 可能引起咳嗽, 是针对

- A: 卡托普利
- B: 氯苯那敏
- C: 铋制剂

D: 氟西汀

答案: A

54. 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂

A: 米氮平

B: 吗氯贝胺

C: 氟米帕明

D: 氟伏沙明

答案: D

55. 心力衰竭伴心绞痛应首选的药物是

A: 硝酸甘油

B: 美托洛尔

C: 单硝酸异山梨酯

D: 氨氯地平

答案: B

56. 沿静脉出现迂回线状色素沉着的是 ()

A: 博来霉素

B: 吉非替尼

C: 阿霉素

D: 氟尿嘧啶

答案: D

57. 患者，男，28 岁，2 天前因淋雨后出现发热，体温最高达 39℃，经实验室和胸片检查，临床诊断为社区获得性肺炎，无其他基础疾病，可首选的抗菌药物是

A: 阿米卡星

- B: 头孢哌酮舒巴坦
- C: 亚胺培南西司他汀
- D: 头孢拉定

答案：D

58. 关于腹泻下列说法正确的是

- A: 迁延性腹泻病程为 2 周至 1 个月
- B: 慢性腹泻病程大于 1 个月
- C: 急性腹泻病程小于 2 周
- D: 排便一日超过 4 次

答案：C

59. 痛风患者急性发作期，不能选用的止痛药物是

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 阿司匹林
- C: 泼尼松
- D: 布洛芬

答案：B

60. 患者，男，体检发现尿血红蛋白阳性，特向药师咨询，怀疑为药物所致，以下可导致尿血红蛋白阳性的药物是

- A: 两性霉素 B
- B: 庆大霉素
- C: 秋水仙碱
- D: 氯丙嗪

答案：C

61. 可提供摘要、引文、索引及目录的信息属于

- A: 三级信息
- B: 二级信息
- C: 一级信息
- D: 四级信息

答案：B

62. 患者,女,75 岁,近来因家庭变故出现焦虑相关的精神和躯体症状,入睡困难,多梦易惊醒,诊断为焦虑症、核查其用药记录,患者在服用氨氯地平、阿托伐他汀钙。

- A: 三环类抗抑郁药
- B: 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂
- C: 5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂
- D: 苯二氮?类药物

答案：D

63. (有关物质中毒的特效解毒剂), 有机磷中毒的特效解毒剂是

- A: 氯解磷定
- B: 乙酰胺
- C: 烯丙吗啡
- D: 维生素 K

答案：A

64. 对于铁剂的使用, 正确的为

- A: 为迅速纠正患者贫血症状, 初始治疗用大剂量
- B: 碳酸氢钠抑制铁剂吸收
- C: 口服铁剂宜选用 3 价铁
- D: 待血红蛋白恢复正常后, 即可停止服用

答案：B

65. 妊娠期尿路感染宜选用

- A: 丙硫氧嘧啶?
- B: 喹诺酮类?
- C: 四环素?
- D: 阿莫西林?

答案: D

66. 药师应告知医师“血药浓度监测是安全实施该治疗的重要措施”的事例是

- A: 利巴韦林可致畸与肿瘤
- B: 地高辛用于肾功不全患者
- C: 阿昔洛韦可致急性肾衰竭
- D: 替加色罗存在心绞痛风险

答案: B

67. 稳定型心绞痛的临床表现不包括

- A: 多持续 3~5 分钟
- B: 针刺或刀扎样锐性痛
- C: 压迫、发闷
- D: 胸痛

答案: B

68. 可沉淀大部分有机物及无机物的洗胃液是

- A: 3%~5%鞣酸溶液
- B: 鸡蛋白
- C: 药用炭混悬液
- D: 1%氯化钠溶液

答案：A

69. 患者，男，56 岁，慢性乙型肝炎患者，ALT120U/L。下列药物中可以使用的是

- A: 异烟肼
- B: 利福平
- C: 水飞蓟素
- D: 氟康唑

答案：C

70. 不良反应的评价结果分为 6 级，报表内容填写不齐全，等待补充后再评价，或因果关系难以定论，缺乏文献资料佐证，药品不良反应因果关系评价结果为

- A: 待评价
- B: 可能无关
- C: 很可能
- D: 肯定

答案：A

71. （2021 年真题）患者，男，58 岁，有高血压、冠心病、高脂血症、便秘、骨关节炎和胃溃疡病史，2 年前接受冠脉支架植入术。近日，患者先后在心内科、消化科、骨科就诊，开具药品如下：

- A: 阿托伐他汀钙用于冠心病的治疗，需长期规律用药
- B: 同时使用双氯芬酸钠与阿司匹林会增加消化道出血风险，两药不宜合用
- C: 美托洛尔会影响阿司匹林的抗血小板活性，应停用
- D: 如大便次数规律（如每日 1 次），聚乙二醇 4000 散可按需使用

答案：C

72. (2016 年真题) 将药物治疗成本和所产生的效益规划为以货币为单位的数字，进行药物经济学评价。这一评价方法属于 ()。

- A: 成本-效益分析
- B: 最小成本分析
- C: 成本-效用分析
- D: 成本-效果分析

答案：A

73. 治疗高血压伴稳定性心绞痛何种药物为宜

- A: 硝苯地平
- B: 利血平
- C: 甲基多巴
- D: β -受体阻滞剂

答案：D

74. 能提高运动员的呼吸功能，增加供氧能力，并能振奋精神的兴奋剂

- A: 精神刺激剂
- B: β -受体阻断剂
- C: 利尿剂
- D: 蛋白同化激素

答案：B

75. 下列药物中使用前无需皮试的是

- A: 抑肽酶注射剂
- B: 苄星青霉素注射剂
- C: 紫杉醇注射剂
- D: 抗狂犬病病毒血清注射剂

答案：C

76. 吸附力强、可阻止毒物吸收的是

- A: 1%硫酸镁溶液
- B: 淀粉溶液
- C: 药用炭混悬液
- D: 1%氯化钠溶液

答案：C

77. 以下治疗手足浅表性真菌感染的药物中，尤其适用于角化皲裂型足癣的处方药是

- A: 特比萘芬
- B: 依沙吡啶
- C: 尿素
- D: 苯甲酸

答案：A

78. 应用铁剂的影响因素预防铁负荷过重，表现为铁的吸收与体内储存量有关，缺铁性贫血者的吸收率为

- A: 0.4
- B: 10%~30%
- C: 0.3
- D: 10%~20%

答案：C

79. 患者，男，65 岁，慢性咳嗽、喘息 10 余年，活动后症状明显，近 7 天症状加重入院，伴便秘，每周 2 次排便。既往有高血压病史 12 年；长期口服硝苯地平控释片 30mgqd，血压控制良好。体格检查：体温 36.6℃，P82 次/分，R22 次/分，端坐位，喘息，桶状胸，双肺叩诊呈过清音，可闻及散在干鸣音，双下肺少许湿啰音，杵状指。辅助检查：血常规 WBC $11.2 \times 10^9/L$ ，肺功能 FEV₁/FVC60%，FEV₁55%。治疗方案如下：氨溴索注射液 30mg tid ivgtt，莫西沙星氯化钠注射液 0.4g bid ivgtt，异丙托溴铵溶液 0.5mg bid 雾化吸入，布地奈德混悬液 1mg bid 雾化吸入

- A: 30ml，早餐时一次性服用
- B: 每次 10ml，每日 3 次，餐后给药
- C: 每次 10ml，每日 3 次，餐前给药
- D: 30ml，晚餐时一次性服用

答案：A

80. 适宜餐前给药的药物是

- A: 法莫替丁
- B: 缬沙坦
- C: 复方铝酸铋
- D: 二甲双胍

答案：C

81. 人体健康参数：肥胖的腰围标准是

- A: 男性>90cm，女性>85cm
- B: 男性>85cm，女性>80cm
- C: 男性>90cm，女性>80cm
- D: 男性>95cm，女性>85cm

答案：A

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

82. 茶碱类支气管平滑肌松弛剂治疗慢阻肺疾病的主要不良反应是

A: 水肿

B: 口渴

C: 失眠

D: 尿频

答案: C

83. 促进铁剂吸收的

A: 牛奶、蛋类

B: 碳酸氢钠

C: 胰酶

D: 维生素 C

答案: D

84. (2018 年真题) 患者, 男, 57 岁, 化验结果: TC4.6mmol/L (参考值 <5.2mmol/L), TG11.0mmol/L (参考值 0.56——1.70mmol/L) 尿酸 508umol/L (参考值 <420umol/L), 应首选的调脂药物为 ()

A: 依折麦布

B: 非诺贝特

C: 烟酸

D: 考来烯胺

答案: B

85. (消化性溃疡并发症), 幽门梗阻

A: 疼痛性质改变, 明显消瘦、贫血

B: 餐后加重的上腹胀痛, 呕吐物有隔夜食物

C: 规律性上腹痛

D: 突发上腹剧痛, 继而至全腹

答案: B

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/327066021051010024>