专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024湖北省鄂城区《执业药师之西药学专业二》考试必刷200题题库大全（A卷）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.能可逆、选择性地抑制儿茶酚-O-甲基转移酶，可延长和稳定左旋多巴对帕金森病治疗作用的药物是

A：恩他卡朋

B：苯海索

C：司来吉兰

D：左旋多巴

答案：A

2.维生素A的适应证不包括

A：夜盲症

B：干眼病

C：坏血病

D：角膜软化

答案：C

3.属于β受体激动剂的非强心苷类正性肌力药是

A：依那普利

B：米力农

C：地高辛

D：多巴酚丁胺

答案：D

4.存在低度致吐风险的抗肿瘤药物是

A：卡莫司汀

B：泼尼松

C：表柔比星

D：多西他赛

答案：D

5.（2018年真题）属于短效胰岛素或短效胰岛素类似物的是（）

A：甘精胰岛素

B：低精蛋白锌胰岛素

C：普通胰岛素

D：地特胰岛素

答案：C

6.可引起巨幼红细胞性贫血的药物是()

A：氯喹

B：伯氨喹

C：甲氟喹

D：乙胺嘧啶

答案：D

7.少数病人首次用药出现首剂效应的是

A：地高辛

B：哌唑嗪

C：氨氯地平

D：卡托普利

答案：B

8.胃肠道不良反应较轻的是

A：硫酸亚铁糖浆

B：琥珀酸亚铁胶囊

C：硫酸亚铁片

D：硫酸亚铁缓释片

答案：D

9.患者，女，60岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊、塞来昔布胶囊、碳酸氢钠治疗。

A：长期口服给药

B：短期口服给药

C：注射与口服并用

D：注射给药

答案：B

10.基于甲状旁腺激素研发出的促进骨形成的药是

A：特立帕肽

B：唑来膦酸

C：雷洛昔芬

D：依普黄酮

答案：A

11.（2019年真题）沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下，请结合问题作答。

A：沙库巴曲缬沙坦不能与阿替洛尔、吲哚美辛或西咪替丁合用

B：从ACEI转换为沙库巴曲缬沙坦时，应停用ACEI36小时后方可转换

C：轻、中度肝功能损害患者可使用沙库巴曲缬沙坦

D: 轻、中度肾功能不全患者可使用沙库巴曲缬沙坦

答案：A

12.氨基糖苷类抗菌药无效的是

A: 需氧革兰阴性菌

B: 结核杆菌

C: 铜绿假单胞菌

D: 厌氧菌

答案：D

13.肾功能不全者不需要调整剂量的药物是

A: 罗红霉素

B: 青霉素

C: 氯霉素

D: 红霉素

答案：D

14.关于使用依折麦布的说法，错误的是

A: 剂量超过10mg/d对降低LDL水平无增效作用

B: 可单独服用或与他汀类联合应用

C: 成人剂量一次10mg。一日1次

D: 需空腹服用

答案：D

15.硝酸甘油的药理作用不包括

A: 减少回心血量

B: 增加心室壁张力

C: 增加心率

D: 扩张容量血管

答案：B

16.下述不属于胃黏膜保护剂的是

A: 谷氨酰胺

B: 前列腺素

C: 枸橼酸铋钾

D: 硫糖铝

答案：A

17.利福平联用伏立康唑使

A: 肝毒性增加

B: 吸收减少

C: 月经不规则

D: 疗效减弱

答案：D

18.肝素的抗凝作用特点是()

A: 体内、外均有效

B: 仅在体内有效

C: 作用缓慢

D: 必须有维生素K辅助

答案：A

19.（2015年真题）患者，女，45岁，因强直性脊柱炎住院，同时伴有胃溃疡、高血压及糖尿病，药师审核医嘱，发现应当禁用的药品是（）。

A: 格列齐特

B: 双氯芬酸

C: 硝苯地平

D: 雷尼替丁

答案：B

20.缺铁性贫血患者最宜选用的治疗药物是

A: 铁剂

B: 维生素C

C: 叶酸

D: 维生素B12

答案：A

21.对脑血管扩张作用较强的药物是()

A: 非洛地平

B: 尼莫地平

C: 硝苯地平

D: 尼索地平

答案：B

22.不易导致便秘和腹泻不良反应的抗酸药是

A: 碳酸钙

B: 三硅酸镁

C: 铝碳酸镁

D: 氢氧化铝

答案：C

23.硝酸酯类药物舒张血管的作用机制是

A: 激动血管平滑肌上的β2受体，使血管扩张

B：抑制磷酸二酯酶

C：产生NO，激活乌苷酸环化酶，使细胞内cGMP升高

D：产生NO，激活腺苷酸环化酶，使细胞内cAMP升高

答案：C

24.()与利福平合用时，在用利福平前和疗程中不需调整剂量

A：氯霉素

B：糖皮质激素

C：地高辛

D：氨茶碱

答案：C

25.关于硫黄软膏治疗疥疮的用法，错误的是

A：密切接触者应同时接受治疗

B：用药期间应勤用热水洗澡

C：对顽固患者必需3个疗程方能根治

D：儿童可使用5%的软膏

答案：B

26.具有中枢和外周抗多巴胺双重作用的是

A：甲氧氯普胺

B：西沙必利

C：莫沙必利

D：多潘立酮

答案：A

27.毒性大，不能注射用的抗真菌药是

A：制霉菌素

B: 灰黄霉素

C: 克霉唑

D: 咪康唑

答案：A

28.葡萄球菌引起的感染应选用

A: 利福平

B: 阿昔洛韦

C: 头孢他啶

D: 夫西地酸

答案：D

29.重度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选()

A: 奥美拉唑+口服地塞米松

B: 5-HT

C: 每日化疗前，应用5-HT

D: 5-HT

答案：D

30.缺铁性贫血患者通常口服铁剂治疗，如有条件进行铁蛋白测定，停药应在血清铁蛋白上升到

A: 20～30μg/L

B: 30～50μg/L

C: 10～15μg/L

D: 3～5μg/L

答案：B

31.（2016年真题）属于促胰岛素分泌剂的是

A：阿卡波糖

B：二甲双胍

C：艾塞那肽

D：那格列奈

答案：D

32.阻断H2受体的药物是

A：阿托品

B：奥美拉唑

C：雷尼替丁

D：氢氧化铝

答案：C

33.下列药物中属于缩瞳药的是

A：硫酸阿托品

B：毛果芸香碱

C：托吡卡胺

D：氢溴酸后马托品

答案：B

34.可与抗凝药发生相互作用的是

A：坎利酮

B：伐地那非

C：丙酸睾酮

D：呋塞米

答案：C

35.（2019年真题）为预防大剂量环磷酰胺引起的膀胱毒性，在充分水化、利尿的同时，还应给予的药物是（）

A：螺内酯

B：二甲双胍

C：美司钠

D：氯化钾

答案：C

36.可用于治疗重度痤疮，但妊娠期妇女避免使用的药物是

A：特比萘芬

B：克罗米通

C：克拉霉素

D：异维A酸

答案：D

37.临床用于军团菌病、支原体肺炎、空肠弯曲菌肠炎等首选的治疗药物是

A：阿奇霉素

B：头孢米诺

C：红霉素

D：四环素

答案：C

38.下列属于吗氯贝胺作用机制的表述是

A：抑制突触前膜去甲肾上腺素的再摄取

B：抑制A型单胺氧化酶，减少5-HT、去甲肾上腺素的降解

C：选择性抑制5-HT的再摄取，增加突触间隙5-HT浓度

D：抑制突触前膜5-HT、去甲肾上腺素的再摄取

答案：B

39.糖皮质激素的抗中毒性休克作用是

A：提高机体对细菌内毒素的耐受力

B：提高中枢神经系统的兴奋性

C：抑制巨噬细胞中一氧化氮合成酶

D：抑制巨噬细胞对抗原的吞噬处理

答案：A

40.关于糖皮质激素对血液成分影响的描述，错误的是

A：降低纤维蛋白原浓度

B：使中性白细胞数增多

C：使血小板增多

D：使红细胞和血红蛋白含量增加

答案：A

41.推荐与吸入性糖皮质激素联合使用,尤其适合于中、重度持续哮喘患者长期治疗的药物是

A：M胆碱受体阻断剂

B：长效B2受体激动剂

C：白三烯受体阻断剂

D：磷酸二酯酶抑制剂

答案：B

42.患者，女，46岁。以"口角歪斜3天"之主诉入院。3天前洗澡冲凉后次日晨起刷牙时发现右口角漏水，右侧闭眼不紧，口角歪斜，伴右眼流泪。查体：大致正常。诊断：面神经麻痹(右侧)。医嘱：

A：伊曲康唑

B：卡马西平

C：苯妥英钠

D：苯巴比妥

答案：A

43.属于长效和强效的特异性胃肠道脂肪酶抑制剂的是

A：阿仑膦酸钠

B：鲑降钙素

C：奥利司他

D：阿法骨化醇

答案：C

44.应用最广泛的口服抗凝血药是

A：肝素

B：维生素K

C：达比加群酯

D：华法林

答案：D

45.作用机制为直接改变破骨细胞的形态学，从而抑制其功能，首先阻止破骨细胞的前体细胞黏附于骨组织，进而对破骨细胞的数量和活性产生直接的影响，该药物是

A：降钙素

B：骨化三醇

C：阿仑膦酸钠

D：雷洛昔芬

答案：C

46.诱导肝微粒体酶，加速皮质激素和雌激素代谢的是()

A：利福平

B：乙胺丁醇

C：链霉素

D：异烟肼

答案：A

47.静脉注射可出现舌头麻木()

A：链霉素

B：多西环素

C：氯霉素

D：四环素

答案：B

48.甲氨蝶呤抗肿瘤作用机制是抑制

A：四氢叶酸还原酶

B：二氢叶酸合成酶

C：四氢叶酸合成酶

D：二氢叶酸还原酶

答案：D

49.治疗钙缺乏症可选用

A：阿伦膦酸钠

B：依降钙素

C：葡萄糖酸钙

D：阿法骨化醇

答案：C

50.属于抗炎类保肝药的是

A：多烯磷脂酰胆碱

B：还原型谷胱甘肽

C：异甘草酸镁

D：双环醇

答案：C

51.（2019年真题）用于治疗水肿性疾病，当起始治疗剂量未达到满意的治疗效果时，可追加剂量，每日最大剂量可达600mg，但一般应控制在100mg以内的利尿剂是（）

A：呋塞米

B：托拉塞米

C：依他尼酸

D：布美他尼

答案：A

52.对军团菌有效的药物是

A：两性霉素B

B：甲硝唑

C：链霉素

D：阿奇霉素

答案：D

53.对凝血的各环节均有作用，体内外均有抗凝作用，可防止急性血栓形成而成为对抗血栓的首选的抗凝血药是()。

A：水蛭素

B：磺达肝葵钠

C：依诺肝素

D: 阿哌沙班

答案：C

54.低致吐性化疗药物所引起的恶心呕吐,宜选用的止吐治疗方案是()

A: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松,化疗结束后给予2天的地塞米松或昂丹司琼

B: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦,化疗结束后给予2天的阿瑞吡坦和2~3天的地塞米松

C: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺

D: 化疗前使用昂丹司琼,化疗后不需要继续使用止吐药

答案：D

55.可用于治疗厌氧菌感染和阴道滴虫病的药物是()

A: 甲硝唑

B: 喹诺酮类

C: 苯唑西林

D: 四环素

答案：A

56.高血压伴精神抑郁者不宜选用

A: 尼莫地平

B: 硝苯地平

C: 普萘洛尔

D: 利血平

答案：D

57.目前首选的口服减肥药是

A: 阿仑膦酸钠

B：鲑降钙素

C：奥利司他

D：阿法骨化醇

答案：C

58.（2015年真题）辅助治疗不孕症的维生素是（）。

A：维生素E

B：维生素B5

C：维生素B2

D：烟酸

答案：A

59.下列降压药中属于血管紧张素II受体阻断药的是()

A：坎地沙坦

B：阿利克仑

C：地尔硫

D：左旋氨氯地平

答案：A

60.以下关于5型磷酸二酯酶抑制剂的描述，正确的是

A：口服吸收迅速

B：主要经过肾脏代谢

C：口服后生物利用度较高

D：代谢产物不具有活性

答案：A

61.属于IC类抗心律失常药的是

A：胺碘酮

B: 普罗帕酮

C: 普鲁卡因胺

D: 奎尼丁

答案：B

62.宜选用塞来昔布治疗的疾病是

A: 痛风

B: 骨关节炎

C: 胃溃疡

D: 支气管哮喘

答案：B

63.急性广泛性肺栓塞宜选用()

A: 维生素K

B: 叶酸

C: 尿激酶

D: 肝素

答案：C

64.华法林抗血栓形成的最大效应时间为

A: 3天

B: 5～7天

C: 6天

D: 2min

答案：C

65.长期大量与阿司匹林或其他NSAID合用时，可明显增加肾毒性的是

A: 塞来昔布

B：对乙酰氨基酚

C：阿司匹林

D：吲哚美辛

答案：B

66.神经毒性较严重的是

A：亚叶酸钙

B：奥沙利铂

C：卡铂

D：顺铂

答案：B

67.下述关于抗眼部细菌感染药物的描述中不正确的是()

A：对于衣原体感染的治疗主要是抗菌药物治疗

B：对淋球菌性结膜炎可采用全身及眼局部抗菌药物治疗

C：细菌性眼内炎可采用玻璃体腔内注射方式给予抗菌药物

D：全身给予抗菌药物是眼科细菌感染疾病的首选方法

答案：D

68.氟尿嘧啶的前体药物，对结肠和直肠癌疗效较高

A：甲氨蝶呤

B：卡莫氟

C：来曲唑

D：羟喜树碱

答案：B

69.治疗可能引起结晶尿的药物是()

A：氯霉素

B: 呋喃妥因
C: 左氧氟沙星
D: 磺胺嘧啶
答案：D

70.患者，男，41岁。有吸烟史，间断少量饮酒。因“嗳气、反酸、上腹部疼痛”就诊。经查，医师诊断为“反流性食管炎”此时应给予治疗的药物是
A: 昂丹司琼
B: 泮托拉唑
C: 东莨菪碱
D: 雷尼替丁
答案：D

71.患者，男，63岁，2型糖尿病病史20年，现服用二甲双胍0．5g，一日3次；阿卡波糖0．1g，一日3次；吡格列酮30mg，一日1次。既往高血压病史5年，冠心病病史5年，心功能Ⅰ级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。
A: 贝那普利
B: 罗格列酮
C: 阿卡波糖
D: 二甲双胍
答案：B

72.氨基酸分类正确的是
A: 肝病的氨基酸制剂:复方氨基酸注射液（9AA）、复方氨基酸注射液（15AA）
B: 肾病的氨基酸制剂:复方氨基酸注射液（9AA）、复方 α-酮酸片

C：肝病的氨基酸制剂:复方氨基酸注射液（20AA）、复方氨基酸注射液（9AA）

D：肾病的氨基酸制剂:复方氨基酸注射液（15AA）、复方 α-酮酸片

答案：B

73.丙磺舒可影响赛洛多辛的代谢，延长赛洛多辛在体内存在时间，这是因为丙磺舒抑制

A：血浆蛋白

B：UGT287

C：p一糖蛋白

D：CYP3A4

答案：B

74.（2015年真题）治疗侵袭性念珠菌病首选（）。

A：氟康唑

B：伏立康唑

C：灰黄霉素

D：氟胞嘧啶

答案：A

75.低度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选

A：奥美拉唑+口服地塞米松

B：5-HT3受体阻断剂+口服地塞米松+阿瑞吡坦

C：每日化疗前，应用5-HT3受体阻断剂或口服地塞米松

D：5-HT3受体阻断剂+口服地塞米松

答案：C

76.静脉注射可出现舌头麻木及口内特殊气味的是

A: 四环素

B: 左氧氟沙星

C: 氯霉素

D: 青霉素

答案：B

77.手术后出血和血友病辅助治疗宜选用

A: 氨甲环酸

B: 鱼精蛋白

C: 维生素K

D: 硫酸亚铁

答案：A

78.（2017年真题）眼部病毒感染宜选用（）

A: 托吡卡胺滴眼剂

B: 氯霉素滴眼剂

C: 碘苷滴眼剂

D: 拉坦前列素滴眼剂

答案：C

79.多柔比星与可能致肝功损害的药物配伍使用，可能()

A: 易产生沉淀

B: 导致坏死性结肠炎

C: 增加肝毒性

D: 增加心脏毒性

答案：C

80.与胰岛素合用治疗高钾血症的药物是()

A：二磷酸果糖

B：三磷酸腺苷

C：碳酸钙

D：葡萄糖

答案：D

81.（2017年真题）治疗青光眼宜选用（）

A：托吡卡胺滴眼剂

B：氯霉素滴眼剂

C：拉坦前列素滴眼剂

D：碘苷滴眼剂

答案：C

82.抗高血压药物不包括

A：血管收缩药

B：肾素抑制药

C：血管紧张素转化酶抑制药

D：α、β受体阻断药

答案：A

83.在常用剂量下，非那雄胺可使血清前列腺特异抗原(PSA)水平下降的幅度为

A：0.1

B：0.25

C：0.5

D：0.6

答案：C

84.仅用于绝经后妇女，不适用于男性患者的抗骨质疏松药物是

A：骨化三醇

B：雷洛昔芬

C：降钙素

D：阿仑膦酸钠

答案：B

85.治疗金黄色葡萄球菌引起的急慢性骨髓炎及关节感染的首选药是

A：头孢菌素类

B：大环内酯类

C：氨基糖苷类

D：林可霉素类

答案：D

86.哮喘急性发作首选的治疗药物是

A：磷酸二酯酶抑制剂

B：吸入性糖皮质激素

C：短效 β2 受体激动剂

D：白三烯受体阻断剂

答案：C

87.属于抗孕激素药，用于终止早孕的是

A：左炔诺孕酮

B：黄体酮

C：米非司酮

D：甲地孕酮

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/327111104046010024