



中华人民共和国国家标准

GB/T 33415—2026

代替 GB/T 33415—2016

针灸异常情况处理

Management for Acupuncture-Moxibustion adverse events

2026-03-31 发布

2026-10-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 处理方法 2

 4.1 晕针的处理方法 2

 4.2 滞针的处理方法 2

 4.3 弯针的处理方法 2

 4.4 折针的处理方法 2

 4.5 针刺性气胸的处理方法 2

 4.6 烫伤的处理方法 2

 4.7 局部化脓性感染的处理方法 3

 4.8 过敏的处理方法 3

 4.9 针刺致神经系统损伤的处理方法 3

 4.10 针刺致不当出血的处理方法 3

 4.11 针刺致脏器损伤的处理方法 3

附录 A（资料性） 针灸异常情况发生的原因 4

参考文献..... 5

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 33415—2016《针灸异常情况处理》，与 GB/T 33415—2016 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 删除了术语“后遗症”及其定义(见 2016 年版的 3.6)，更改了术语“弯针”的定义(见 3.4, 2016 年版的 3.4)，更改了术语“气胸”及其定义(见 3.6, 2016 年版的 3.7)；
- b) 删除了“不良现象”章节(见 2016 年版的第 4 章)，将其内容拆分修改后纳入术语和定义、处理方法(见 3.1 和 4.1, 2016 年版的 4.1、4.2、4.3)；
- c) 增加了弯针处理中安抚患者的操作步骤(见 4.3, 2016 年版的 5.3)；
- d) 删除了后遗症的处理方法(见 2016 年版的 5.5)；
- e) 更改了针刺性气胸处理的描述、明确立即出针，并增加安抚患者的操作步骤(见 4.5, 2016 年版的 5.6)；
- f) 更改了烫伤时出现水泡的处理方法，并增加严重烫伤处理流程(见 4.6, 2016 年版的 5.7)；
- g) 增加了局部化脓性感染的刺络拔罐及严重化脓的处理方法(见 4.7)；
- h) 增加了可能引发过敏的针灸疗法类型(见 4.8)；
- i) 更改“针刺致神经损伤”为“针刺致神经系统损伤”(见 4.9, 2016 年版的 5.10)，并增加周围神经损伤药物治疗(见 4.9.2)；
- j) 更改“针灸致血管损伤”为“针刺致不当出血”(见 4.10, 2016 年版的 5.11)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家中医药管理局提出。

本文件由全国针灸标准化技术委员会(SAC/TC 475)归口。

本文件起草单位：天津中医药大学。

本文件主要起草人：郭义、赵雪、陈泽林、郭扬、阳伟红、杨毅、赵天易、李岩琪、史丽萍、李丹、谢盈彧、陈波、何文菊、张玄、翟伟、任秋兰、谭亚芹、杨会杰、刘延祥、王娟、黑墨然、马慧娥、徐泽成。

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——2016 年首次发布为 GB/T 33415—2016；

——本次为第一次修订。

针灸异常情况处理

1 范围

本文件描述了针灸异常情况的处理方法。
本文件适用于针灸异常情况的处理操作。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

针灸异常情况 **Acupuncture-Moxibustion adverse event**

在针灸治疗过程中,由于医者操作不当或患者自身原因,发生的与治疗目的不相符合的情况。

注:常见的针灸异常情况包括:晕针、滞针、弯针、折针、气胸、烫伤、感染、过敏、针刺致神经及脏器损伤、针刺致不当出血等。引起针灸异常情况的原因见附录 A。

3.2

晕针 **fainting during acupuncture**

在针刺过程中或针刺结束后一段时间内,患者突然出现头晕目眩、面色苍白、心慌气短、倦怠乏力、恶心欲呕、身出冷汗,甚至晕厥的现象。

注:在其他针灸治疗中也会出现类似晕针的晕厥症状,如:晕罐、晕灸、晕刮等。

3.3

滞针 **needle stuck**

在行针或留针过程中,医者感觉针下滞涩,提插、捻转、出针均感困难,患者感觉疼痛的现象。

3.4

弯针 **needle bent**

在进针时或将针刺入腧穴后,针身在体内形成弯曲的现象。

3.5

折针 **needle broken**

在针刺过程中针身折断在肌体内的现象。

注:又称“断针”。

3.6

针刺性气胸 **acupuncture-induced pneumothorax**

针刺时,刺破胸膜壁层或脏层,导致气体进入胸膜腔,引起胸痛、呼吸困难等症状。