

福建省平和县历年《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题内部题库 (名师推荐)

第 I 部分 单选题 (100 题)

1. 饮酒可导致患者对该药的耐受性降低的是

- A: 苯妥英钠
- B: 利血平
- C: 维生素 B1、维生素 B2
- D: 卡马西平

答案: D

2. 冠状动脉粥样硬化心脏病患者，如没有用药禁忌证，欲服用阿司匹林作为一级预防，最佳剂量范围是：

- A: 150-300mg/d
- B: 75-150mg/d
- C: 25-77mg/d
- D: 25-70mg/d

答案: B

3. 可引起血小板减少症的抗肿瘤药物是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 阿洛司琼
- C: 利巴韦林
- D: 阿昔洛韦

答案: A

4. 他汀类药物引起的典型药源性疾病是

- A: 神经系统疾病
- B: 血液系统疾病
- C: 肌病
- D: 胃肠道疾病

答案：C

5. 急性冠状动脉综合征患者使用他汀类药物降低 LDL-C 的目标值为

- A: <70mg / dl
- B: <40mg / dl
- C: <60mg / dl
- D: <50mg / dl

答案：A

6. 患者，男，52 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：

- A: 左旋氨氯地平
- B: 氟伐他汀
- C: 雷米普利
- D: 比索洛尔

答案：B

7. III 期临床试验

- A: 以特殊人群为给药对象
- B: 以健康志愿者为给药对象
- C: 以目标适应证患者为给药对象
- D: 以患者为给药对象

答案：C

8. 可提示隐性黄疸或亚临床性黄疸的是

- A: $STB 17.1 \mu\text{mol} / \text{L} \sim 171 \mu\text{mol} / \text{L}$
- B: $STB > 342 \mu\text{mol} / \text{L}$
- C: $STB 17.1 \mu\text{mol} / \text{L} \sim 34.2 \mu\text{mol} / \text{L}$
- D: $STB 34.2 \mu\text{mol} / \text{L} \sim 171 \mu\text{mol} / \text{L}$

答案：C

9. (2019 年真题) 下列分析方法中，不属于药物经济学评价方法的是

- A: 成本-效益分析法
- B: 成本-效用分析法
- C: 最小成本分析法
- D: 成本-效应分析法

答案：D

10. ADR 与用药时间相关性不密切，反应表现与已知该药 ADR 不相吻合，原患疾病发展同样可能有类似的临床表现：该 ADR 因果关系可评价为

- A: 待评价
- B: 很可能
- C: 可能无关
- D: 可能

答案：C

11. 急诊处方一般不超过几日

- A: 7 日常用量
- B: 3 日常用量
- C: 1 日常用量

D: 15 日常用量

答案：B

12. 变异型心绞痛发作应首选的药物是

A: 单硝酸异山梨酯

B: 氨氯地平

C: 美托洛尔

D: 硝酸甘油

答案：B

13. 计算儿童用药剂量的方法中比较合理的是

A: 根据儿童年龄计算

B: 根据儿童病情计算

C: 根据体表面积计算

D: 根据儿童体重计算

答案：C

14. 首选用于治疗慢性荨麻疹的药物是

A: 异丙嗪片

B: 醋酸氟轻松软膏

C: 西替利嗪片

D: 氯苯那敏胶囊

答案：C

15. 以下"准备调配处方标签"事宜中，最重要的是

A: 用法用量规范

B: 不能只依赖药品说明书

C: 依据患者情况加贴个体化用药方法

D: 语言通俗易懂

答案：C

16. 患者男,70 岁,典型的“面具脸”“慌张步态”表现,临床诊断为帕金森病患者同时患有前列腺增生不宜选用的药物是()

A: 甲基多巴

B: 卡比多巴

C: 苯海索

D: 普拉克索

答案：C

17. 皮肤接触腐蚀性毒物,须用中和液或解毒液冲洗,且冲洗的时间要达

A: 20~30min

B: 10~20min

C: 5~10min

D: 15~30min

答案：D

18. 进行药学信息的收集、保管、整理、评价、传递、提供和利用,是归属于查看材料

A: 处方审核工作

B: 参与健康教育工作

C: 处方点评工作

D: 药学信息服务工作

答案：D

19. 以下所列药物中,一般不会导致蛋白尿的是

- A: 多黏菌素
- B: 庆大霉素
- C: 青霉素
- D: 甲氨蝶呤

答案：C

20. 癫痫全面性发作首选

- A: 丙戊酸钠
- B: 布桂嗪
- C: 佐匹克隆
- D: 多奈哌齐

答案：A

21. 某女性，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发喘憋。体检：端坐体位，BP190/110mmHg，R30 次/分，HR108 次/分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

- A: 急性左心衰竭？
- B: 支气管哮喘？
- C: 肺动脉栓塞？
- D: 肺结核？

答案：A

22. 最容易受光线影响而变质的药品是

- A: 胰岛素制剂
- B: 注射用抗生素
- C: 氨基酸注射剂
- D: 抗生素胶囊剂

答案：C

23. (2017 年真题) 半衰期 12h 的药物通常选择 ()

- A: 静脉滴注给药
- B: 每个半衰期给药 1 次
- C: 2~3 个半衰期给药 1 次
- D: 每日给药 1 次

答案: B

24. 适用于年轻、震颤突出的患者

- A: 司来吉兰
- B: 苯海索
- C: 左旋多巴
- D: 恩托卡朋

答案: B

25. 饮食对粪外观的影响, 食西红柿、西瓜

- A: 暗绿色
- B: 红色
- C: 黑褐色
- D: 酱色

答案: B

26. 下列用于治疗咳嗽的药物中, 属于祛痰剂的是

- A: 氨溴索
- B: 羧甲司坦
- C: 可待因
- D: 右美沙芬

答案: A

27. 氯霉素的禁用范围是

- A: 1 岁以下婴儿
- B: 婴幼儿
- C: 新生儿
- D: 3 岁以下幼儿

答案：C

28. 另有草药专辑、营养品专辑、眼药专辑、非处方药和食品补充剂专辑的是

- A: 《中国国家处方集（2010 年版）》
- B: 《医师案头参考》
- C: 《国家基本药物处方集（2012 年版）》
- D: 《英国国家处方集》

答案：B

29. 患者，男，69 岁，BMI27.8kg/m²，既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药”。

- A: 共济失调
- B: 口干
- C: 便秘
- D: 肾损害

答案：D

30. 对合并糖尿病及肾病的高血压患者的降压目标是

- A: <140 / 85mmHg
- B: <160 / 90mmHg

C: <150 / 90mmHg

D: <130 / 80mmHg

答案：D

31. 下列关于抗抑郁药的合理应用与药学监护的说法，错误的是

A: 当单药治疗无效时，可考虑联合使用两种作用机制不同的抗抑郁药

B: 抗抑郁药起效较快，使用 1 周后可判定疗效

C: 应尽可能单一用药，足量、足疗程治疗

D: 剂量递增，尽可能采用最小有效剂量，使不良反应减至最小

答案：B

32. 与二、三级信息源相比一级信息源的特点是

A: 内容更新

B: 对一个具体的问题提供的信息全面详实（简明扼要）

C: 内容广泛，使用方便

D: 对于查询的药物信息可以提供丰富的内容供读者参考

答案：A

33. 患者，男性，58 岁，患有膀胱肿瘤，经常出现不能控制的尿频、尿急、夜尿增多。确诊为急迫性尿失禁，给予托特罗定治疗。药师应告知患者药物的主要不良反应是

A: 口干、便秘、尿潴留

B: 直立性低血压

C: 鼻咽炎和尿路感染

D: 卧位和坐位时高血压

答案：A

34. 口服氯化铵或给予维生素 C，可解救

- A: 丙米嗪中毒
- B: 氰化氢中毒
- C: 氯丙嗪中毒
- D: 苯丙胺中毒

答案：D

35. 正常情况下，人血白细胞群体中所占比例最多的分类细胞是

- A: 单核细胞
- B: 中性粒细胞
- C: 嗜碱性粒细胞
- D: 淋巴细胞

答案：B

36. 由国家药典委员会组织编写的是

- A: 《中国药典临床用药须知》
- B: 《医师案头参考》
- C: 《中国国家处方集》
- D: 《国家基本药物处方集》

答案：A

37. 清晨尿液酸碱度的参考范围为

- A: pH4.5~5.5
- B: pH4.5~6.5
- C: pH4.5~8.0
- D: pH5.5~6.5

答案：D

38. 患者，男，65 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次，阿卡波糖 0.1g. 一日 3 次。罗格列酮 4mg，一日一次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级，轻度肾功能不全，长期服用贝那普利、阿司匹林。

- A: 阿卡波糖
- B: 二甲双胍
- C: 罗格列酮
- D: 阿司匹林

答案：C

39. 成年男性的血尿酸正常参考范围是

- A: 120~160 $\mu\text{mol} / \text{L}$
- B: 155~357 $\mu\text{mol} / \text{L}$
- C: 550~650 $\mu\text{mol} / \text{L}$
- D: 208~428 $\mu\text{mol} / \text{L}$

答案：D

40. 耳、肾毒性大，肾功能不全患者不宜使用的药物是

- A: 阿奇霉素
- B: 头孢哌酮
- C: 莫西沙星
- D: 阿米卡星

答案：D

41. 毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者，必须迅速作出准确判断，及时采取有效的救治措施，以挽救生命、减轻损害程度。

。

- A: 二巯丙醇"驱汞"治疗
- B: 弱碱中和强酸
- C: 依地酸钙钠解救铅中毒
- D: 药用炭吸附

答案：D

42. 抗利尿药

- A: 胃黏膜保护剂
- B: 硝酸甘油
- C: 甘草合剂
- D: 去氨加压素

答案：D

43. 治疗水疱型足癣宜选用的药物是

- A: 复方苯甲酸酊
- B: 维 A 酸乳膏
- C: 氢化可的松软膏
- D: 阿昔洛韦软膏

答案：A

44. 患者，男，48 岁，因“肺结核”入院治疗。医师处方异烟肼片 0.3gqd、利福平胶囊 0.6gqd、乙胺丁醇片 1.0gqd、吡嗪酰胺片 1.5gqd。药师对患者的正确用药指导是

- A: 患者治疗期间应避免服用维生素 B6
- B: 利福平可加快异烟肼的代谢，增强肝毒性，须定期监测肝功能
- C: 异烟肼加快乙胺丁醇代谢，增加球后视神经炎风险，须定期评估视神经功能
- D: 利福平可减慢异烟肼的代谢，增强肝毒性，须定期监测肝功能

答案：B

45. 患者,男,71 岁,因高血压、心力衰竭给予氢氯噻嗪、地高辛等治疗,产生的药物相互作用属于()

- A: 增加靶器官药物浓度,药品不良反应减少
- B: 敏感化作用,药品不良反应增加
- C: 降低抗药性,疗效增加
- D: 拮抗作用,药品不良反应增加

答案：B

46. 1 日 1 次用药、初治短程化疗方案是

- A: 1HS/11H2S2
- B: 2S(E)HR2/4H3R3
- C: 2HSP(E)/10HP(E)
- D: 2S(E)HR2/4HR

答案：D

47. 他汀类药物引起的典型药源性疾病是

- A: 神经系统疾病
- B: 胃肠道反应
- C: 肌病
- D: 血液系统疾病

答案：C

48. 对于尿液的描述正确的是

- A: 尿量的多少主要取决于肾小球滤过率和肾小管的重吸收
- B: 正常人的尿量变化幅度不大
- C: 正常人的新鲜尿液呈弱碱性

D: 正常人每日排出尿液 1~2L，其中 50% 为水分

答案：A

49. 脂溶性中等，作用持续 3~6h 的是

A: 苯巴比妥

B: 巴比妥

C: 戊巴比妥

D: 硫喷妥

答案：C

50. 流行性结膜炎可选用

A: 2% 色甘酸钠滴眼剂

B: 0.1% 羟苄唑滴眼剂

C: 四环素眼膏

D: 0.1% 碘苷滴眼剂

答案：D

51. 患者，男，70 岁，两周前因缺血性脑卒中入院治疗，经积极治疗，病情显著缓解后出院，目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是

A: 利伐沙班

B: 肝素

C: 氯吡格雷

D: 阿司匹林

答案：D

52. 中成药舒筋活络酒具有祛风除湿、活血通络、养阴生津的功效，与其合用可加强对中枢神经系统抑制作用的药物是

- A: 地高辛
- B: 甲氧氯普胺
- C: 复方利血平
- D: 氯苯那敏

答案：D

53. 粪外观所对应的疾病,阻塞性黄疸

- A: 柏油便, 黑色有光泽
- B: 暗红果酱色
- C: 白陶土便
- D: 米泔水样

答案：C

54. 患者, 女, 55 岁, 因"反复发作胸骨后疼痛 2 年, 伴反酸, 胃灼热, 间断积食"而就诊。食管测压提示食管下括约肌(LES)压力<6mmHg, 结合胃镜检查结果, 临床诊断为胃食管反流病, 医师处方: 奥美拉唑肠溶片 20mgbid 强化抑酸治疗。

- A: 控制体重
- B: 避免高脂饮食
- C: 戒烟酒
- D: 餐中多饮水

答案：D

55. 服用头孢曲松、甲硝唑、氯丙嗪等应该禁用的是

- A: 咖啡
- B: 浓茶
- C: 烟
- D: 酒

答案：D

56. 儿童使用后可造成软骨病，18 岁以下儿童禁止使用的药物是

- A: 阿奇霉素
- B: 阿米卡星
- C: 莫西沙星
- D: 头孢哌酮

答案：C

57. 影响胎儿甲状腺功能，导致死胎的药物是

- A: 维生素 D
- B: 维生素 A
- C: 氯霉素
- D: 丙硫氧嘧啶

答案：D

58. 治疗时需长期口服维生素 D

- A: 抗癫痫药所致的骨质疏松
- B: 老年性骨质疏松
- C: 原发性骨质疏松
- D: 妇女绝经后骨质疏松

答案：A

59. 下列哪种药物不会引起丙氨酸氨基转移酶 (ALT、GPT) 升高 ()。

- A: 硝苯地平
- B: 氟康唑
- C: 克林霉素
- D: 阿昔洛韦

答案：A

60. 某男性，27 岁，间断上腹痛 3 年，表现为餐后痛，约 1~2h 后缓解，以冬春季多发。

- A: 法莫替丁
- B: 氢氧化铝
- C: 氯化钾片
- D: 兰索拉唑

答案：C

61. 需 2~10℃冷处保存，并避免冻结的药品

- A: 低精蛋白胰岛素注射剂
- B: 胰酶片
- C: 利福平片
- D: 脂肪乳

答案：A

62. 过敏性皮炎常表现为()

- A: 嗜酸性粒细胞增多
- B: 血红蛋白减少
- C: 红细胞增多
- D: 中性粒细胞增多

答案：A

63. 静滴 50%葡萄糖注射液 100ml+胰岛素 20U，用于

- A: 解救丙咪嗪中毒
- B: 解救乙醇中毒
- C: 解救硝西泮中毒

D: 解救可待因中毒

答案: B

64. 患者，女，1 岁 6 个月，因感冒发热到医院就诊，医生处方对乙酰氨基酚滴剂，药师误发成对乙酰氨基酚片，患者家属拿到药品后不知如何使用，故询问药师，此时药师发现发错了药。针对该类型差错，有效的防范措施是()

A: 采用两种方式核对患者身份

B: 使用药片通用名

C: 双人核对

D: 采用电子处方系统

答案: C

65. 有机氟杀虫农药中毒的特效解毒剂是

A: 毒扁豆碱

B: 乙酰胺

C: 维生素 K1

D: 碘解磷定

答案: B

66. 患者，男，26 岁，自述头痛、咽喉痛、全身乏力、畏寒，偶尔咳嗽，并有鼻塞、流鼻涕、打喷嚏等症状。经检查后，测量口腔体温 37.8℃，脉搏 72 次/分，白细胞计数 $3.7 \times 10^9/L$ 。医生为患者开具的处方如下：

A: 氯苯那敏

B: 伪麻黄碱

C: 右美沙芬

D: 对乙酰氨基酚

答案：D

67. 尿隐血检查阳性的病人中，最可能导致尿血红蛋白阳性的药物是

- A: 酒精中毒
- B: 阿司匹林
- C: 海洛因
- D: 巴比妥类

答案：B

68. 与两性霉素 B 配伍可以析出沉淀的溶媒是

- A: 50%葡萄糖注射液
- B: 0.9%氯化钠注射液
- C: 5%葡萄糖注射液
- D: 复方氯化钠注射液

答案：B

69. 烫伤后药物选择不宜选用

- A: 京万红软膏
- B: 润湿烧伤膏
- C: 破伤风
- D: 甲紫

答案：D

70. 需密闭，控制温度，保存中不能受潮的药品

- A: 低精蛋白胰岛素注射剂
- B: 脂肪乳
- C: 胰酶片
- D: 利福平片

答案：C

71. 妊娠早期妇女使用可能引起胎儿肢体、耳、内脏畸形的药物是

- A: 辛伐他汀
- B: 沙利度胺
- C: 甲氨蝶呤
- D: 苯妥英钠

答案：B

72. ADR 报表内容填写不齐全、等待补充，或因果关系难以定论。缺乏文献资料佐证；其 ADR 因果关系可评价为

- A: 很可能
- B: 可能无关
- C: 可能
- D: 待评价

答案：D

73. 重症、急救治疗时，要求药物迅速起效，最不适宜选用的给药途径是

- A: 静脉滴注
- B: 腔道给药
- C: 吸入给药
- D: 喷雾给药

答案：B

74. 嗜碱性粒细胞正常值参考范围是

- A: 0.03~0.08
- B: 0.20~0.40

C: 0.01~0.05

D: 0~0.01

答案: D

75. 不宜与中成药虎骨酒、人参酒、舒筋活络酒同服的药品是

A: 可待因

B: 氨茶碱

C: 氯苯那敏

D: 地高辛

答案: C

76. 欲了解更多的药品不良反应信息，可优先查阅的文献是

A: 《新编药物学》

B: 《梅氏药物副作用》

C: 《中华人民共和国药典》

D: 《中国国家处方集》

答案: B

77. 成人白细胞计数正常参考区间是

A: $(100 \sim 300) \times 10^9 / L$

B: $(11.0 \sim 12.0) \times 10^9 / L$

C: $(200 \sim 300) \times 10^9 / L$

D: $(4.0 \sim 10.0) \times 10^9 / L$

答案: D

78. 根据药物对胎儿的危害，美国 FDA 将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别属于妊娠毒性 B 级的药物是

A: 沙利度胺

- B: 万古霉素
- C: 葡萄糖
- D: 阿莫西林

答案：D

79. 关于抗抑郁药的合理使用，下列说法错误的为（）

- A: 在单胺氧化酶抑制剂停用的 14 天内不能使用 SSRIs 等抗抑郁药物
- B: 多数需要至少 2 周才会起效
- C: 不能突然停止使用，以避免出现症状反弹和戒断综合征
- D: 如单药治疗无效时，考虑两种作用机制不同的抗抑郁药联合使用

答案：D

80. 氨苄西林可能引起

- A: 尿沉渣结晶
- B: 尿肌酐
- C: 尿血红蛋白
- D: 尿酮体

答案：A

81. 以下血浆中脂质水平检查结果中，不能判断为高脂血症的是

- A: 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)高于同年龄正常值
- B: 三酰甘油(TG)高于同年龄正常值
- C: 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)高于同年龄正常值
- D: 总胆固醇(TC)高于同年龄正常值

答案：A

82. 1 天给药 1 次；需要立即达到治疗浓度，可首剂加倍针对

- A: 半衰期小于 30 分钟

- B: 半衰期大于 30 小时
- C: 半衰期大于 24 小时
- D: 半衰期 8~24 小时

答案：C

83. (联合用药) 普通感冒患者应用抗病毒药+抗生素属于

- A: 超剂量用药
- B: 过度治疗用药
- C: 非适应证用药
- D: 超适应证用药

答案：C

84. 有关尿酮体和尿肌酐的叙述正确的是

- A: 尿酮体包括乙酰乙酸、 β -丁酸、丙酮，是体内糖氧化的中间产物
- B: 酮体在肾脏产生，在血液中循环
- C: 如酮体产生的速度小于组织的利用速度，则血液中的酮体增加出现酮血症
- D: 尿肌酐是体内肌酸代谢的最终产物，是脱水缩合物

答案：D

85. 注射氟马西尼，用于

- A: 解救硝西泮中毒
- B: 解救丙咪嗪中毒
- C: 解救乙醇中毒
- D: 解救可待因中毒

答案：A

86. 患者，女，62 岁，患有 2 型糖尿病，平时未规律监测血糖。今日来院复诊，欲了解近 3 个月内的血糖总体控制情况，应检测的指标是

- A: 血红蛋白
- B: 餐后 2 小时血糖
- C: 空腹血糖
- D: 糖化血红蛋白

答案：D

87. 百日咳的临床表现是

- A: 有慢性咳嗽，伴有大量脓痰及反复咯血
- B: 多发生于儿童，为阵发性剧烈痉挛性咳嗽伴有鸡鸣样吸气吼声，病程可达 2~3 个月
- C: 多为轻咳或干咳，偶见少量薄白痰，并伴有背痛、发热、头痛、咽喉痛
- D: 可有低热或高热，清瘦、轻咳、盗汗，有黄绿色痰

答案：B

88. 妊娠期应用可引起胎儿性发育异常的药物是

- A: 雌孕激素、雄激素
- B: 阿司匹林
- C: 沙利度胺
- D: 叶酸拮抗剂

答案：A

89. 患者，女性，32 岁，咳嗽、有脓性痰，痰液色黄或黄白相间，右侧胸痛，吸气时明显。体检：体型胖，神志清，急性病容，无口唇发绀，呼吸急促，体温 39.3℃，心率 100 次/分，肺部可闻及湿性啰音，WBC $14 \times 10^9/L$ ，对青霉素类药物过敏。临床诊断为社区获得性肺炎。

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/328003100000007024>