

2024 年河北省双桥区《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题真题及答案【考点梳理】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌 II 级，同侧腋下淋巴结 1 / 18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+). 肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。

- A: 严重心脏病
- B: 骨髓功能抑制
- C: 妊娠及哺乳期妇女
- D: 腰椎间盘突出

答案：D

2. 非选择性 NSAID 可引起胃黏膜损伤的原因是

- A: 抑制 AC
- B: 抑制 COX-2
- C: 阻滞 ARB
- D: 抑制 COX-1

答案：D

3. β -溶血性链球菌产生的一种蛋白质，现已有基因重组产品的是()

- A: 重组人促红素
- B: 叶酸
- C: 链激酶

D: 尿酸酶

答案：C

4. 只有肾脏为其主要的排泄脏器 β 受体阻断剂是

A: 比索洛尔

B: 美托洛尔

C: 普萘洛尔

D: 阿替洛尔

答案：D

5. (2015 年真题) 属于 A 型单胺氧化酶抑制剂的是 ()。

A: 氟西汀

B: 阿米替林

C: 文拉法辛

D: 吗氯贝胺

答案：D

6. 服药后尿、唾液、汗液、痰液、泪液等排泄物均可显橘红色的药物是 ()

A: 乙胺丁醇

B: 吡嗪酰胺

C: 链霉素

D: 利福平

答案：D

7. 碳酸氢钠可用于

A: 呼吸性酸中毒

B: 呼吸性碱中毒

C: 代谢性碱中毒

D: 代谢性酸中毒

答案：D

8. 对 α 受体和 β 受体均有强大的激动作用的是

A: 可乐定

B: 去甲肾上腺素

C: 多巴胺

D: 肾上腺素

答案：D

9. 可用于防治夜盲症的维生素是()

A: 维生素 B

B: 维生素 K

C: 叶酸

D: 维生素 A

答案：D

10. (2019 年真题) 若无禁忌，冠心病或缺血性脑卒中患者均应长期使用的药物是()

A: 依诺肝素

B: 阿司匹林

C: 肝素

D: 氯吡格雷

答案：B

11. 以下属于胰高糖素样肽-1 受体激动剂的是

A: 二甲双胍

- B: 瑞格列奈
- C: 利拉鲁肽
- D: 吡格列酮

答案：C

12. 患者，女，60 岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊、塞来昔布胶囊、碳酸氢钠治疗。

- A: 长期口服给药
- B: 注射与口服并用
- C: 注射给药
- D: 短期口服给药

答案：D

13. 不属于氟喹诺酮类的药物是

- A: 小檗碱
- B: 莫西沙星
- C: 环丙沙星
- D: 依诺沙星

答案：A

14. （2019 年真题）在体内可与含羟基或羧基的毒物结合，形成低毒或无毒结合物排出体外，起到解毒和保护肝脏的作用，用于急、慢性肝炎治疗的药物是（）

- A: 异甘草酸镁
- B: 硫普罗宁
- C: 葡醛内酯
- D: 腺苷蛋氨酸

答案：C

15. 治疗慢性心力衰竭，ACEI 和()联合有协同作用。

- A: β 受体阻断剂
- B: 留钾利尿剂
- C: 噻嗪类利尿剂
- D: 人促红素

答案：A

16. 适用于各种类型疟疾的症状控制，尤其是对抗氯喹恶性及凶险型疟疾有较好疗效的药物是

- A: 双氢青蒿素
- B: 奎宁
- C: 乙胺嘧啶
- D: 蒿甲醚

答案：A

17. (2016 年真题) 鼻减充血药所致的典型不良反应是

- A: 心率减慢
- B: 血管舒张
- C: 共济失调
- D: 血压升高

答案：D

18. 神经毒性是剂量依赖性的是()

- A: 顺铂
- B: 亚叶酸钙
- C: 卡铂

D: 奥沙利铂

答案：D

19. 属于血管紧张素 II 受体阻断剂的药品是()。

A: 依那普利

B: 坦洛新(坦索罗辛)

C: 哌唑嗪

D: 替米沙坦

答案：D

20. 抢救糖尿病酮症酸中毒和高血糖高渗性昏迷患者宜选用

A: 普通胰岛素

B: 二甲双胍

C: 低精蛋白锌胰岛素

D: 格列喹酮

答案：A

21. 一般剂量长期疗法

A: 变态反应性疾病

B: 中毒性感染和休克

C: 顽固性支气管哮喘

D: 湿疹

答案：C

22. (2018 年真题) 配制静脉输液时;应先用灭菌注射用水溶解,然后用 5%葡萄糖注射液稀释,不可用氯化钠注射液稀释的抗真菌药是()

A: 两性霉素 B

B: 氟康唑

C: 伏立康唑

D: 卡泊芬净

答案: A

23. 一对年轻夫妇计划出国旅游，出发前，准备选购以下治疗腹泻的药物备用，包括蒙脱石、口服补液盐、双歧杆菌三联活菌、洛哌丁胺，小檗碱。

A: 洛哌丁胺

B: 双歧杆菌三联活菌

C: 口服补液盐

D: 蒙脱石

答案: A

24. 磺酰脲类药物最常见的不良反应

A: 共济失调

B: 腹痛、腹泻

C: 眩晕嗜睡

D: 低血糖

答案: D

25. 可使双膦酸盐的吸收下降，服用双膦酸盐后 2 小时内避免食用的是

A: 沙利度胺

B: 抗血管生成药

C: 高钙食品

D: 萘普生

答案: C

26. 连续使用应间隔 4h 以上

- A: 酚甘油滴耳液
- B: 麻黄碱
- C: 赛洛唑啉
- D: 羟甲唑啉

答案：D

27. 属于 CYP3A4 底物 / 抑制剂，可能会增加他汀类药物肌肉不良反应危险性的是

- A: 烟酸
- B: 红霉素
- C: 地高辛
- D: 利福平

答案：B

28. 下列说法中错误的是

- A: 他莫昔芬是目前临床上最常用的乳腺癌内分泌治疗药
- B: 芳香氨酶抑制剂可用于绝经前乳腺癌患者
- C: ER 阳性者，绝经前、后均可使用他莫昔芬
- D: 芳香氨酶抑制剂主要包括来曲唑和阿那曲唑

答案：B

29. 属于阿片受体激动剂，晚期癌痛不宜长期使用的药物是

- A: 吗啡
- B: 布洛芬
- C: 秋水仙碱
- D: 哌替啶

答案：D

30. (2018 年真题) 属于贝丁酸类的调节血脂药是 ()

- A: 烟酸
- B: 非诺贝特
- C: 依折麦布
- D: 辛伐他汀

答案: B

31. 下列降压药中属于血管紧张素 II 受体阻断剂的是

- A: 坎地沙坦
- B: 阿利克仑
- C: 地尔硫 (卅卓)
- D: 左旋氨氯地平

答案: A

32. (2019 年真题) 可用于预防风湿热复发的药物是 ()

- A: 甲硝唑
- B: 呋喃妥因
- C: 庆大霉素
- D: 苄星青霉素

答案: D

33. 治疗慢性心力衰竭，ACEI 和其联合有协同作用的是 ()

- A: 噻嗪类利尿药
- B: β 受体阻断药
- C: 人促红素
- D: 留钾利尿药

答案: B

34. 关于丙硫氧嘧啶的描述，正确的是

- A: 可抑制外周组织的 T
- B: 作用较甲巯咪唑弱
- C: 使血循环中甲状腺刺激性免疫球蛋白升高
- D: 长期应用反馈抑制 TSH 分泌

答案：B

35. 银杏叶提取物用于

- A: 慢性脑功能不全
- B: 早期帕金森病
- C: 神经源性尿崩症
- D: 特发性震颤

答案：A

36. 华法林起效缓慢，深静脉栓塞治疗的初期，需同时联合使用的是()
。

- A: 维生素 B
- B: 维生素 B
- C: 维生素 B
- D: 依诺肝素

答案：D

37. （2019 年真题）伴有炎性肠病、溃疡、胃肠道梗阻和腹部手术史的糖尿病患者，不宜使用的降糖药物是（）

- A: 二甲双胍
- B: 吡格列酮
- C: 格列美脲
- D: 阿卡波糖

答案：D

38. 应用强心苷期间或停用后 7 日内不宜使用的药物是

- A: 氯化钾
- B: 氯化钙
- C: 枸橼酸钾
- D: 氯化钠

答案：B

39. 长期大量使用林旦后可导致下列哪种不良反应()

- A: 眼部水肿
- B: 中枢神经系统毒性
- C: 肝脏损害
- D: 白细胞减少

答案：B

40. 对择期手术者，且无需抗血小板治疗者，应于术前多久考虑停用抗血小板药、抗凝血药

- A: 3 天
- B: 5 天
- C: 1 天
- D: 1 周

答案：D

41. 只能用于绝经后乳腺癌患者的内分泌治疗药是

- A: 阿那曲唑
- B: 他莫昔芬
- C: 氟他胺

D: 曲妥珠单抗

答案：A

42. 雌激素替代疗法应在绝经后几年之内开始

A: 6

B: 8

C: 4

D: 2

答案：A

43. 为克服服药初期的类早孕反应，双炔失碳酯肠溶片成分中增加了

A: 炔雌醇

B: 维生素 B6

C: 去氧孕烯

D: 甲羟孕酮和炔雌醇

答案：B

44. 临床治疗铜绿假单胞菌感染可选用的抗生素是()

A: 氨苄西林

B: 阿莫西林

C: 哌拉西林

D: 苯唑西林

答案：C

45. 患者，女，70 岁，BMI $21\text{kg}/\text{m}^2$ ，45 岁时绝经，10 年前开始，经常出现腰背部疼痛，活动后加重，但未就诊，平日外出活动较少，近 5 年身高降低，驼背明显。10 天前患者不慎摔倒，上肢活动受限、疼痛，就诊后检查结果：血钙 $1.97\text{mmol}/\text{L}$ ，血磷 $1.7\text{mmol}/\text{L}$ ，右上肢 X 光检查提示：右桡骨远端骨折。骨密度检查结果：T 值（-2.9）。

A：秋水仙碱

B：对乙酰氨基酚

C：地塞米松

D：双醋瑞因

答案：B

46. 急性心肌梗死引起的室性心律失常的首选药是()

A：普萘洛尔

B：奎尼丁

C：胺碘酮

D：利多卡因

答案：D

47. 维生素 B1 缺乏时出现

A：夜盲症

B：成人佝偻病

C：脚气病

D：糙皮病

答案：C

48. 患者。男，42 岁，胃癌，病理为胃窦低分化腺癌，根治术后，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇，顺铂+氟尿嘧啶。

A：10%~30%

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 大于 90%

C: 1

D: 30%~90%

答案：B

49. 伐昔洛韦口服后在肝脏水解为

- A: 喷昔洛韦
- B: 更昔洛韦
- C: 西多福韦
- D: 阿昔洛韦

答案：D

50. 属于抗菌增效剂的是

- A: 甲氧苄啶
- B: 磺胺嘧啶
- C: 呋喃唑酮
- D: 氧氟沙星

答案：A

51. 葡醛内酯属于

- A: 促胃肠动力药
- B: 抑酸剂
- C: 肝胆疾病辅助用药
- D: 胃黏膜保护剂

答案：C

52. 阿米卡星与万古霉素合用()

- A: 不良反应叠加
- B: 后者血药浓度升高，不良反应增加
- C: 后者血药浓度下降，药效降低
- D: 药理作用拮抗

答案：A

53. 主要通过选择性抑制 5-HT 再摄取而引起抗抑郁作用的药物是（）

- A: 度洛西汀
- B: 马普替林
- C: 吗氯贝胺
- D: 帕罗西汀

答案：D

54. 不属于减鼻充血药的是（）

- A: 麻黄碱
- B: 伪麻黄碱
- C: 羟甲唑啉
- D: 色甘酸钠

答案：D

55. 巨幼细胞贫血可选用

- A: 肝素
- B: 维生素 K1
- C: 维生素 B12
- D: 香豆素类

答案：C

56. 糖皮质激素的禁忌证不包括（）

- A: 创伤或手术恢复期
- B: 角膜炎、虹膜炎
- C: 妊娠初期和产褥期
- D: 严重的高血压、糖尿病

答案：B

57. 对于万古霉素，描述错误的是()

- A: 对革兰阴性杆菌和真菌有一定作用
- B: 口服给药可用于难辨梭杆菌性假膜性肠炎
- C: 可用于耐青霉素的金黄色葡萄球菌引起的严重感染
- D: 作用机制是阻碍细菌细胞壁的合成

答案：A

58. 属于二氢叶酸还原酶抑制剂的是

- A: 吉西他滨
- B: 甲氨蝶呤
- C: 长春瑞滨
- D: 巯嘌呤

答案：B

59. (2020 年真题) 急性白血病患者接受化疗期间出现了手指、足趾麻木、腱反射迟钝等不良反应，最有可能导致上述症状的药物是

- A: 环磷酰胺
- B: 曲妥珠单抗
- C: 长春新碱
- D: 甲氨蝶呤

答案：C

60. 患者，女，67 岁，入院后行左侧髋关节置换术，术前 12 小时皮下注射低分子肝素预防深静脉血栓。术后患者情况稳定，继续使用低分子肝素，住院第 7 天出院。

- A: 通过增强抗凝血酶川（AT-III）的活性，抑制凝血因子 IIa 和 Xa 发挥抗凝作用
- B: 体外试验具有直接的抗凝活性，可抑制体外凝血过程
- C: 能刺激脂蛋白脂肪酶的释放，加速血液循环中脂蛋白的清除
- D: 能使凝血级联的丝氨酸蛋白酶失活

答案：A

61. 关于氢氧化镁的叙述正确的是

- A: 中和胃酸作用强而迅速
- B: 口服易吸收
- C: 不影响排便
- D: 对溃疡面有保护作用

答案：A

62. 头孢拉定

- A: 肾毒性较大
- B: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染
- C: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染
- D: 口服，肌肉注射或静脉注射均可用于全身感染

答案：A

63. 患者，男性，26 岁，因“咳嗽、咳痰伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”，入院后使用莫西沙星和氨溴索治疗。

- A: 阿米卡星
- B: 头孢哌酮
- C: 替考拉宁

D: 头孢曲松

答案：C

64. 替罗非班的作用机制是

A: 阻断血小板糖蛋白 IIb/IIIa 受体

B: 抑制凝血酶

C: 拮抗维生素 K

D: 抑制凝血因子 X

答案：A

65. H₁ 受体拮抗剂的各项叙述，错误的是

A: 主要用于治疗变态反应性疾病

B: 可用于治疗妊娠呕吐

C: 可用于治疗变态反应性失眠

D: 主要代表药有法莫替丁

答案：D

66. 单独应用时止吐作用相对较弱，主要作为辅助药物，用于减轻地塞米松所致焦虑和甲氧氯普胺所致静坐不能，也可用于减少预期性的化疗所致恶心呕吐的是

A: 劳拉西泮

B: 帕洛诺司琼

C: 甲氧氯普胺

D: 氯丙嗪

答案：A

67. 低致吐性化疗药物所引起的恶心呕吐，宜选用的止吐治疗方案是()

- A: 化疗前联合使用昂丹司琼和地塞米松,化疗结束后给予 2 天的地塞米松或昂丹司琼
- B: 化疗前联合使用昂丹司琼、地塞米松和阿瑞吡坦,化疗结束后给予 2 天的阿瑞吡坦和 2~3 天的地塞米松
- C: 化疗前使用昂丹司琼,化疗后不需要继续使用止吐药
- D: 化疗前后联合使用地塞米松和甲氧氯普胺

答案: C

68. 使用羟甲唑啉滴鼻液期间,可能发生的不良反应是

- A: 鼻黏膜充血
- B: 心率加快
- C: 一过性针刺感
- D: 流泪

答案: B

69. 仅在体内有抗凝血作用的药物是

- A: 尿激酶
- B: 肝素
- C: 华法林
- D: 噻氯匹定

答案: C

70. 属于长效 β

- A: 布地奈德
- B: 沙美特罗
- C: 沙丁胺醇
- D: 多索茶碱

答案: B

71. 属于抗反转录病毒药物的是

- A: 奥司他韦
- B: 恩替卡韦
- C: 司他夫定
- D: 阿昔洛韦

答案：C

72. 镇痛药合理用药原则不包括

- A: 按阶梯给药，对于轻度疼痛患者首选弱阿片类药物
- B: 用药剂量个体化，根据患者需要由小剂量开始，逐渐加大剂量
- C: 按时给药，而不是按需给药
- D: 尽可能选择口服给药

答案：A

73. 使用呋塞米时，较少发生耳毒性的情况是

- A: 频繁静脉输注给药
- B: 口服方式给药
- C: 同时使用氨基糖苷类药物
- D: 快速静脉输注给药

答案：B

74. 可能导致牙龈增生的药物是

- A: 普伐他汀
- B: 拉西地平
- C: 普萘洛尔
- D: 依诺肝素

答案：B

75. (2021 年真题) 渗透性强，可透过甲板，属于吡啶酮类的抗真菌药物是 ()

- A: 克霉唑
- B: 特比萘芬
- C: 米卡芬净
- D: 环吡酮胺

答案：D

76. 下列药物中，不能增强他莫西芬活性和疗效的是

- A: 氟尿嘧啶
- B: 长春新碱
- C: 西咪替丁
- D: 甲氨蝶呤

答案：C

77. 患者，女，56 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式(控制饮食、增加运动)。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀片 20mg/d 治疗。若采用强化治疗，辛伐他汀片的最大日剂量是 ()。

- A: 20mg
- B: 80mg
- C: 40mg
- D: 100mg

答案：B

78. 哮喘急性发作首选的治疗药物是

- A: 吸入性糖皮质激素

- B: 磷酸二酯酶抑制剂
- C: 白三烯受体阻断剂
- D: 短效 B₂ 受体激动剂

答案：D

79. 下述不属于抗血小板类药物的是

- A: 磷酸二酯酶抑制剂
- B: 非特异性纤溶酶原激活剂
- C: 血栓素 A₂ (TXA₂) 抑制剂
- D: 二磷酸腺苷 P₂Y₁₂ 受体激动剂

答案：B

80. 有关阿托品的叙述，错误的是

- A: 与促胃肠动力药合用时应有间隔时间
- B: 妊娠期静脉滴注阿托品可使胎儿心动过速
- C: 婴幼儿对其毒性不敏感
- D: 存在潜在性青光眼时，使用阿托品有诱发危险

答案：C

81. 属于白三烯受体阻断剂的是

- A: 奥关拉唑
- B: 右美沙芬
- C: 乙酰半胱氨酸
- D: 孟鲁司特

答案：D

82. 止吐方案：每日化疗前，联合应用 5-HT

- A: 重度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

- B: 中度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
- C: 微弱致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐
- D: 低度致吐性化疗药所引起的恶心与呕吐

答案：A

83. 治疗轻度尿崩症可选用

- A: 呋塞米
- B: 乙酰唑胺
- C: 氢氯噻嗪
- D: 螺内酯

答案：C

84. 可抑制鲨烯环氧酶的活性，属于丙烯胺类抗皮肤真菌药的是

- A: 制霉菌素
- B: 特比萘芬
- C: 阿莫罗芬
- D: 联苯卡唑

答案：B

85. 用青霉素治疗梅毒、钩端螺旋体病时能出现寒战、咽痛、心率加快等症状,其原因可能是大量病原体被杀灭后出现的全身性反应,这种反应称为()

- A: 青霉素脑病
- B: 瑞夷综合征
- C: 金鸡纳反应
- D: 赫氏反应

答案：D

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/328024104045007022>