

2024 福建省寿宁县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试王牌题库及答案【必刷】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 发热（发烧）指人体体温升高，超过正常范围，主要表现是体温升高、脉搏加快。按体温状况，发热分为低热、中等度热、高热、超高热。高热是指体温范围

A: $39.1^{\circ}\text{C} \sim 41.0^{\circ}\text{C}$

B: $37.4^{\circ}\text{C} \sim 38.0^{\circ}\text{C}$

C: $38.1^{\circ}\text{C} \sim 39.0^{\circ}\text{C}$

D: $37.0^{\circ}\text{C} \sim 38.3^{\circ}\text{C}$

答案：A

2. 容易水解的药物是

A: 牛痘菌苗

B: 青霉素类、头孢菌素类

C: 阿朴吗啡、水杨酸钠

D: 胃蛋白酶

答案：B

3. 关于尿路感染的用药注意事项，说法不正确的是

A: 服用磺胺类药物时应多喝水

B: 经验性用药有头孢氨苄、阿莫西林等

C: 尽量避免尿路器械的使用

D: 无症状菌尿仅推荐筛查和治疗孕妇以及接受可能导致尿道黏膜出血的侵入性操作的患者

答案：A

4. 妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

- A: 青霉素
- B: 头孢菌素
- C: 氯霉素
- D: 碳青霉烯类

答案：C

5. 是否增加房颤患者死亡率尚无定论，可谨慎地用于房颤的心室率控制的是()

- A: 地高辛
- B: 美托洛尔
- C: 地尔硫
- D: 普罗帕酮

答案：A

6. 阿尔兹海默病患者应该避免使用的药物是（）

- A: 卡巴拉汀
- B: 多奈哌齐
- C: 颠茄
- D: 美金刚

答案：C

7. 能保护药品免受破坏的联合是

- A: 磷霉素联用其他抗菌药物
- B: 亚胺培南-西司他汀复方制剂
- C: 普萘洛尔联用硝苯地平降血压
- D: 维生素 C 与铁剂同服

答案：B

8. 以下所列药物中，使用不当可能导致新生儿发生核黄疸的是

- A: 苯妥英钠
- B: 吲哚美辛
- C: 磺胺类药
- D: 维生素 C

答案：C

9. 解救中毒的肾衰竭者（）

- A: 不能催吐
- B: 不能导泻
- C: 禁止洗胃
- D: 不能用强利尿剂

答案：D

10. 一旦误服中毒，必须用硫酸镁洗胃的是

- A: 急性汞中毒
- B: 急性铅中毒
- C: 磷化锌等杀鼠药
- D: 香豆素类杀鼠药

答案：B

11. 糖尿病患者服用后可使血糖降低或升高的药物是

- A: 培高利特
- B: 培氟沙星
- C: 加替沙星
- D: 头孢哌酮

答案：C

12. 脑出血急性期的病死率为

- A: 30%~40%
- B: 10%~15%
- C: 40%~45%
- D: 20%~30%

答案：A

13. 膀胱炎占尿路感染的 60%以上，致病菌多为

- A: 白假丝酵母菌
- B: 大肠埃希菌
- C: 淋病奈瑟菌
- D: 金黄色葡萄球菌

答案：B

14. 乙型肝炎病毒感染后在血清里最早出现的是

- A: HBsAb
- B: HBcAb
- C: HBsAg
- D: HBeAb

答案：D

15. 患者，女，实验室检查：血红蛋白 95g / L。临床诊断为缺铁性贫血，处方口服硫酸亚铁片。下列向患者交代的用药注意事项，错误的是

- A: 宜空腹服用
- B: 不宜与钙剂同时服用
- C: 不宜同时进食牛奶和蛋类
- D: 宜同时补充维生素 C 或稀盐酸

答案：A

16. 急需查询输液剂的配伍禁忌，首选的书籍是

- A: 《新编药理学》
- B: 《药物流行病学》
- C: 《注射药物手册》
- D: 《药物治疗学：病理生理学的方法》

答案：C

17. 治疗窗窄以及代谢存在较大的个体差异的药物是

- A: 茶碱
- B: 苯妥英钠
- C: 顺铂
- D: 地高辛

答案：A

18. 患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方，氨氯地平片 10mgpoqd；美托洛尔缓释片 47.5mgpoqd；贝那普利片 20mgpoqd；阿司匹林肠溶片 100mgpoqd；辛伐他丁片 40mgpoqd。

- A: 氯吡格雷片
- B: 华法林片
- C: 双嘧达莫片

D: 对乙酰氨基酚片

答案：A

19. 处方用药须与临床诊断密切相符，医师开具的处方在病情与诊断栏中应明确记录对患者的临床诊断。药师应审查处方用药与临床诊断的相符性，以加强合理用药监控。

A: 老年女性补钙给予阿托伐他汀钙

B: I 类手术切口应用第三代头孢菌素

C: 脂肪乳用于急性肝损伤、脂质肾病、脑卒中

D: 福辛普利用于降压

答案：C

20. (2016 年真题) 将药物治疗成本和所产生的效益规划为以货币为单位的数字，进行药物经济学评价。这一评价方法属于 ()。

A: 最小成本分析

B: 成本-效用分析

C: 成本-效果分析

D: 成本-效益分析

答案：D

21. 服用药物对粪外观的影响, 利福平

A: 变红或黑色

B: 黄色

C: 红至黑色

D: 橘红至红色

答案：D

22. 患者，男，35 岁，因支气管哮喘入院，经正规治疗后病情缓解，仅偶尔胸闷，出院时医嘱如下。

- A: 氨茶碱
- B: 丙酸倍氯米松气雾剂
- C: 酮替芬
- D: 异丙托溴铵气雾剂

答案：D

23. 患者，女，68 岁，体重 45kg，因发热、咳嗽咳痰入院治疗，临床诊断为社区获得性肺炎。化验结果：白细胞计数 $11.76 \times 10^9/L$ ，肌酐清除率 18ml/min。该患者使用下列抗菌药物治疗时不需要减量的是()

- A: 莫西沙星
- B: 阿莫西林
- C: 左氧氟沙星
- D: 头孢噻肟钠

答案：A

24. 冠状动脉粥样硬化心脏病患者，如没有用药禁忌证，欲服用阿司匹林作为一级预防，最佳剂量范围是：

- A: 25-70mg/d
- B: 150-300mg/d
- C: 25-77mg/d
- D: 75-150mg/d

答案：D

25. 妊娠 5 个月后用何种抗菌药物会使婴儿牙釉质发育不全、牙齿黄染

- A: 青霉素
- B: 氟喹诺酮类

C: 四环素类

D: 大环内酯类

答案: C

26. 口服或静滴艾司洛尔用于解救

A: 氟乙酰胺中毒

B: 有机磷杀虫药中毒

C: 氰化氢中毒

D: 瘦肉精中毒

答案: D

27. 男性红细胞沉降率的正常范围值

A: 0~5mm/h

B: 0~20mm/h

C: 0~10mm/h

D: 0~15mm/h

答案: D

28. (2017 年真题) 患者女, 68 岁体重 54kg, 因慢性阻塞性肺病急性加重再次入院, 入院后生化检查 ALT20IU/L, 血肌酐 (Cr) 1.8mg/dL, 痰培养为铜绿假单胞菌。临床选用头孢他啶。头孢他啶药品说明书成人常用剂量为 1 日 1.5~6g, 分 2~3 次给药肌酐清除率为

31~50ml/min 时剂量为每 12 小时 1g; 肌酐清除率为 16~30ml/min 时剂量为每 24 小时 1g; 肌酐清除率为 6~15ml/min 时量为每 24 小时 0.5g; 肌酐清除率 ≤5ml/min 时剂量为每 48 小时 0.5g。

A: 每 24 小时 0.5g

B: 每 24 小时 1g

C: 每 8 小时 2g

D: 每 12 小时 1g

答案：B

29. 患者，男，38 岁，身高 175cm，体重 70kg。3 日前自觉全身肌肉酸痛、头疼，轻微咳嗽，自服抗感冒药物效果不佳，近 1 日觉畏寒，发热，体温 37.7℃，遂来本院就诊。检查结果：患者神清，查咽喉部红肿，扁桃腺（-），双肺呼吸音清，心脏听诊无异常，腹检无异常。血象 WBC 正常，其他正常。诊断为：上呼吸道感染（感冒）。

A: 膀胱颈梗阻

B: 严重高血压

C: 牙齿肿胀

D: 血糖升高

答案：B

30. （2017 年真题）慢性阻塞性肺病急性加重期伴脓痰者宜选用的治疗方案是（）

A: 长效 β_2 受体激动剂+吸入型糖皮质激素

B: 抗菌药物+短效支气管舒张剂+糖皮质激素

C: 吸入型糖皮质激素+镇咳药+抗过敏药

D: 吸入型糖皮质激素+磷酸二酯酶抑制剂

答案：B

31. 可提供摘要、引文、索引及目录的信息属于

A: 一级信息

B: 三级信息

C: 四级信息

D: 二级信息

答案：D

32. 尤其适用于伴胸痛的干咳患者的药品是

- A: 可待因
- B: 苯丙哌林
- C: 羧甲司坦
- D: 右美沙芬

答案：A

33. (抗癫痫药物的选择)，癫痫部分发作的一线用药是

- A: 乙琥胺
- B: 加巴喷丁
- C: 卡马西平
- D: 扑米酮

答案：C

34. 解救有机磷中毒的是（）

- A: 盐酸戊乙奎醚
- B: 亚硝酸钠
- C: 单价抗毒血清
- D: 二巯丁二钠

答案：A

35. 在中国，具有"规范处方行为和指导合理用药的法规性和专业性文件"属性的药物专著是

- A: 国家基本药物处方集
- B: 中国药学文摘
- C: 新编药理学
- D: 中国国家处方集

答案：D

36. 不宜咽或吞下所用药品；用药后不宜马上吃食或饮水的是

- A: 含漱剂
- B: 舌下片
- C: 咀嚼片
- D: 阴道栓剂

答案：A

37. 根据药物对胎儿的危害,美国 FDA 将妊娠用药毒性分为 A、B、C、D、X 五个级别,依那普利的妊娠毒性分级是()

- A: A 级
- B: D 级
- C: C 级
- D: X 级

答案：B

38. 用药后有可能出现球后视神经炎的抗结核药物是

- A: 利福平
- B: 乙胺丁醇
- C: 链霉素
- D: 吡嗪酰胺

答案：B

39. 可用于治疗口腔溃疡，大剂量服用后，尿液可能呈黄色的药物是

- A: 维生素 C
- B: 维生素 A
- C: 复合维生素 B

D: 维生素

答案：C

40. 具有催吐作用，在无禁忌证前提下，可用于多种毒物中毒的催吐排毒药物是

A: 昂丹司琼

B: 阿扑吗啡

C: 吗啡

D: 氯丙嗪

答案：B

41. (2016 年真题) 患者，女，55 岁，因“反复发作胸骨后疼痛 2 年，伴反酸，胃灼热，间断积食”而就诊。食管测压提示食管下括约肌 (LES) 压力 $< 6\text{mmHg}$ ，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病，医师处方：奥美拉唑肠溶片 20mgbid 强化抑酸治疗。

A: 避免高脂饮食

B: 餐中多饮水

C: 控制体重

D: 戒烟酒

答案：B

42. 人体正常体温的标准是直肠温度不超过

A: 37.6°C

B: 36.6°C

C: 37.2°C

D: 36.9

答案：A

43. 糖尿病合并肾病者宜首选的药物是

- A: 格列喹酮
- B: 二甲双胍
- C: 阿卡波糖
- D: 罗格列酮

答案：A

44. 患者男性，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 下肢动脉栓塞
- B: 肺动脉栓塞
- C: 病理性骨折
- D: 下肢深静脉血栓形成

答案：D

45. 能刺激骨骼、肌肉和组织生长发育的是

- A: 利尿剂
- B: 蛋白同化激素
- C: 肽类激素
- D: 麻醉药品

答案：C

46. 患者，男，35 岁。于中饭后即开始有胃部疼，胀满食少，现感觉脐周硬、闷痛拒按，于 1 日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因饱食而导致的继发性消化不良。

- A: 多潘立酮
- B: 胰酶片
- C: 复合消化酶胶囊

D: 莫沙必利

答案: D

47. 患者，男，56 岁，诊断为病毒性乙型肝炎。实验室检查：HbeAg（+），HBV-DNA ≥ 20000 IU/ml。ALT200U/L。现需要启动抗病毒治疗，采用干扰素 α 和核苷（酸）类抗病毒药物。

A: 中性粒细胞计数 $<0.5 \times 10^9$ /L，应停药

B: 出现体温升高、肌肉酸痛可服用对乙酰氨基酚

C: 血小板计数 $<100 \times 10^9$ /L，应减量

D: 中性粒细胞计数 $\leq 0.75 \times 10^9$ /L，应减量

答案: C

48. 提示首次取硝酸甘油片的患者"要随身携带、在心绞痛发作时含于舌下"，是针对

A: 交代药品贮存条件与方法

B: 交代药物的用量

C: 交代用药注意事项

D: 交代用药途径及用药方法

答案: D

49. 容易引起肌酸激酶升高的药物是

A: 奥美拉唑

B: 青霉素

C: 洛伐他汀

D: 红霉素

答案: C

50. 可干扰乙醇代谢过程，导致双硫仑样反应的药物是

- A: 咪康唑
- B: 氟康唑
- C: 酮康唑
- D: 甲硝唑

答案：D

51. 属于 P-糖蛋白抑制剂的药物是

- A: 圣约翰草提取物
- B: 维拉帕米
- C: 卡马西平
- D: 利福平

答案：B

52. (肾功能不全者的药物排泄机制)弱酸性药物离子化减少

- A: 肾小球滤过减少
- B: 肾小管重吸收增加
- C: 肾血流量减少
- D: 肾小管分泌减少

答案：B

53. I 期临床试验是初步的临床药理学及人体安全性评价。试验对象主要为健康受试者，样本数一般只有

- A: 12~13 例
- B: 10~18 例
- C: 20~24 例
- D: 20~30 例

答案：D

54. 人体健康参数：肥胖的腰围标准是

- A: 男性>90cm，女性>85cm
- B: 男性>85cm，女性>80cm
- C: 男性>90cm，女性>80cm
- D: 男性>95cm，女性>85cm

答案：A

55. 不宜用热水送服的药物是

- A: 双膦酸盐
- B: 氨茶碱
- C: 去氢胆酸
- D: 整肠生

答案：D

56. 下列药师承接的用药咨询内容中，多由患者提出的是

- A: 自我保健
- B: 新药信息
- C: 治疗药物监测
- D: 药品适应证

答案：D

57. 非霍奇金淋巴瘤的 CHOP 方案中不包括的治疗药物是

- A: 阿霉素
- B: 利妥昔单抗
- C: 环磷酰胺
- D: 长春新碱

答案：B

58. 属于容积性泻药的是

- A: 乳果糖
- B: 开塞露
- C: 番泻叶
- D: 硫酸镁

答案：D

59. (2017 年真题) 痛风缓解期宜选用的治疗药物是 ()

- A: 苯溴马隆
- B: 阿司匹林
- C: 泼尼松
- D: 秋水仙碱

答案：A

60. 易经乳汁分泌的药物的特征是：

- A: 弱酸性？
- B: 脂溶性大？
- C: 蛋白结合率高？
- D: 分子量大？

答案：B

61. 关于腹泻下列说法正确的是

- A: 迁延性腹泻病程为 2 周至 1 个月
- B: 排便一日超过 4 次
- C: 急性腹泻病程小于 2 周
- D: 慢性腹泻病程大于 1 个月

答案：C

62. 危重支气管哮喘疾病的临床表现为

- A: 稍事活动感气短，可有焦虑，呼吸频率增加，可有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快，可出现奇脉
- B: 步行或上楼时气短，可有焦虑，呼吸频率轻度增加，闻及散在哮鸣音，肺通气功能和血气检查正常
- C: 不能讲话，嗜睡、意识模糊，胸腹矛盾运动等，喘鸣音减低或消失
- D: 休息时感气短，端坐呼吸，只能发单字表达，常有焦虑和烦躁，大汗淋漓，呼吸频率 >30 次 / 分，可有三凹征，闻及响亮、弥漫的哮鸣音，心率增快常 >120 次 / 分，奇脉， PaO_2

答案：C

63. （2021 年真题）两性霉素 B 用 0. 9%氯化钠注射液溶解，可导致（ ）

- A: 产生气体
- B: 微浑浊或沉淀
- C: 产生胶状不溶物
- D: 溶液变色

答案：B

64. 收录 5500 余种药物专论、4 万多篇参考文献的药物信息来源是

- A: 《中国国家处方集》
- B: 《英国国家处方集》
- C: 《医师案头参考》
- D: 《马丁代尔药物大典》

答案：D

65. 以下"准备调配处方标签"事宜中，最重要的是

- A: 用法用量规范

B: 依据患者情况加贴个体化用药方法

C: 不能只依赖药品说明书

D: 语言通俗易懂

答案：B

66. 一 2 型糖尿病患者，伴高血压、高胆固醇血症，如有胃部不适或感冒即需联合用药。对该患者的用药教育应该是适宜餐后服用的药品是

A: 呋塞米

B: 阿司匹林

C: 普伐他汀

D: 格列美脲

答案：B

67. (2016 年真题) 患者到药店购买“扑尔敏片”，药师应给予 ()。

A: 阿昔洛韦片

B: 氯苯那敏片

C: 更昔洛韦片

D: 奥司他韦片

答案：B

68. 可引起嗜酸性粒细胞增多的药物是 ()

A: 头孢氨苄

B: 坎地沙坦

C: 氯苯那敏

D: 碳酸氢钠

答案：A

69. 妥布霉素可导致药源性肾病的机制是

- A: 肾小球滤过率下降
- B: 不可逆性肾小管坏死
- C: 前列腺素合成障碍
- D: 结晶沉积

答案：A

70. 可帮助人短时间内急速降低体重的是

- A: 利尿剂
- B: 肽类激素
- C: 麻醉药品
- D: 蛋白同化激素

答案：A

71. 属于 A 级高危药品的是

- A: 5%葡萄糖注射液
- B: 血液透析液
- C: 全胃肠外营养液
- D: 50%葡萄糖注射液

答案：D

72. 治疗抗肿瘤药引起的恶心、呕吐等不良反应，可以选用的止吐药是

- A: 维生素 B6
- B: 雷尼替丁
- C: 昂丹司琼
- D: 奥美拉唑

答案：C

73. (常用的特殊解毒剂的适应证)，对乙酰氨基酚过量的特殊解毒剂

- A: 谷胱甘肽
- B: 二巯丁二钠
- C: 乙酰半胱氨酸
- D: 纳洛酮

答案：C

74. 患者男 25 岁有癫痫病史 2 年一直服用丙戊酸钠和左乙拉西坦，癫痫控制良好近期因社区获得性肺炎入院。下列药物中，最可能影响患者基础疾病控制的是（）

- A: 阿奇霉素
- B: 莫西沙星
- C: 阿莫西林
- D: 头孢曲松

答案：B

75. 某患者到药店购买降糖灵，药师应交付的药物是

- A: 格列本脲
- B: 胃得灵
- C: 苯乙双胍
- D: 吡拉西坦

答案：C

76. 根据药物对胎儿的危害，美国 FDA 将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别属于妊娠毒性 B 级的药物是

- A: 葡萄糖
- B: 阿莫西林
- C: 万古霉素
- D: 沙利度胺

答案：B

77. 患者于 1 周前无诱因出现咳嗽，咳嗽为阵发性，痰少，呈白色黏液性，不易咳出，同时出现发热，体温多在夜间升高，38℃左右，无畏冷、寒战、胸痛、咳血等，于卫生院治疗后，未见好转，并有气喘、气促，活动后呼吸困难等症状。入院治疗诊断为：肺炎。

- A: 细菌性肺炎
- B: 免疫损伤肺炎
- C: 过敏性肺炎
- D: 放射性肺炎

答案：A

78. 十分常见，多从婴儿时期起发病. 可持续终生

- A: 人工荨麻疹
- B: 热性荨麻疹
- C: 幼小荨麻疹
- D: 冷性荨麻疹

答案：D

79. 患者，女性，25 岁，因面色苍白、头晕、乏力 1 年余，加重伴心悸 1 个月来诊。经诊断为缺铁性贫血。

- A: 右旋糖酐铁
- B: 葡萄糖酸亚铁
- C: 叶酸
- D: 琥珀酸亚铁

答案：C

80. 用于评价肝功能不全严重程度的是()

- A: 数字评分法
- B: Cochrane 证据分级
- C: APACHE 评分系统
- D: CTP 评分标准

答案：D

81. 急性支气管炎呈自限性，对于急性单纯性支气管炎不建议常规使用抗菌药物，除非是出现了肺炎。治疗通常是对症和支持疗法。

- A: 右美沙芬
- B: 苯海拉明
- C: 愈创木酚甘油醚
- D: 伪麻黄碱

答案：C

82. 下列药物中，解救三唑仑中毒的特效药是

- A: 氟马西尼
- B: 碳酸氢钠
- C: 维生素 K
- D: 维生素 C

答案：A

83. 患者，男，36 岁，因发热、咳嗽就诊，查血常规：白细胞计数 $6.28 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 65.7%，淋巴细胞百分比 15.1%。诊断为感冒。医生处方：阿奇霉素片 0.5g qd po. 该处方属于()

- A: 有配伍禁忌
- B: 无适应证用药
- C: 用法、用量不适宜
- D: 有禁忌证用药

答案：B

84. 中危患者

A: 先观察（血压及危险因素）数周，然后决定是否进行药物治疗

B: 立即进行抢救治疗

C: 立即使用抗高血压药物

D: 观察相当一段时间，再决定是否进行药物治疗

答案：A

85. 粪便隐血可见于

A: 口腔溃疡

B: 胃溃疡

C: 痛经

D: 湿疹

答案：B

86. 处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件，具有

A: 经济性、法律性和合理性

B: 技术性、有效性和经济性

C: 法律性、技术性和经济性

D: 技术性、经济性和合法性

答案：C

87. 与左旋多巴合用，可提高疗效的药物是

A: 克拉维酸钾

B: 奥美拉唑

C: 叶酸

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 苧丝肼

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/328050070042007022>