

2022~2023 医院三基考试考试题库及答案

1. 正常人 24 小时尿量约 \_\_\_\_\_ml，少尿为 24 小时尿量少于 \_\_\_\_\_ml

正确答案：

1000—2000、400

2. 关于 T 波的描述，下列描述那一项是错误的

- A. 代表心室快速复极时的电 位变化
- B. 在正常情况下，T 波的方向大多与 QRS 波主波的方向一致
- C. 代表 心室缓慢复极过程
- D. 若心内膜下心肌缺血，使 T 波向量增大，面向缺血区的导 联出现高大的 T 波
- E. 若心外膜下心肌缺血，面向缺血区的导联出现倒置的 T 波

正确答案：

A

3. 下列哪项食物不富含维生素 A：（）

- A. 动物肝脏
- B. 全奶
- C. 豆类
- D. 水果

正确答案：

C

4. 彩色多普勒血流 显像中的 红色 代表

- A. 动脉血流
- B. 静脉血流
- C. 血流朝向探头
- D. 血流背向探头

正确答案：

C

5. X 线的特征 包括：

- A. 穿透性
- B. 荧光作用
- C. 摄影作用
- D. 生物效应
- E. 以上都是

正确答案：

E

6. 下列哪项不是护患沟通的主要目的：（）

- A. 收集资料
- B. 积累科研资料
- C. 治疗或辅助治疗
- D. 建立和改善护患关系

正确答案：

B

7. 颅高压最危险的结局是\_\_\_\_\_。

正确答案：

脑疝形成。

8. 六淫是一切内感病的主要病因。（）

正确答案：

错误

9. 老年人血压随年龄增长而增加，收缩压基线 = 90 + 年龄（mmHg）。（）

正确答案：

正确

10. 口渴多饮，口舌干燥，尿频量多，烦热多汗，舌边尖红，苔薄黄，脉洪数。可辩证为

- A. 下消肾阴亏虚证
- B. 下消阴阳两虚证
- C. 上消肺热津伤证
- D. 中消气阴亏虚证

正确答案：

C

11. 关于 肺部孤立性结节或肿块，其 短细毛刺征象 最常见

- A. 肺癌
- B. 转移性肿瘤
- C. 良性肿瘤
- D. 结核球

正确答案：

A

12. 崩漏小腹疼痛拒按者，可给予腹部热敷的是

- A. 血热妄行证
- B. 气不摄血证
- C. 瘀血阻滞证
- D. 肾虚证

正确答案：

C

13. 内科腹痛的临床特点有

- A. 先发热后腹痛
- B. 先腹痛后发热
- C. 痛无定处
- D. 压痛不明显

正确答案：

ACD

14. 全脊椎麻醉的主要危险是（）

- A. 低血压
- B. 剧烈疼痛
- C. 麻醉作用持久
- D. 呼吸心跳骤停
- E. 损伤脊髓导致截瘫

正确答案：

D

15. 一早产儿口鼻有奶溢出，面色青紫呼吸停止，下列哪项处理不恰当

- A. 放低头部，立即清除呼吸道分泌物
- B. 加压吸氧
- C. 保持安静，避免搬动患儿头部
- D. 立即通知医生
- E. 迅速建立静脉通路

正确答案：

C

16. 久病衰竭，突然精神兴奋，欲饮欲食是（）的表现。

- A. 有神
- B. 失神
- C. 假神
- D. 少神

正确答案：

C

17. 最严重的输血反应为

- A. 发热反应
- B. 过敏反应
- C. 溶血反应
- D. 疾病感染

正确答案：

C

18. 脑膜瘤 主要 CT 表现有哪些？

- A. 圆形或类圆形
- B. 等密度
- C. 脑膜尾症
- D. 均匀强化
- E. 以上都是

正确答案：

E

19. 急性有机磷农药中毒经皮肤吸收中毒一般在 6—8 小时发病。

正确答案：

错误

20. 头痛如裹，肢体困重，胸闷纳呆，苔白腻，脉濡。可辨证为

- A. 风寒证
- B. 肝阳证
- C. 痰浊证
- D. 风湿症

正确答案：

D

21. 母乳喂养中，下列哪项方法不正确

- A. 早吸吮
- B. 按需哺乳
- C. 哺乳时，母亲以示指和中指夹钳乳头给婴儿吸吮
- D. 哺乳毕，将婴儿直抱轻拍背部
- E. 乳母患有急性传染病时不应哺乳

正确答案：

C

22. 内囊出血“三偏”征为（ ）

- A. 对侧偏麻
- B. 同侧偏麻
- C. 双眼同向性偏盲
- D. 同侧偏瘫
- E. 对侧偏瘫

正确答案：

ACE

23. 急性肾小球肾炎产生全身性水肿的主要机制是（ ）

- A. 醛固酮分泌增加
- B. 抗利尿素释放增多
- C. 肾小球钠水滤过下降
- D. 肾小球毛细血管通透性升高
- E. 血浆胶体渗透压减低

正确答案：

C

24. 踝关节扭伤出血在多久后可应用热疗法

- A. 6 小时
- B. 12 小时
- C. 24 小时
- D. 48 小时

正确答案：

D

25. 黎明时腹泻多属（ ）证。

- A. 湿热证
- B. 虚寒证
- C. 肾阳虚
- D. 伤食证

正确答案：

C

26. 老人骨脆易折， 小儿囟门迟闭， 骨软无力多因

- A. 肾阴不足
- B. 肾阳不足
- C. 髓海空虚
- D. 肾精不足

正确答案：

D

27. 急性肾小球肾炎患儿恢复的主要指标是？

- A. 水肿消退，肉眼血尿消失
- B. 水肿消退，尿常规转为正常
- C. 水肿消退，血压正常
- D. 血沉、补体恢复正常
- E. 水肿消退，尿蛋白正常

正确答案：

D

28. 病人取坐位时，最易发生压疮的部位是（）

- A. 髌部
- B. 骶尾部
- C. 髂前上棘处
- D. 坐骨结节处
- E. 脊椎棘突处

正确答案：

E

29. 受压局部水泡极易破溃，可露出潮湿红润的创面，属于压疮的

- A. 瘀血红润期
- B. 炎性浸润期
- C. 浅表溃疡期
- D. 深度溃疡期

正确答案：

B

30. 护士在与病人交谈中，提问应注意：（）

- A. 问题说得简单而清楚
- B. 不问对方难回答的问题
- C. 语言要通俗易懂
- D. 一次问两个问题
- E. 在安静的环境下提问

正确答案：

ABCE

31. 急性心肌梗死患者中 50%-80% 患者病前有先兆，其最常见表现为（）

- A. 新发生心绞痛，原有心绞痛加重
- B. 自发性心绞痛

- C. 稳定型心绞痛
- D. 变异型心绞痛
- E. 混合性心绞痛

正确答案：

A

32. 为病人进行皮肤清洁护理的目的是（）

- A. 刺激皮肤的血液循环
- B. 清除体表致病物质
- C. 清除体表污垢
- D. 加强外貌的修饰，美化外观
- E. 清洁皮肤创面

正确答案：

ACD

33. 特配膳食不包含：（）

- A. 老年膳食
- B. 肝脏病膳食
- C. 儿科膳食
- D. 药膳

正确答案：

B

34. 皮肤用药的目的是将药物直接涂于皮肤，以起到局部治疗的作用。

正确答案：

正确

35. 骨关节病变常规检查，采用哪一种方法？

- A. 通常先拍正、侧位片，必要时拍切线位及斜位
- B. 首先透视，发现病变再拍正、侧位片
- C. 首选 CT
- D. 直接做 MR E. 常规拍正、斜位片

正确答案：

A

36. 纤维胃镜检查后部分患者咽喉水肿，应及时给予气管切开。

正确答案：

错误

37. 用已知 B 型人的血液与待测者血液做交叉合血，若主反应凝集，次反应不凝集，待测者的血型是（）；

- A. B 型
- B. O 型
- C. A 型
- D. AB 型
- E. Rh 阴性

正确答案：

B

38. 输液过程中，患者感到胸骨后疼痛，呼吸困难。发绀，此为空气栓塞的临床症状。

正确答案：

正确

39. 护理理念的基本要素是：（）

- A. 个人、家庭、社区、社会
- B. 人、健康、疾病、护理
- C. 健康、疾病、环境、护理
- D. 人、健康、环境、护理

正确答案：

D

40. 新生儿 ApgAr 评分的五项依据是

- A. 心率、呼吸、体重、哭声、皮肤颜色
- B. 心率、呼吸、脐血管充盈度、羊水性状、皮肤颜色
- C. 心率、呼吸、肌张力、皮肤颜色、喉反射
- D. 心率、呼吸、喉反射、哭声、脐血管充盈度
- E. 心率、呼吸、喉反射、皮肤颜色、哭声

正确答案：

C

41. 不属于 中心型肺癌 的 CT 征象的是

- A. 支气管壁增厚
- B. 支气管腔狭窄
- C. 肺门肿块
- D. 双轨征

正确答案：

D



42. 属于中效化学消毒剂的是 ( )

- A. 碘伏
- B. 甲醛
- C. 氯己定
- D. 过氧化氢
- E. 过氧乙酸

正确答案:

A

43. 最重要的消化液是 ( )

- A. 唾液
- B. 胃液
- C. 胆汁
- D. 胰液
- E. 肠液

正确答案:

D

44. 病历书写不正确的是 ( )

- A. 入院记录需在 24 小时内完成
- B. 出诊记录应转抄在门诊病历中
- C. 接收记录由接受科室医师书写
- D. 转科记录由原住院科室医师书写
- E. 手术记录凡参加手术者 均可书写

正确答案:

E

45. 新生儿缺氧缺血性脑病, 控制惊厥首选

- A. 地西洋
- B. 劳拉西洋
- C. 苯巴比妥
- D. 苯妥英钠
- E. 卡马西平

正确答案:

C

46. 简述正常足月儿呼吸系统特点。

正确答案:

- (1) 新生儿鼻腔小, 黏膜血管丰富, 在炎症时易堵塞。
- (2) 胸腔小, 呼吸肌薄弱, 呼吸时主要靠膈肌的运动, 故以腹式呼吸为主。

(3)呼吸中枢发育不成熟，呼吸频率较快，约40~45次/min，呼吸节律不规则。

47. 心肌梗塞的“损伤型”心电图改变主要表现在：

- A. R波电压降低
- B. 异常Q波
- C. T波直立高耸
- D. ST段抬高
- E. T波对称性

正确答案：

D

48. 分离游离羟基蒽混合物的最佳方案是

- A. 采用不同溶剂，按极性由弱至强顺次提取
- B. 采用不同溶剂，按极性由强至弱顺次提取
- C. 溶于乙醚后，依次用不同碱萃取，碱度由弱至强
- D. 溶于乙醚后，依次用不同碱萃取，碱度由强至弱

正确答案：

C

49. 风热咳嗽的代表方是

- A. 桑菊饮
- B. 止嗽散
- C. 泻白散
- D. 二陈汤

正确答案：

A

50. 治疗巴比妥类药物中毒时，静滴碳酸氢钠的下列目的中，哪项不能达到( )

- A. 碱化血液及尿液
- B. 减少药物从肾小管重吸收
- C. 促进巴比妥类转化钠盐
- D. 促使中枢神经内的药物向血液中转移
- E. 加速药物被药酶氧化

正确答案：

E

51. 常见的输液反应有：发热反应、急性肺水肿、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

正确答案：

静脉炎、空气栓塞

52. 下列溶剂溶解范围最大的是

- A. 丙酮
- B. 甲醇
- C. 乙醚
- D. 苯

正确答案:

B

53. 关于小儿血压及测量方法, 以下提法哪项是错误的?

- A. 血压与心搏出量及外周血管阻力有关
- B. 小儿血压较成人为低
- C. 测量血压袖带的宽度应为上臂长度的 1/3
- D. 舒张压为收缩压的 2/3
- E. 下肢血压比上肢高

正确答案:

C

54. 咳嗽主症的鉴别包括咳嗽的

- A. 时间
- B. 节律
- C. 性质
- D. 声音

正确答案:

ABCD

55. 护士在收集资料时可选用的方法有 ( )

- A. 与病人交谈
- B. 与家属沟通
- C. 用感官观察
- D. 进行身体评估
- E. 查阅实验室检查的结果

正确答案:

ABCDE

56. 普萘洛尔抗高血压主要作用机制是

正确答案:

减少心排血量、抑制肾素分泌、降低外周交感神经活性和中枢降压作用。

57. 反映骨骼发育的重要指标是？

- A. 体重
- B. 身长
- C. 出牙早迟
- D. 囟门闭合情况
- E. 头围与胸围比例。

正确答案：

B

58. 素有胸胁胀痛，暖气食少，每因抑郁恼怒或情绪紧张之时发生腹痛泄泻，腹中雷鸣，攻窜作痛，矢气频作，舌质淡红，脉弦。可辨证为

- A. 湿热伤中证
- B. 肝气乘脾证
- C. 脾胃虚弱证
- D. 食滞肠胃证

正确答案：

C

59. 发现 尿路阳性结石 最常用方法

- A. B 超检查
- B. 腹部平片
- C. 逆行尿路造影
- D. CT 检查

正确答案：

B

60. 伤寒、病毒性肝炎等患者应执行严密隔离。

正确答案：

错误

61. 下列哪项不是溃疡病的并发症（）

- A. 溃疡病伴大出血
- B. 溃疡病并穿孔
- C. 溃疡病恶变
- D. 青少年溃疡病
- E. 溃疡病并瘢痕性幽门梗阻

正确答案：

E

62. 健忘的病机特点

- A. 病位在脑
- B. 多属本虚标实
- C. 虚实兼夹
- D. 虚多实少
- E. 以虚为主

正确答案：

ABCDE

63. 超声心动图即为 D 型超声诊断仪。

正确答案：

错误

64. 可放置冰袋降温的部位是：（）

- A. 枕部、肘窝
- B. 颈部、腹部
- C. 腋窝、胸部
- D. 头顶、腹股沟医学

正确答案：

D

65. 小儿各年龄分期，正确的是

- A. 围产期：生后脐带结扎至生后 7 天
- B. 新生儿期：生后脐带结扎至生后 56 天
- C. 婴儿期：生后至满 2 岁之前
- D. 幼儿期：生后满 1 岁至满 3 岁之前
- E. 学龄前期：生后 5 岁至满 7 岁之前

正确答案：

E

66. 下列何药利水渗湿兼有健脾作用（）

- A. 猪苓
- B. 泽泻
- C. 茯苓
- D. 车前子
- E. 滑石

正确答案：

C

67. 关于心电轴，下列那些正确

- A. I 导联主波向上， III 导联主波向下 ----- 电轴右偏
- B. I、 III 导联主波均向上 ----- 电轴不偏
- C. I 导联主波向下， III 导联主波向上 ----- 电轴左偏
- D. 正常心电轴在  $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$  之间

正确答案：

C

68. 骨肉瘤的 X 线征象中，下列哪项错误

- A. 好发于青少年膝关节附近骨干骺端
- B. 可见象牙质状及针状瘤骨
- C. 松质骨内虫噬状、斑片状破坏
- D. Codman 氏三角
- E. 以上都不是

正确答案：

E

69. 在心肌梗塞的急性期，梗塞区导联口表现有：

- A. ST 段弓背向上抬高
- B. 坏死型 Q 波
- C. T 波直立
- D. 缺血型 T 波倒置

正确答案：

C

70. 高热惊厥的特点不包括

- A. 年龄多在 3—7 岁
- B. 多发生于病初高热时
- C. 发作可呈全身性抽搐
- D. 发作次数少，时间短
- E. 神志恢复快，预后好

正确答案：

A

71. 苔灰黑、舌质淡白润泽的主

- A. 大热
- B. 大寒
- C. 食积

D. 食积

正确答案：

B

72. 急性头部外伤怀疑颅内血肿 首选哪种检查方法？

A. 头颅平片

B. CT C. MRI

C. 脑室造影

D. 脑血管造影

正确答案：

B

73. 服用多潘立酮等促进胃动力药物应指导病人在每次餐后半小时或睡前服用医学教育网搜集整理。

正确答案：

错误

74. 血液的组成包括

A. 原气

B. 营气

C. 宗气

D. 卫气

正确答案：

B

75. 熟地、当归属

A. 补阴药

B. 补阳药

C. 补气药

D. 补血药

正确答案：

D

76. 《阴阳应象大论》指出药食气味中气厚的作用是

A. 通泄

B. 呕吐

C. 发泄

D. 发热

正确答案：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/328057131056006051>