

高职高专护理专业“十二五规划”教材

外科护理学

协和医科大学出版社

第十九章 胸部疾病病人的护理 (2-2)



教学目标

1. **掌握：**胸部疾病病人的护理措施和健康教育；胸膜腔闭式引流病人的护理措施。
2. **熟悉：**胸部疾病病人的病因、临床表现和护理诊断。
3. **了解：**胸部疾病病人的病理生理、常用检查和治疗原则。

第二节 脓胸病人的护理

脓胸（empyema）是指脓性渗出液积聚于胸膜腔内的化脓性感染。

脓胸按照病程可分为急性脓胸和慢性脓胸。
按照引起感染的致病菌可分为化脓性脓胸、结核性脓胸和特异病原性脓胸。
按照波及的范围分为全脓胸和局限性脓胸。

一、护理评估

【病因】

1. 急性脓胸（acute empyema）

- (1) 直接由化脓病灶侵入或破入胸膜腔。
- (2) 外伤、手术污染胸膜腔。
- (3) 经淋巴途径，通过淋巴管侵犯胸膜腔。
- (4) 血源性传播，在全身败血症或脓毒血症时，致病菌可经血液循环进入胸膜腔。

2. 慢性脓胸

- (1) 急性脓胸未及时治疗。
- (2) 急性脓胸处理不当。
- (3) 脓腔内有异物存留，使胸膜腔内感染难以控制。
- (4) 合并支气管炎或食管瘘而未及时处理。
- (5) 胸膜腔邻近的慢性感染灶，致脓腔不能闭合。
- (6) 有特殊病原菌存在，导致纤维层增厚，肺膨胀不全，使脓腔长期不愈。

【病理生理】

感染侵犯胸膜后，引起脏层和壁层胸膜充血、水肿、渗出。

【临床表现】

1. 急性脓胸
2. 慢性脓胸

【辅助检查】

1. X线检查
2. 超声波检查
3. 胸腔穿刺
4. 实验室检查

【治疗原则】

1. 急性脓胸
2. 慢性脓胸

二、护理诊断

1. 气体交换受损
2. 体温过高
3. 疼痛
4. 营养失调

三、护理措施

1. 改善呼吸功能
2. 降温
3. 减轻疼痛
4. 加强营养

（四）健康教育

- 1. 积极配合治疗。**
- 2. 保持皮肤清洁，预防压疮的发生。**
- 3. 注意引流管护理。**
- 4. 制定康复训练计划。**

第三节 肺癌

肺癌多起源于支气管黏膜上皮，又称支气管肺癌。好发于男性，男女之比为（3~5）：1，发病年龄多在40岁以上。近年来，全世界肺癌的发病率有明显增高，女性肺癌的发病率逐渐上升。

一、护理评估

【病因】

1. 吸烟
2. 大气污染
3. 职业因素
4. 肺部慢性疾病
5. 人体内在因素

【病理和分类】

1. 病理
2. 分类

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/328134063030006066>