



围绝经期 综合征

妇产科课件

教学目标

知识目标

- 说出围绝经期综合征的治疗

能力目标

- 复述围绝经期综合征的临床表现

情感目标

- 爱上妇产科学课堂

思政目标

- 内因决定外因，外因影响内因，因此，我们要相互尊重，相互宽容，心中充满爱。

重点、难点

重点

围绝经期综合征
的临床表现

难点

围绝经期综合征
的治疗

主要内容



概念与概述



病因



临床表现



治疗



概念与概述

概念与概述

围绝经期是指接近绝经出现与绝经有关的内分泌、生物学和临床特征起，至绝经1年内的期间，即**绝对过渡期至绝经后1年**。**围绝经期**妇女可出现一系列性激素减少所致的**症状**，称为**围绝经期综合征**。一般发生于45~55岁。除自然绝经外，手术切除两侧卵巢或受放射线破坏，可导致人工绝经，更容易发生围绝经期综合征。



病因



病因

病因不十分明确，多认为卵巢功能减退，下丘脑和垂体功能退化，导致内分泌失调，代谢障碍，自主神经功能失调，出现围绝经期症状。此外，因雌激素减少，干扰中枢神经递质的代谢及分泌，使患者出现情绪不稳定等一系列精神症状。



临床表现



临床表现

1. 生殖系统表现

(1) 月经紊乱：绝经前半数以上妇女出现月经紊乱，多为月经周期不规则，持续时间长，经量增加，或月经稀发而逐渐绝经。围绝经期及绝经后妇女出现异常子宫出血，一定要警惕子宫内膜癌、宫颈癌、子宫肌瘤的发生。

(2) 生殖器官萎缩：外阴、阴道萎缩，分泌物减少、干燥，疼痛，外阴瘙痒，盆底肌肉松弛。

临床表现

2. 全身症状

(1) **潮热**：为最常见的症状，面部和颈部潮热，继之出汗，持续时间长短不一，次数不等。这种症状可历时数年。

(2) **精神、神经症状**：激动易怒、焦虑不安、抑郁寡欢、不能自我控制。

临床表现

(3) 泌尿系统症状：尿道黏膜变薄，括约肌有松弛，常有尿失禁。膀胱因黏膜变薄，易反复发作膀胱炎。

(4) 心血管疾病：绝经后妇女易发生动脉粥样硬化、心肌缺血、心肌梗死、高血压，伴头痛、眩晕、耳鸣等症状，因绝经后雌激素水平低下，使血胆固醇水平升高，高密度脂蛋白/低密度脂蛋白比值降低。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/335024013000011320>