

主管护师-护理学（中级）基础知识考前特训 4

单选题（共 100 题，共 100 分）

(1.)关于帕金森病的三个主要体征，哪项是正确的

- A. 震颤，肌张力增高，慌张步态
- B. 震颤，面具脸，（江南博哥）肌张力增高
- C. 运动减少，搓丸样动作，肌张力增高
- D. 震颤，肌张力增高，运动减少
- E. 震颤，面具脸，运动减少

正确答案： D

参考解析：帕金森氏病起病缓慢，是逐渐发展的，也就是说并不是一下子就发展到非常严重的程度，是一种缓慢的、进展性的发展过程。病人最突出的就是如下三大症状：

①运动障碍。可以概括为：运动不能：进行随意运动启动困难。运动减少：自发、自动运动减少，运动幅度减少。运动徐缓：随意运动执行缓慢。患者运动迟缓，随意动作减少，尤其是开始活动时表现动作困难吃力、缓慢。做重复动作时，幅度和速度均逐渐减弱。有的患者书写时，字越写越小，称为“小写症”。有些会出现语言困难，声音变小，音域变窄。吞咽困难，进食饮水时可出现呛咳。有的患者起身时全身不动，持续数秒至数十分钟，叫做“冻结发作”。

②震颤。表现为缓慢节律性震颤，往往是从一侧手指开始，波及整个上肢、下肢、下颌、口唇和头部。典型的震颤表现为静止性震颤，就是指病人在静止的状况下，出现不自主的颤抖。主要累及上肢，两手像搓丸子那样颤动着，有时下肢也有震颤。个别患者可累及下颌、唇、舌和颈部等。每秒钟 4~6 次震颤，幅度不定，精神紧张时会加剧。不少患者还伴有 5~8 次/秒的体位性震颤。部分患者没有震颤，尤其是发病年龄在 70 岁以上者。

③强直。就是肌肉僵直，致使四肢、颈部、面部的肌肉发硬，肢体活动时有费力、沉重和无力感，可出现面部表情僵硬和眨眼动作减少，造成“面具脸”，身体向前弯曲，走路、转颈和转身动作特别缓慢、困难。行走时上肢协同摆动动作消失，步幅缩短，结合屈曲体态，可使患者以碎步、前冲动作行走，我们把它称为“慌张步态”。

(2.)伤寒致病的主要因素是

- A. 伤寒杆菌菌体
- B. 伤寒杆菌“O”抗原
- C. 伤寒杆菌鞭毛“H”抗原
- D. 伤寒杆菌表面“Vi”抗原
- E. 伤寒杆菌内毒素

正确答案： E

参考解析：

伤寒杆菌不产生外毒素，菌体裂解时产生的内毒素在发病机制中起重要作用。伤寒杆菌主要有三种抗原，即菌体“O”抗原、鞭毛“H”抗原和表面“Vi”抗原，感染后诱生的抗体均为非保护性抗体。

(3.)低氧血症最常见的原因是

- A. 肺泡通气不足
- B. 通气与血流比例失调
- C. 弥散障碍
- D. 肺动-静脉样分流
- E. 氧耗量增加

正确答案： B

参考解析：通气与血流比例失调是低氧血症最常见的原因。

【该题针对“基础知识-呼吸衰竭病因及发病机制、分型、缺O₂和CO₂潴留对机体的影响、辅助检查”知识点进行考核】

(4.)下丘脑的作用是

- A. 分泌促甲状腺激素
- B. 分泌促黑色素细胞激素
- C. 分泌缩宫素
- D. 神经系统与内分泌联系的枢纽
- E. 分泌促肾上腺皮质激素

正确答案： D

参考解析：下丘脑是神经系统与内分泌联系的枢纽，下丘脑的神经细胞支配和控制垂体，垂体再控制周围靶腺并影响全身。主要分泌促激素释放激素。

(5.)早期正确诊断传染病的主要意义是

- A. 避免延误病情
- B. 有助于正确的病原治疗
- C. 帮助判断预后
- D. 可以进行流行病学调查
- E. 有助于预防和控制流行

正确答案： E

参考解析：对传染病必须在早期就能作出正确的诊断，正确诊断是及时隔离和采取有效治疗的基础，从而防止其扩散。

(6.)等渗性脱水的常见原因是

- A. 肠痿
- B. 严重腹泻
- C. 高热
- D. 大面积烧伤
- E. 长期胃肠减压

正确答案： D

参考解析：

等渗性脱水在急性腹膜炎、急性肠梗阻和大量呕吐及大面积烧伤等最为常见。

(7.) 月经周期正常的妇女宫颈黏液开始出现羊齿叶状结晶是在其周期

- A. 4~5d
- B. 6~7d
- C. 8~9d
- D. 10~11d
- E. 12~13d

正确答案： B

参考解析：排卵前随雌激素水平不断增高，宫颈黏液分泌量逐渐增多，并变稀薄透明，有利于精子通行。至排卵前黏液拉丝可长达 10cm 以上。取黏液涂于玻片，干燥后可见羊齿植物叶状结晶。排卵后，受孕激素影响，黏液分泌量减少，变混浊黏稠，拉丝易断，不利于精子通过，涂片干后，可见成排的椭圆体。羊齿叶状结晶在月经周期的第 6~7 日开始出现，到排卵期最典型。【该题针对“生殖器官的周期性变化”知识点进行考核】

(8.) 肝脏的功能不包括

- A. 参与蛋白质合成
- B. 参与脂类转化
- C. 药物的转化和解毒
- D. 参与糖类和维生素分解
- E. 产生并储存胆汁

正确答案： E

参考解析：肝脏具有分泌胆汁的功能，胆囊具有浓缩和储存胆汁的功能。【该题针对“基础知识-肝脏解剖生理”知识点进行考核】

(9.) 下列关于肾病综合征病因及发病机制的描述，哪项错误

- A. 肝合成脂蛋白增加及脂蛋白分解和外周利用减弱导致高脂血症
- B. “球-管失衡”和肾小球滤过分数下降，导致水钠潴留，形成肾性水肿
- C. 低白蛋白血症导致血浆胶体渗透压降低，水分外渗，加上水钠潴留导致水肿
- D. 白蛋白从尿中丢失，同时肾小管对重吸收的蛋白进行分解，导致低白蛋白血症
- E. 肾小球滤过膜对血浆蛋白的通透性增加，当超过近曲小管回吸收量时形成大量蛋白尿

正确答案： B

参考解析：肾性水肿按其发生机制的不同分为两类，一为肾炎性水肿，产生机制为“球-管失衡”和肾小球滤过分数下降，导致水钠潴留；一类为肾病性水肿，产生机制为大量蛋白尿，致低蛋白血症，使血浆胶体渗透压下降，水分自血管进入组织间隙出现水肿。肾病综合征的水肿为肾病性水肿，非肾炎性，因此 B 的叙述与肾病综合征的发病无关。【该题针对“原发性肾病综合征”知识点进行考核】

(10.) 诊断小儿营养不良，且不受肝功能影响的较好指标是

- A. 血浆胆固醇
- B. 血清白蛋白
- C. 胰岛素样生长因子 1
- D. 生长激素
- E. 身高、体重

正确答案： C

参考解析：小儿营养不良辅助检查：最突出的表现是血清白蛋白浓度降低；胰岛素样生长因子 1（IGF-1）水平下降，由于其出现在身高（长）、体重等体格发育指标改变前，而且不受肝功能的影响，被认为是诊断营养不良的较好指标。

【该题针对“基础知识-营养不良病因及发病机制、辅助检查”知识点进行考核】

(11.) 正常心电图上表示冲动从心房传导到心室的时间是

- A. P 波
- B. P-R 间期
- C. QRS 波
- D. T 波
- E. U 波

正确答案： B

参考解析：P 波是左右心房兴奋后产生的，P-R 间期是冲动从心房传导到心室的时间，QRS 波为两个心室兴奋后的复合波，T 波反映心室兴奋后再极化的过程，U 波为心肌普肯耶细胞再极化后形成的波。

【该题针对“心律失常 * ”知识点进行考核】

(12.) 中毒性痢疾多见于

- A. 1~2 岁
- B. 3~5 岁
- C. 2~5 岁
- D. 2~7 岁
- E. 青春期

正确答案： D

参考解析：中毒型细菌性痢疾是急性细菌性痢疾的危重型，表现为急起高热、反复惊厥、嗜睡、昏迷，迅速发生循环衰竭或（和）呼吸衰竭。以 2~7 岁健康儿童多见，病死率高。**【该题针对“基础知识-中毒型细菌性痢疾病因发病机制、流行病学、辅助检查”知识点进行考核】**

(13.) 心脏病患者可以妊娠的情况是

- A. 心功能 I ~ II 级
- B. 心力衰竭史

- C. 肺动脉高压史
- D. 围生期心肌病遗留心脏肥大
- E. 稍轻微活动后有胸闷气喘者

正确答案： A

参考解析：心脏病不影响病人受孕。心功能 I ~ II 级，无心力衰竭病史，且无其他并发症者，在密切监护下可以妊娠，必要时给予治疗。但有下列情况者一般不宜妊娠：心功能 III ~ IV 级、既往有心力衰竭病史、肺动脉高压、严重心律失常、右向左分流型先天性心脏病（法洛四联症等）、围生期心肌病遗留有心脏扩大、并发细菌性心内膜炎、风湿热活动期等。如已妊娠应在早期终止。

【该题针对“心脏病”知识点进行考核】

(14.) 慢性阻塞性肺气肿引起的呼吸困难属于

- A. 吸气性
- B. 呼气性
- C. 呼气延长
- D. 混合性
- E. 夜间阵发性

正确答案： B

参考解析：慢性阻塞性肺气肿引起的呼吸困难属于呼气性呼吸困难。【该题针对“慢性阻塞性肺气肿”知识点进行考核】

(15.) 临产后阴道检查了解胎头下降程度，标志点为

- A. 骶岬
- B. 坐骨棘
- C. 坐骨结节
- D. 子宫颈口
- E. 耻骨联合下缘

正确答案： B

参考解析：临床上以观察胎头下降的程度，作为判断产程进展的重要标志。胎头下降程度可通过肛门检查或阴道检查，先露部颅骨最低点与坐骨棘的关系来确定。若先露部颅骨最低点在坐骨棘水平时以“0”表示，棘上 1cm 为“-1”，棘下 1cm 为“+1”，依此类推。

【该题针对“正常分娩妇女的护理*”知识点进行考核】

(16.) 某孕妇妊娠 40 周，规律性腹痛 20 小时，破膜 6 小时，宫底剑突下 1 指，母体腹部右下方触及圆而硬的胎头，胎心位于脐耻之间，胎手脱出于阴道外口，右肩已入阴道内骶岬前方，胎位最正确的诊断是

- A. 肩右前位
- B. 肩右后位
- C. 肩右横位
- D. 肩左前位

E. 肩左后位

正确答案： B

参考解析：胎头在母体腹部左侧，右手脱出为肩左前位，左手脱出为肩左后位；胎头在母腹右侧，左手脱出为肩右前位，右手脱出为肩右后位。【该题针对“胎产式、胎先露、胎方位”知识点进行考核】

(17.)4个月小儿，近一个月来流涎多。吃奶好，不哭闹，口腔黏膜无异常发现，应考虑为

- A. 疱疹性口腔炎
- B. 溃疡性口腔炎
- C. 生理性流涎
- D. 鹅口疮
- E. 单纯性口腔炎

正确答案： C

参考解析：新生儿舌短而宽，口腔黏膜柔嫩，足月新生儿生后即具有较好的吸吮功能、吞咽功能；早产儿则较差。新生儿唾液腺发育不成熟，3~4个月时唾液分泌逐渐增多，5~6个月时更为显著，但尚不能及时吞咽所分泌的唾液，故常出现生理性流涎。【该题针对“基础知识-小儿消化系统解剖生理特点”知识点进行考核】

(18.)关于母乳喂养的优点，正确的叙述是

- A. 清蛋白和球蛋白多，酪蛋白少，容易吸收
- B. 含饱和脂肪酸多，利于消化吸收
- C. 含铁量高，易吸收
- D. 矿物质含量比牛奶高
- E. 母乳中维生素D含量高

正确答案： A

参考解析：母乳喂养的优点①蛋白质总量虽较少，但其中白蛋白多而酪蛋白少，故在胃内形成凝块小，易被消化吸收；②含不饱和脂肪酸的脂肪较多。供给丰富的必需脂肪酸，脂肪颗粒小，又含较多解脂酶，有利于消化吸收；③乳糖量多，可促进肠道乳酸杆菌生长；④含微量元素如锌、铜，碘较多，母乳铁含量虽与牛乳相似，但其铁吸收率达49%，而牛乳中仅4%，故母乳喂养者贫血发生率低；⑤钙磷比例适宜（2:1），易于吸收，故较少发生佝偻病；⑥含较多的消化酶如淀粉酶、乳脂酶等，有助于食物消化。【该题针对“母乳喂养”知识点进行考核】

(19.)枕右前位胎头通过软产道时进行内旋转，是使胎头的

- A. 矢状缝与骨盆入口横径相一致
- B. 矢状缝与中骨盆横径相一致
- C. 矢状缝与中骨盆前后径相一致
- D. 前囟转至耻骨弓下面

E. 后囟转至骶骨前方

正确答案： C

参考解析：胎头为适应骨盆纵轴而旋转，使其矢状缝与中骨盆及骨盆出口前后径相一致，称为内旋转。

(20.)关于紧急避孕，错误的叙述是

- A. 已确定妊娠的妇女不能应用紧急避孕
- B. 宫内节育器可作为紧急避孕的措施
- C. 应于无保护性生活 3~7 天内使用
- D. 紧急避孕药适合于仅需临时避孕的妇女
- E. 目的是防止非意愿性妊娠

正确答案： C

参考解析：紧急避孕是指在无防护性措施情况下性生活后或避孕失败后 3 天内采取的防止妊娠的避孕方法。【该题针对“避孕方法及护理”知识点进行考核】

(21.)骨盆轴是指

- A. 骨盆入口与地平面的垂直线
- B. 骨盆出口与地平面的垂直线
- C. 中骨盆平面与地面垂直线
- D. 贯穿骨盆各平面中心点的假想轴线
- E. 骨盆入口平面的横径

正确答案： D

参考解析：贯穿骨盆各平面中心点的假想轴线为骨盆轴，此轴上段向下向后，中段向下，下段向下向前，顺产时胎儿沿此轴娩出。【该题针对“女性生殖系统解剖生理-骨盆”知识点进行考核】

(22.)生长发育速度最快的时期是

- A. 新生儿期
- B. 婴儿期
- C. 幼儿期
- D. 学龄前期
- E. 学龄期

正确答案： B

参考解析：婴儿时期为小儿出生后生长发育最迅速的时期，因此对热能和营养素尤其是蛋白质的需要量相对较大。【该题针对“基础知识-小儿生长发育及其影响因素”知识点进行考核】

(23.)小儿脊柱发育的第 2 个弯曲在

- A. 6 个月后会坐时出现胸椎后凸
- B. 1 岁左右开始行走时出现腰椎前凸
- C. 3 个月随抬头动作的发育出现颈椎前凸

- D. 7 个月后会坐时出现胸椎后凸
- E. 6~7 岁时韧带发育后

正确答案： A

参考解析：新生儿时脊柱仅轻微后凸，3 个月左右随抬头动作的发育出现颈椎前凸，此为脊柱第 1 个弯曲；6 个月后会坐时出现胸椎后凸，为脊柱第 2 个弯曲；1 岁左右开始行走时出现腰椎前凸，为脊柱第 3 个弯曲。【该题针对“基础知识-小儿体格生长及评价”知识点进行考核】

(24.) 肺癌组织学分类中，女性多见的是

- A. 鳞状上皮细胞癌
- B. 小细胞未分化癌
- C. 大细胞未分化癌
- D. 腺癌
- E. 细支气管肺泡癌

正确答案： D

参考解析：在肺癌中，腺癌女性多见，占肺癌的 1/4。【该题针对“原发性支气管肺癌”知识点进行考核】

(25.) 引起风湿病皮肤损害的常见原因是

- A. 感染
- B. 血管炎性反应
- C. 机械性损伤
- D. 过敏反应
- E. 药物反应

正确答案： B

参考解析：风湿病常见的皮肤损害有皮疹、红斑、水肿、溃疡等，多由血管炎性反应引起。【该题针对“风湿性疾病概述*”知识点进行考核】

(26.) 对流行性脑脊髓膜炎哪项检查有助于快速诊断本病

- A. 血象
- B. 脑脊液检查
- C. 影像学检查
- D. 咽拭子细菌培养
- E. 免疫学检测

正确答案： E

参考解析：免疫学检测：目前，临床常用抗原检测方法检测脑脊液中的抗原，其敏感性高，特异性强，是近年来开展的流脑快速诊断方法。【该题针对“流行性脑脊髓膜炎*”知识点进行考核】

(27.) 成人缺铁性贫血最常见的病因是

- A. 铁摄入不足
- B. 铁丢失过多

- C. 慢性胃炎
- D. 慢性感染
- E. 慢性失血

正确答案： E

参考解析：慢性失血是成人缺铁性贫血最多见、最重要的原因，反复多次少量出血可使体内储存铁逐渐耗竭，如消化性溃疡出血、肠息肉、肠道肿瘤、月经过多、痔出血等。【该题针对“贫血”知识点进行考核】

(28.)低钙血症见于以下哪些疾病

- A. 高磷酸血症
- B. 消化道痿
- C. 急性重症胰腺炎
- D. 肾衰
- E. 以上均是

正确答案： E

参考解析：低钙血症见于急性重症胰腺炎、坏死性筋膜炎、消化道痿、肾衰、高磷酸血症、甲状旁腺功能受损等。甲状旁腺功能受损多发生在甲状腺手术或颈部放射治疗的病人。

(29.)符合临终关怀伦理的做法是

- A. 研制更加安全可靠的药物，帮助患者安详辞世
- B. 让患者了解死亡是每个人都不可避免的
- C. 想方设法延长患者的生命，以使其获得更长的寿命
- D. 由于临终患者生命质量通常都比较低，没有幸福可言，应及早放弃治疗
- E. 努力减轻临终患者的身体疼痛和心理不适，提高其生命质量

正确答案： E

参考解析：临终关怀目标是提高患者的生命质量，通过消除或减轻病痛与其他生理症状，排解心理问题和精神烦恐，令病人内心宁静地面对死亡。同时，临终关怀还能够帮助病患家人承担一些劳累与压力。

(30.)对胎膜早破的描述，正确的是

- A. 机械性刺激、感染、宫口松弛等因素均可能造成胎膜早破
- B. 胎膜早破必然导致早产
- C. 在临产前人工破膜也属于胎膜早破
- D. 胎膜早破者羊膜镜检查可见羊膜囊
- E. 胎膜早破者的阴道液酸碱度检查 $\text{pH} \leq 6.5$

正确答案： A

参考解析：

胎膜早破是指在临产前胎膜自然破裂。1. 机械性刺激：创伤或妊娠后期性交，增加了绒毛、羊膜感染的机会，引起胎膜炎。2. 羊膜腔内压力升高：常见于多胎妊娠、羊水过多等。3. 宫颈内口松弛：易导致感染和前羊膜囊受力不均而发生胎膜早破。4. 下生殖道感染：可由细菌、病毒或弓形虫引起。5. 胎膜发育不良：可致胎膜菲薄脆弱而发生破裂。【该题针对“胎膜早破”知识点进行考核】

(31.) 下列与真假骨盆分界有关的是

- A. 坐骨结节
- B. 坐骨棘
- C. 骶岬上缘
- D. 耻骨降支
- E. 骶尾关节

正确答案： C

参考解析：骨盆入口平面：前方为耻骨联合上缘，两侧为髂耻缘，后面为骶岬前缘。是真假骨盆的交界面，呈横椭圆形。【该题针对“女性生殖系统解剖生理-骨盆”知识点进行考核】

(32.) 月经来潮前 24 小时取子宫内膜，病理检查提示分泌不良，可能是

- A. 宫外孕
- B. 黄体功能不足
- C. 子宫内膜不规则脱落
- D. 流产
- E. 无排卵

正确答案： B

参考解析：受卵巢雌、孕激素的影响，子宫内膜会发生周期性变化，在月经来潮前 24 小时应呈分泌期分化，此时若分泌不良，说明产生孕激素的黄体功能不足。故选 B。【该题针对“女性生殖系统解剖生理-内生殖器”知识点进行考核】

(33.) 下面几种头先露哪种最常见

- A. 面先露
- B. 枕先露
- C. 顶先露
- D. 额先露
- E. 前凶先露

正确答案： B

参考解析：枕先露占 95.55%~97.55%，以枕左前位最多见。【该题针对“正常分娩妇女的护理”知识点进行考核】

(34.) 8 个月小儿的体重，按公式粗略估计应为

- A. 8.0kg

- B. 8.5kg
- C. 7.5kg
- D. 7.0kg
- E. 9.0kg

正确答案： A

参考解析：7~12个月：体重(kg)=6(kg)+月龄×0.25(kg)。【该题针对“基础知识-小儿体格生长及评价”知识点进行考核】

(35.)下述哪项不是儿科护士角色的内容

- A. 直接护理者
- B. 患儿及家长的批评监督者
- C. 患儿的代言人
- D. 健康与预防的指导者
- E. 合作与协调者

正确答案： B

参考解析：儿科护士角色：（一）护理活动执行者；（二）护理计划者；（三）健康教育者；（四）健康协调者；（五）健康咨询者；（六）患儿代言人；（七）护理研究者。【该题针对“基础知识-第一章绪论”知识点进行考核】

(36.)颅内容物主要包括的三个部分是

- A. 脑组织、脑脊液和组织液
- B. 脑组织、脑脊液和淋巴
- C. 脑组织、脑脊液和血液
- D. 脑组织、组织液和淋巴
- E. 脑室、脑脊液和血液

正确答案： C

参考解析：颅内容物主要包括的三个部分是：脑组织、脑脊液和血液，记忆便可。【该题针对“神经系统疾病概述”知识点进行考核】

(37.)慢性肺源性心脏病形成最关键的病理基础是

- A. 气道不畅
- B. 肺组织弹性下降
- C. 右心室肥大
- D. 肺动脉高压
- E. 右心房肥大

正确答案： D

参考解析：肺源性心脏病是指由支气管肺组织，胸廓或肺动脉系统病变所致肺血管阻力增加，产生肺动脉高压等多种因素的心脏病。【该题针对“慢性肺源性心脏病”知识点进行考核】

(38.)伤寒杆菌的主要致病因素是

- A. 鞭毛
- B. 荚膜
- C. 外毒素
- D. 内毒素

E. 透明质酸酶

正确答案： D

参考解析：伤寒杆菌内毒素是致病的主要因素。【该题针对“伤寒”知识点进行考核】

(39.) 冠心病最常见的表现类型是

- A. 重度主动脉瓣病变
- B. 冠状动脉栓塞
- C. 冠状动脉粥样硬化
- D. 肥厚型心肌病
- E. 冠脉痉挛

正确答案： C

参考解析：冠心病最常见的表现类型是冠状动脉粥样硬化。【该题针对“冠状动脉粥样硬化性心脏病”知识点进行考核】

(40.) 我国二尖瓣关闭不全的最常见原因是

- A. 风心病
- B. 二尖瓣脱垂
- C. 冠心病乳头肌功能失调
- D. 二尖瓣环及环下钙化
- E. 结缔组织病

正确答案： A

参考解析：风湿性炎性病变使瓣叶僵硬、变性、瓣缘卷缩、连接处融合及腱索融合缩短，使心室收缩时两瓣叶关闭不全。【该题针对“心脏瓣膜病”知识点进行考核】

(41.) 服用过量的维生素 D 可导致

- A. 低钙血症
- B. 高镁血症
- C. 高钙血症
- D. 高磷血症
- E. 低镁血症

正确答案： C

参考解析：高钙血症主要见于甲状旁腺增生或腺瘤等甲状旁腺功能亢进；骨转移癌，由于骨组织的破坏，骨钙大量释放，血钙增高；服用过量的维生素 D。

【该题针对“基础知识-钙、镁、磷代谢异常（病因）”知识点进行考核】

(42.) 建立和发展社会主义医患关系应该以哪项为原则

- A. 四项基本原则
- B. 社会主义的人道主义
- C. 人本主义
- D. 科学主义

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/335100100030012131>