

临床诊断学知识考核试题题库

一、选择题

1.下列哪项不属于现病史:() [单选题] *

A.主要症状

B.伴随症状

C.一般情况

D.预防注射情况✓

E.诊疗经过

2.问诊时不恰当的提问是:() [单选题] *

A.什么情况疼痛加重

B.发病后用过那些药物

C.多在什么情况下发病

D.您的尿液是红色的吗✓

E.您哪儿不舒服

3.稽留热最常见于下列哪种疾病:() [单选题] *

A.急性支气管炎

B.伤寒✓

C.肺结核

D.疟疾

E.风湿热

4.回归热型见于() [单选题] *

- A.伤寒
- B.大叶性肺炎
- C.霍奇金病✓
- D.肺结核
- E.败血症

5.咳大量脓臭痰最常见的疾病是:() [单选题] *

- A.肺脓肿✓
- B.慢性支气管炎
- C.大叶性肺炎
- D.支气管哮喘
- E.肺结核

6.长期反复咯血伴脓痰量多,应首先考虑:() [单选题] *

- A.肺炎
- B.支气管炎
- C.支气管扩张✓
- D.支气管哮喘
- E.支气管肺癌

7.咯砖红色胶冻样血痰:() [单选题] *

- A.肺炎球菌性肺炎
- B.克雷白杆菌性肺炎✓
- C.支原体性肺炎

D.军团菌肺炎

E.病毒性肺炎

8.下列哪项可引起金属音调咳嗽:() [单选题] *

A.纵膈肿瘤✓

B.声带炎

C.喉炎

D.喉结核

E.喉癌

9.目前,我国肺部疾病出现咯血最常见于:() [单选题] *

A.肺炎

B.肺脓肿

C.肺结核✓

D.肺梗死

E.肺癌

10.便血伴里急后重可见于:() [单选题] *

A.胃癌

B.败血症

C.小肠疾病

D.肝癌

E.直肠癌✓

11.为鉴别黑粪是否真出血,下列哪项最有意义:() [单选题] *

A.检查大便颜色是否里外一致

B.用显微镜检查是否有完整的红细胞✓

C.大便隐血试验

D.用抗人血红蛋白抗体查粪便隐血

E.询问病史包括近3天有否吃肉或含水量铁药品或蔬菜史

12.呕吐大量隔夜宿食可见于:() [单选题] *

A.急性胃炎

B.慢性胃炎

C.消化性溃疡

D.急性肝炎

E.幽门梗阻✓

13.黑便并蜘蛛痣和肝掌可见于:() [单选题] *

A.直肠癌

B.胃癌

C.溃疡性结肠炎

D.肝硬化门脉高压✓

E.胆管癌

14.一般认为上消化道出血量在多少毫升以上时,大便隐血试验出现阳性() [单选题] *

A.5ml✓

B.50ml

C.75ml

D.100ml

E.150ml

15.对肝源性水肿描述正确的是:() [单选题] *

A.头面部及上肢常无水肿✓

B.伴有颈静脉怒张

C.无蛋白代谢异常

D.不可能首先出现踝部水肿

E.必定存在肝肿大

16.非压陷性水肿常见于:() [单选题] *

A.肝硬化

B.慢性肾小球肾炎

C.粘液性水肿✓

D.右心功能不全

17.下列哪项不是水肿发生的机制:() [单选题] *

A.毛细血管滤过压升高

B.毛细血管渗透性增强

C.组织压力增高✓

D.血浆胶体渗透压降低

18.心源性水肿最常见的病因是:() [单选题] *

A.左心衰竭

B.右心衰竭✓

C.右心衰竭

D.缩窄性心包炎

E.心绞痛

19.水肿的产生机理不包括:() [单选题] *

- A.钠、水潴留
- B.毛细血管滤过压升高
- C.毛细血管通透性增高
- D.血浆胶体渗透压增高✓
- E.淋巴液或静脉回流受阻

20.下列哪项不属于胆汁瘀积性黄疸:() [单选题] *

- A.肝内胆管结石
- B.长期服用甲基睾丸酮所致黄疸
- C.毛细胆管型病毒性肝炎
- D.肝硬化✓
- E.妊娠复发性黄疸

21.下列哪一项不是溶血性黄疸的特征:() [单选题] *

- A.黄疸一般为轻度,呈浅柠檬色
- B.皮肤无瘙痒
- C.皮肤无瘙痒
- D.骨髓增生旺盛✓
- E.急性溶血时可有发热、寒战、头痛、呕吐和血红蛋白尿

22.下列哪些疾病所致发绀属于周围性发绀:() [单选题] *

- A.肺水肿
- B.右心衰✓
- C.真性红细胞增多症

D.肺栓塞

E.艾森曼格综合征

23.以夜间阵发性呼吸困难为突出表现，见于：() [单选题] *

A.喉头水肿

B.左心衰竭✓

C.肺癌

D.气胸

E.胸骨骨折

24.患者 CO 中毒引起的呼吸困难应属于：() [单选题] *

A.心源性呼吸困难

B.中毒性呼吸困难✓

C.血源性呼吸困难

D.混合性呼吸困难

E.神经、精神性呼吸困难

25.呼吸困难病人出现“三凹征”，提示：() [单选题] *

A.肺部炎症

B.胸膜炎

C.气管、大支气管阻塞✓

D.小支气管阻塞

E.肺结核

26.伤寒或副伤寒常出现：() [单选题] *

A.斑疹

B.丘疹

C.斑丘疹

D.玫瑰疹✓

E.荨麻疹

27.患者张某，述劳累后呼吸困难，体检见其两颊紫红，面色晦暗，口唇发绀，考虑：() [单选题] *

A.贫血面容

B.粘液性水肿面容

C.面具面容

D.二尖瓣面容✓

E.病危面容

28.关于腋测法测体温，下列哪项是正确的？() [单选题] *

A.腋测法测体温优点是安全、简便，不易产生交叉感染✓

B.腋测法为体腔外测量，欠可靠

C.正常值为 35-37 摄氏度

D.冬季老年危重患者，为避免受凉，体温计可放在腋下隔一层内衣测量

E.高热患者，腋下测量体温只需 5 分钟

29.下列关于意识状态的概念，哪项是错误的？() [单选题] *

A.意识状态是大脑功能活动的综合表现，即对环境的直觉状态

B.凡是能影响大脑功能活动的疾病均可引起程度不等的意识改变

C.根据意识障碍的程度，简要分为嗜睡、意识模糊、谵妄、昏睡、昏迷

D.临床上检查意识状态的方法一般多为视诊来观察✓

E.正常人意识清晰，定向力正常，反应敏锐精确，思维和情感活动正常

30.镜面舌见于:() [单选题] *

- A.长期发热
- B.叶酸缺乏
- C.缺铁性贫血✓
- D.核黄素缺乏
- E.梅毒性舌炎

31.双侧眼睑闭合障碍见于:() [单选题] *

- A.甲亢✓
- B.重症肌无力
- C.砂眼
- D.结膜炎
- E.青光眼

32.瞳孔缩小见于:() [单选题] *

- A.可卡因药物反应
- B.视神经萎缩
- C.有机磷中毒✓
- D.阿托品中毒
- E.青光眼绝对期

33.妇女如发生周期性鼻出血,则应考虑:() [单选题] *

- A.高血压病
- B.高血压病
- C.维生素 K 缺乏

D.子宫内膜异位症✓

34.小儿佝偻病头颅改变是:() [单选题] *

A.尖颅

B.方颅✓

C.巨颅

D.变形颅

35.双侧肺下界在锁骨中线、腋中线、肩胛线分别位于第几肋间?() [单选题] *

A.7、9、11

B.6、8、10✓

C.5、7、9

D.10、12、12

E.右为6、8、10,左为5、7、9

36.Louis 角是指下列哪个部位?() [单选题] *

A.腹上角

B.胸骨下角

C.胸骨角✓

D.胸骨柄

E.胸骨体

37.下列成年人胸廓前后径与横径之比其中哪项属正常?() [单选题] *

A.1 : 1

B.1 : 2

C.1.5 : 1

D.2 : 3✓

E.3 : 2

38.关于干啰音的叙述，下列哪项是正确的：() [单选题] *

A.高调干啰音多起源于较小支气管或细支气管✓

B.哨笛音又称鼾音

C.鼾音调高，其频率为 100 ~ 200Hz

D.哨笛音用力吸气时其音质呈上升性

E.干啰音根据音调高低分为高、中、低调三种

39.语音震颤强弱的因素主要取决于：() [单选题] *

A.支气管距胸壁的距离

B.气管、支气管是否畅通，胸壁传导是否良好✓

C.胸壁厚薄

D.胸壁厚薄

E.性别

40.呼气性呼吸困难最常见于：() [单选题] *

A.肺炎

B.胸膜炎

C.阻塞性肺气肿✓

D.气管阻塞

E.肋骨骨折

41.水冲脉临床上主要见于：() [单选题] *

A.缩窄性心包炎

B.二尖瓣狭窄

C.二尖瓣关闭不全

D.主动脉瓣狭窄

E.主动脉瓣关闭不全✓

42.第一心音减弱不出现于下列何种情况 :() [单选题] *

A.心肌炎

B.心肌病

C.心肌梗死

D.二尖瓣狭窄✓

E.二尖瓣关闭不全

43.胸骨右缘第二听诊区为 :() [单选题] *

A.二尖瓣听诊区

B.三尖瓣听诊区

C.肺动脉瓣听诊区

D.主动脉瓣听诊区✓

E.主动脉瓣第二听诊区

44.正常人心尖搏动范围直径约为 :() [单选题] *

A.1.0-1.5cm

B.2.0-2.5cm✓

C.3.0-3.5cm

D.4.0-4.5cm

E.5.0-5.5cm

45.右心室肥大时，心尖搏动的位置为：() [单选题] *

A.向右下移位

B.向左下移位

C.向左移位✓

D.向右移位

E.向上移位

46.毛细血管搏动征的检查部位是：() [单选题] *

A.舌尖

B.耳垂

C.睑结膜

D.指甲末端✓

E.手指末端

47.关于心电图临床诊断价值的表述，不正确的是：() [单选题] *

A.心电图对心律失常的分析和诊断具有肯定的临床价值

B.心电图对心肌梗死的诊断和定位有重要价值

C.心电图可确诊房室肥大✓

D.心电图可发现某些遗传性离子通道病有重要作用

48.代表心房除极的波是：() [单选题] *

A.P 波✓

B.QRS 波群

C.ST 段

D.T 波

49.代表心室缓慢复极是:() [单选题] *

A.P 波

B.QRS 波

C.ST 段✓

D.T 波

E.U 波

50.关于正常人 Q 波的描述, 错误的是:() [单选题] *

A.Q 波振幅不超过同导联 R 波 1/4

B.Q 波时间不超过 0.04s

C.aVR 导联可见宽的 Q 波

D.V1 导联可呈 QS 波

E.V1~V2 导联可有小 q 波✓

51.心脏兴奋由窦房结传导至房室结, 表现在心电图上的相应部分是() [单选题] *

A.Q 波

B.PR 间期✓

C.QT 间期

D.ST 段

E.P 波

52.缺铁性贫血时红细胞呈现:() [单选题] *

A.小细胞低色素性贫血✓

B.正常细胞正常色素性贫血

C.大细胞性贫血

D.镰形 RBC

E.缗钱状

53.关于血尿描述正确的是:() [单选题] *

A.尿沉渣高倍镜下视野红细胞>5 个

B.尿沉渣低倍镜下视野红细胞>5 个

C.尿沉渣高倍镜下视野红细胞>3 个✓

D.尿沉渣低倍镜下视野红细胞>3 个

E.1000ml 尿液含有 10ml 血方可表现为肉眼血尿

54.霍乱,副霍乱患者的大便性状为:() [单选题] *

A.粘液便

B.脓血便

C.鲜血便

D.米泔样便✓

E.冻状便

55.多发性骨髓瘤患者可出现:() [单选题] *

A.肾小球性蛋白尿

B.肾小管性蛋白尿

C.混合性蛋白尿

D.溢出性蛋白尿✓

E.组织性蛋白尿

56.粪便隐血试验持续阳性常见于:() [单选题] *

A.溃疡病

B.胃癌✓

C.食肉动物血

D.肠结核

E.溃疡性结肠息肉

57.正常人尿中可出现:() [单选题] *

A.细胞管型

B.颗粒管型

C.透明管型✓

D.蜡样管型

E.脂肪管型

58.尿胆原减少或缺如见于:() [单选题] *

A.慢性肝炎

B.溶血性贫血

C.顽固性便秘

D.碱性尿时

E.胆道梗阻✓

59.检查肌力时病人必须:() [单选题] *

A.意识清楚,检查合作✓

B.被动运动

C.有肌肉瘫痪

D.有肌肉萎缩

E.神志不清,最好在昏迷状态下

60.深反射不包括 : () [单选题] *

A.肱二头肌反射

B.跖反射 ✓

C.肱三头肌反射

D.桡骨骨膜反射

E.膝反射

61.匙状甲多见于 : () [单选题] *

A.支气管扩张

B.支气管肺癌

C.缺铁性贫血 ✓

D.风湿热

E.甲癣

62.尺神经损伤者手部改变为 : () [单选题] *

A.爪形手 ✓

B.匙状甲

C.杵状指

D.梭形指

E.垂腕

63.以下不是全腹膨隆原因的是 : () [单选题] *

A.腹腔积液

B.腹内积气

C.腹内巨大肿块

D.肥胖

E.斜疝✓

64.肠鸣音活跃常见于 : () [单选题] *

A.腹膜炎

B.肠麻痹

C.机械性肠梗阻

D.急性胃肠炎✓

E.低钾血症

65.正常心尖搏动位置在 : () [单选题] *

A.胸骨左缘第 5 肋间锁骨中线内 0.5—1.0cm 处✓

B.胸骨左缘第 5 肋间锁骨中线外 0.5—1.0cm 处

C.胸骨左缘第 5 肋间锁骨中线内 1.5—2.0cm 处

D.胸骨左缘第 5 肋间锁骨中线外 1.5—2.0cm 处

E.胸骨左缘第 5 肋间锁骨中线内 2.0—2.5cm 处

66.二尖瓣狭窄患者叩诊心界呈梨形，是由于 : () [单选题] *

A.左、右心室均增大

B.左心房和右心室增大

C.右心房和右心室增大

D.左心房及肺动脉段扩大✓

E.右心房及肺动脉段扩大

67.腹式呼吸减弱的原因应除外 : () [单选题] *

A.腹水

B.急性腹痛

C.胃肠穿孔所致急性腹膜炎或膈麻痹✓

D.腹内巨大肿物

E.足月妊娠

68.肝脏触诊时，浮沉触诊法用于下列哪种情况：() [单选题] *

A.腹膜炎时肝脏触诊

B.大量腹水时肝脏触诊✓

C.肥胖患者的肝脏触诊

D.单手触诊不满意时

E.双手触诊不满意时

69.正常人腹部的叩诊音是：() [单选题] *

A.清音

B.浊音

C.鼓音✓

D.实音

E.过清音

70.脾高度肿大常见于：() [单选题] *

A.慢性粒细胞白血病✓

B.肝硬化

C.慢性溶血性黄疸

D.急性肝炎

E.慢性肝炎

71.下列对老年人的判断，哪项不正确？() [单选题] *

- A.角膜老年环见于 60 岁以上的老年人
- B.老年人皮肤弹性减低
- C.大多数老年人均有牙齿脱落
- D.头发变白或毛发稀疏肯定以属老年人✓
- E.老年人大多数肌肉萎缩松弛

72.恶病质是指：() [单选题] *

- A.病危者
- B.极度消瘦者✓
- C.被动体位的患者
- D.高热昏迷者
- E.典型无力型者

73.患者不能自己调整或变换肢体的位置，称为：() [单选题] *

- A.自主体位
- B.被动体位✓
- C.强迫体位
- D.强迫仰卧位
- E.强迫侧卧位

74.血红蛋白尿见于：() [单选题] *

- A.地中海贫血
- B.肾结核
- C.蚕豆病✓

D.血友病

E.膀胱炎

75.下列属于贮存铁的是:() [单选题] *

A.血红蛋白铁

B.肌红蛋白铁

C.转铁蛋白结合的铁

D.乳铁蛋白结合的铁

E.含铁血黄素✓

76.有关“胆红素代谢”的描述,错误的是:() [单选题] *

A.游离胆红素于血循环中形成胆红素-白蛋白复合物运载到肝

B.游离胆红素与葡萄糖醛酸基相结合形成结合胆红素

C.衰老红细胞所释放的血红蛋白是胆红素主要来源

D.结合胆红素大部分进入体循环经肾排出✓

E.在肝窦内胆红素被肝细胞微突所摄取

77.黑便的形成机制是便中含有:() [单选题] *

A.高铁血红蛋白

B.硫化血红蛋白

C.正铁血红蛋白

D.硫化亚铁✓

E.氢氧化铁

78.共济运动检查不包括:() [单选题] *

A.是否有震颤

B.指鼻试验

C.跟—膝—胫试验

D.快速轮替动作✓

E.闭目难立征

79.运动功能检查不包括:() [单选题] *

A.神经反射检查✓

B.肌力

C.肌张力

D.不随意运动

E.共济运动

80.下列哪项属于脑膜刺激征:() [单选题] *

A.Kernig 征✓

B.Babinski 征

C.Oppenheim 征

D.Gordon 征

E.Chaddock 征

81.关于肌张力的描述,下列哪项是正确的:() [单选题] *

A.是指肢体作某种主动运动时肌肉最大的收缩力

B.除肌肉的收缩力外,还可以动作的幅度与速度来衡量

C.是指静息状态下的肌肉紧张度✓

D.肌张力增加时可表现为关节过伸

E.肌张力减弱见于锥体束损害

82.蛙腹见于下列哪种情况：B[单选题] *

A.腹膜有炎症或肿瘤浸润✓

B.腹腔大量积液

C.腹腔大量积气

D.腹腔巨大肿瘤

E.腹壁上的肿物

83.腹部柔韧感最常见于：D[单选题] *

A.胃穿孔✓

B.腹腔内出血

C.急性弥漫性腹膜炎

D.结核性腹膜炎

E.急性阑尾炎

84.肝触诊最常用的触诊法是：

A.双手触诊法✓

B.钩指触诊法

C.单手触诊法

D.冲击触诊法

E.浅部触诊法

85.支气管肺癌患者常出现：B[单选题] *

A.匙状甲✓

B.杵状指

C.肢端肥大症

D.膝内、外翻

E.足内、外翻

86.Murphy 征阳性见于：

A.急性胰腺炎✓

B.急性阑尾炎

C.急性胆囊炎

D.消化性溃疡

E.急性肝炎

87.板状腹可见于哪种疾病：E[单选题] *

A.急性阑尾炎✓

B.急性胰腺炎

C.急性胆囊炎

D.急性肠炎

E.急性胃穿孔

88.诊断阑尾炎的重要依据是：D[单选题] *

A.早期上腹痛或脐周痛✓

B.右下腹压痛

C.右下腹包块

D.右下腹 McBurney 点有显著而固定的压痛与反跳痛

E.早期上腹痛数小时后转为右下腹痛

89.肝脏肿大，质硬如触前额见于：D[单选题] *

A.急性肝炎✓

- B.肝淤血
- C.慢性肝炎
- D.肝癌
- E.脂肪肝

90.男，26岁，腹部剧烈阵发性绞痛3小时，伴呕吐，腹部检查发现肠鸣音8次/min，伴金属音。该

患者最有可能的诊断为：B[单选题] *

- A.血管性肠梗阻✓
- B.机械性肠梗阻
- C.急性胃肠炎
- D.急性胃肠出血
- E.麻痹性肠梗阻

91.关于震颤和杂音的关系，下列哪项是正确的 E[单选题] *

- A.震颤与杂音产生机制不同✓
- B.听到杂音一定能触到震颤
- C.低频振动容易听到
- D.高频振动容易触及
- E.一定条件下，杂音越响，震颤越强

92.剑突下搏动常见于：B[单选题] *

- A.左心室肥大✓
- B.右心室肥大
- C.胸腔积液
- D.右位心

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/335111040222011110>