

2024 福建省安溪县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题王牌题库 (历年真题)

第 I 部分 单选题 (100 题)

1. 患者于 1 周前无诱因出现咳嗽，咳嗽为阵发性，痰少，呈白色黏液性，不易咳出，同时出现发热，体温多在夜间升高，38℃左右，无畏冷、寒战、胸痛、咳血等，于卫生院治疗后，未见好转，并有气喘、气促，活动后呼吸困难等症状。入院治疗诊断为：肺炎。

A: 青壮年和无基础疾病的 CAP 患者，常用青霉素和第一代头孢菌素

B: 喹诺酮类抗菌药物有胃肠道反应，一般不用

C: CAP 常见病原体为肺炎链球菌、支原体、衣原体、流感嗜血杆菌和呼吸道病毒

D: 老人、有基础疾病或者需要住院的 CAP 患者常用第二、三代头孢菌素、 β -内酰胺类等

答案：B

2. III 期临床试验

A: 以特殊人群为给药对象

B: 以健康志愿者为给药对象

C: 以患者为给药对象

D: 以目标适应证患者为给药对象

答案：D

3. 痛风急性发作期应选用

A: 秋水仙碱

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 别嘌醇
- C: 丙磺舒
- D: 阿司匹林

答案：A

4. 老年人应该避免使用与疾病状态相关的潜在不适当用药。以下用于判断老年患者潜在不适当用药的依据是

- A: Bayesian 反馈法
- B: Beers 标准
- C: 数字评分法
- D: CTP 评分标准

答案：B

5. 肝功能检查，总胆红素数值超过正常值数倍可诊断为

- A: 心肌梗死
- B: 黄疸
- C: 痛风
- D: 贫血

答案：B

6. (致畸药物的种类与危害)可能导致胎儿泌尿生殖系统异常、指趾畸形的是

- A: 孕激素
- B: 雄激素
- C: 氮芥类
- D: 沙利度胺

答案：C

7. 急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔前可使用

- A: 2%过氧化氢溶液
- B: 3%酚甘油滴耳液
- C: 2%酚甘油滴耳液
- D: 3%过氧化氢溶液

答案：C

8. 关于该患者的治疗方案错误的是（）

- A: 在病原学送检后，可立即实施经验性抗菌治疗
- B: 抗菌药物应持续用至胸片 X 线病灶完全吸收
- C: 当体温正常 48~72h，且达到肺炎临床稳定标往后，可停用抗菌药物
- D: 病情稳定后可从静脉给药转为口服序贯治疗

答案：B

9. 关于药物作用相加或增加疗效的举例，克拉维酸钾、舒巴坦为 β -内酰胺酶抑制剂，使青霉素类、头孢菌素类等 β -内酰胺类抗生素免受开环破坏，抗菌疗效增强。是属于

- A: 延缓或降低抗药性
- B: 促进机体的吸收利用
- C: 作用于不同的靶位
- D: 保护药品免受破坏

答案：D

10. 下列药物中，患胸膜炎伴胸痛的咳嗽患者宜选用的药物是

- A: 羧甲司坦
- B: 可待因
- C: 苯丙哌林
- D: 喷托维林

答案：B

11. 与阿莫西林配伍，可提高治疗的是()

- A: 克拉维酸钾
- B: 奥美拉唑
- C: 苯丝肼
- D: 叶酸

答案：A

12. 饮用含葡萄柚汁的饮料可能影响一些药物药动学的机制是

- A: 抑制 CYP1A2
- B: 抑制 CYP3A4
- C: 诱导 CYP3A4
- D: 抑制 CYP2C9

答案：B

13. 下列药物中，驾驶员服用后可能出现嗜睡的是

- A: 雷尼替丁
- B: 奥美拉唑
- C: 双氯芬酸
- D: 布洛芬

答案：B

14. 慢性阻塞性肺病急性加重期伴脓痰者宜选用的治疗方案是()

- A: 抗菌药物+短效支气管舒张剂+糖皮质激素
- B: 吸入型糖皮质激素+磷酸二酯酶抑制剂
- C: 吸入型糖皮质激素+镇咳药+抗过敏药
- D: 长效 β_2 受体激动剂+吸入型糖皮质激素

答案：A

15. 消化性溃疡的用药注意事项中，服用最高剂量二甲双胍的糖尿病患者，长期服用 PPI，需补充

- A: 维生素 E
- B: 维生素 D3
- C: 维生素 B12
- D: 维生素 C

答案：C

16. 糖尿病合并肾病患者宜选用的药物是

- A: 格列苯脲
- B: 格列喹酮
- C: 二甲双胍
- D: 胰岛素

答案：B

17. 癌症患者出现突发性刺痛、戳痛时，可选用

- A: 丁溴东莨菪碱片
- B: 布洛芬混悬液
- C: 芬太尼注射剂
- D: 加巴喷丁

答案：D

18. 属于 HIV 蛋白酶抑制剂的是

- A: 奈韦拉平
- B: 扎西他滨
- C: 沙奎那韦

D: 恩夫韦替

答案: C

19. 氟马西尼用于解救的是 ()

A: 有机磷中毒

B: 三唑仑中毒

C: 汞中毒

D: 氰化物中毒

答案: B

20. 炎症性痤疮的首选外用抗菌药物是

A: 水杨酸软膏

B: 维 A 酸凝胶

C: 夫西地酸乳膏

D: 过氧化苯甲酰凝胶

答案: D

21. 左旋多巴治疗震颤麻痹时宜减少食用的是

A: 蛋白质

B: 食盐

C: 脂肪

D: 食醋

答案: A

22. 两种药物配伍容易形成白色沉淀的是 ()

A: 头孢曲松与复方氯化钠注射液

B: 头孢唑林钠与 0.9%氯化钠注射液

C: 青霉素与 5%葡萄糖注射液

D: 胰岛素与 0.9%氯化钠注射液

答案：A

23. 与两性霉素 B 配伍可以析出沉淀的溶媒是

A: 50%葡萄糖注射液

B: 5%葡萄糖注射液

C: 复方氯化钠注射液

D: 0.9%氯化钠注射液

答案：D

24. 患者，女，实验室检查：血红蛋白 95g/L，临床诊断为缺铁性贫血，处方口服硫酸亚铁片，下列向患者交代的用药注意事项，错误的是

A: 不宜同时进食牛奶和蛋类

B: 不宜与钙剂同时服用

C: 宜空腹服用

D: 宜同时补充维生素 C

答案：C

25. (2016 年真题) 治疗口腔溃疡时，取少量吹敷于患处，一日用 2~3 次的药物是 ()。

A: 地塞米松粘贴片

B: 冰硼咽喉散

C: 甲硝唑口腔粘贴片

D: 西地碘含片

答案：B

26. 下列关于血脂异常临床分型的叙述，不正确的是 ()。

A: 高三酰甘油血症主要为 TG 升高，而 TC 正常或轻度增加

B: 高胆固醇血症 TC 增高，TG 正常

C: 混合型高脂血症 TC 和 TG 均增高

D: 低高密度脂蛋白血症 TC 水平明显增高，TG 正常或偏高

答案：D

27. 口服氯化铵用于解救的是（）

A: 瘦肉精中毒

B: 苯丙胺中毒

C: 硝西泮中毒

D: 氯丙嗪中毒

答案：B

28. 下列药物中，可影响性功能的药物为

A: 法莫替丁

B: 雷尼替丁

C: 泮托拉唑

D: 西咪替丁

答案：D

29. 适宜与乳酶生配伍应用的药物是

A: 干酵母

B: 磺胺类药

C: 抗酸药

D: 抗生素

答案：A

30. 上市后药品再评价阶段属于

A: II 期临床试验

- B: I 期临床试验
- C: III 期临床试验
- D: IV 期临床试验

答案: D

31. 维生素 A 用于

- A: 防治夜盲症
- B: 习惯性流产的辅助治疗
- C: 防治坏血病
- D: 防治佝偻病

答案: A

32. 属于浓度依赖性抗菌药，评估此类药物的 PK / PD 参数主要有 C_{max} / MIC 或 $AUC_{0\sim 24} / MIC$ ，提高此类抗菌药物疗效的策略主要是提高 C_{max} ，一般推荐日剂量单次给药方案的药物是

- A: 头孢克洛
- B: 利奈唑胺
- C: 左氧氟沙星
- D: 氨茶碱

答案: C

33. 对多数药品而言，贮藏环境与药品保管的关系是

- A: 在 10°C 以上时，温度越低，对保管越有利
- B: 在 0°C 以下时，温度越低，对保管越有利
- C: 在 8°C 以上时，温度越低，对保管越有利
- D: 在 2°C 以上时，温度越低，对保管越有利

答案: D

34. 幽门梗阻（消化性溃疡并发症）

- A: 突发上腹剧痛，继而至全腹
- B: 餐后加重的上腹胀痛，呕吐物有隔夜食物
- C: 疼痛性质改变，明显消瘦、贫血
- D: 规律性上腹痛

答案：B

35. 可引起良性颅压增高、囟门隆起

- A: 苯妥英钠
- B: 氯霉素
- C: 抗组胺药
- D: 维生素 A

答案：D

36. 常见的患者用药咨询内容不包括

- A: 药品适应证
- B: 药物相互作用
- C: 药品名称
- D: 国外新药动态

答案：D

37. 痛风缓解期宜选用的治疗药物是()

- A: 阿司匹林
- B: 秋水仙碱
- C: 苯溴马隆
- D: 泼尼松

答案：C

38. 脑梗死的分期恢复期

- A: 2 周
- B: 1~6 个月
- C: 1 个月内
- D: 1~3 个月

答案：B

39. 以下药品中，归属妊娠毒性药物 X 级的是

- A: 甲巯咪唑
- B: 更昔洛韦
- C: 他汀类降脂药
- D: 链霉素

答案：C

40. 用于糖尿病患者可出现低血糖或高血糖的药物是

- A: 氟西汀
- B: 加替沙星
- C: 培高利特
- D: 头孢菌素类

答案：B

41. 妊娠期女性患泌尿系统感染，需给予氨苄西林治疗，给药剂量需要适当增加，主要原因是

- A: 分布更广
- B: 排泄更快
- C: 代谢更快
- D: 吸收降低

答案：B

42. 患者，男，60 岁，从晨起后收缩压和舒张压迅速升高，在上午 9~10 时达到高峰，而晚上开始降低，于睡眠时降至低谷。那么该患者应用降压药时，关于用药时间的说法，正确的是

- A: 一般每日需要服用长效抗高血压药如氨氯地平等 2 次，早、晚各一次最好
- B: 一般每日仅服一次长效抗高血压药如氨氯地平等且以清晨 7 时左右为最佳服用时间
- C: 一般每日仅服一次长效抗高血压药如氨氯地平等且以晚上 7 时左右为最佳服用时间
- D: 一般每日晚上睡前服抗高血压药，服用培哌普利、氨氯地平、左旋氨氯地平等

答案：B

43. 含有伪麻黄碱的抗感冒药需慎用于

- A: 患有心脏病、高血压、甲状腺功能亢进、青光眼、前列腺增生的患者
- B: 有血小板减少症、有出血倾向者、上消化道出血和(或)穿孔病史者
- C: 妊娠初期及哺乳期妇女
- D: 疲劳和生活规律紊乱者

答案：A

44. 氯霉素的禁用范围是

- A: 新生儿
- B: 1 岁以下婴儿
- C: 婴幼儿
- D: 3 岁以下幼儿

答案：A

45. 饮酒过多可致死亡，所以乙醇浓度危及生命最低限是

- A: 0.2%~0.25%
- B: 0.35%~0.4%
- C: 0.25%~0.3%
- D: 0.15%~0.2%

答案：B

46. 患儿，男，5 个月，体重 9.0kg，平素健康，近日出现多汗、夜哭、易惊。体检：前囟平软，颅骨有“乒乓球”感，枕秃，肋骨串珠。人工喂养，尚未添加任何辅食，平素较少出门。

- A: 4000IU
- B: 6000IU
- C: 400IU
- D: 10000IU

答案：A

47. 解热镇痛药用于退热，两次用药的间隔时间应该是

- A: 4~6 小时
- B: 5~7 小时
- C: 2~4 小时
- D: 3~5 小时

答案：A

48. 可与吸入性糖皮质激素合用的长效 β_2 受体激动剂是

- A: 孟鲁司特
- B: 沙美特罗
- C: 异丙托溴铵

D: 噻托溴铵

答案: B

49. 患者，女，58 岁，罹患肺癌，术后化疗 3 次，半年后复发，决定使用安罗替尼 12mgqd 靶向治疗，既往有乙型肝炎病史，患者用药期间应密切监视的特殊不良反应是

A: Q—T 间期延长

B: 出血

C: 乙型肝炎复发

D: 腹泻

答案: B

50. 查询妊娠及哺乳期用药可首选的书籍是

A: 《中华人民共和国药典》

B: 《新编药理学》

C: 《药物治疗学》

D: 《药物流行病学》

答案: C

51. 急性支气管炎呈自限性，对于急性单纯性支气管炎不建议常规使用抗菌药物，除非是出现了肺炎。治疗通常是对症和支持疗法。

A: 右美沙芬

B: 愈创木酚甘油醚

C: 伪麻黄碱

D: 苯海拉明

答案: D

52. 一般不会改变血红蛋白正常值的药物是

- A: 维生素 B
- B: 硝酸甘油
- C: 维生素 K
- D: 伯氨喹

答案：A

53. 淋巴细胞正常值参考范围是

- A: 0.03~0.08
- B: 0.01~0.05
- C: 0.20~0.40
- D: 0~0.01

答案：C

54. Hb 量 >90g/L 与低于正常参考的下限可诊断为

- A: 基本正常
- B: 重度贫血
- C: 中度贫血
- D: 轻度贫血

答案：D

55. 沟通的时间不宜过长，提供的信息不宜过多

- A: 认真聆听
- B: 注意掌握时间
- C: 注意语言的表达
- D: 关注特殊人群

答案：B

56. 尤以铅中毒疗效好的解毒剂是

- A: 青霉胺
- B: 依地酸钙钠
- C: 二巯丙醇
- D: 二巯丁二钠

答案：B

57. 可导致男性乳房发育的降压药是

- A: 氯沙坦
- B: 利血平
- C: 螺内酯
- D: 硝苯地平

答案：C

58. 属于高选择性 $\alpha_4\beta_2$ 尼古丁-乙酰胆碱受体部分激动/部分拮抗药，可帮助吸烟者缓解戒断症状，减少对吸烟的渴求和满足感，但存在癫痫发作罕见不良反应的戒烟药物是

- A: 可乐定
- B: 伐尼克兰
- C: 尼古丁替代药物
- D: 安非他酮

答案：B

59. 不属于常用缓泻药的作用机制的是

- A: 润滑性
- B: 容积性
- C: 润湿性
- D: 膨胀性

答案：C

60. 患者用药咨询的内容是

- A: 抗菌药物的合理使用
- B: 不宜选用氯化钠注射液溶解的药品
- C: 减肥、补钙、补充营养素
- D: 栓剂、气雾剂等外用剂型的正确使用方法

答案：D

61. 属于 5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂的是

- A: 氟西汀
- B: 阿米替林
- C: 吗氯贝胺
- D: 文拉法辛

答案：D

62. 患者，女，35 岁，部分发作性癫痫病史 12 年，最初使用苯妥英钠单药治疗，6 个月前因癫痫病情控制不佳，提高苯妥英钠剂量，因不能耐受不良反应换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗，癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发，到神经内科复诊。患者同时患有 2 型糖尿病，长期口服二甲双胍、阿卡波糖治疗。此外患者长期服用复合维生素 B。

- A: 丙戊酸钠
- B: 卡马西平
- C: 阿卡波糖
- D: 左乙拉西坦

答案：B

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

63. (2021 年真题) 患者，男，59 岁，诊断为 2 型糖尿病，因口服降糖药疗效欠佳，给予预混胰岛素 30R 注射液。关于该患者用药教育的说法，错误的是 ()

- A: 应警惕发生低血糖，提醒患者随身携带木糖醇糖果
- B: 胰岛素笔芯启用后不宜冷藏保存
- C: 未开启的胰岛素制剂应冷藏保存，冷冻后不可再使用
- D: 使用前应缓慢摇匀，确保给药剂量准确

答案：A

64. (2015 年真题) 静脉注射两性霉素 B 的适宜溶媒是 ()。

- A: 50%葡萄糖注射液
- B: 0.9 氯化钠注射液
- C: 5%葡萄糖注射液
- D: 复方氯化钠注射液

答案：C

65. 作为预防用药错误策略，规范处方行为与操作流程，归属于

- A: 环境与流程的优化与持续改进
- B: 科学发展
- C: 管理规范到位
- D: 人员知识培训

答案：C

66. MHT 具体治疗方案，有完整子宫、绝经后期不希望有月经样出血的妇女宜选用

- A: 单纯孕激素补充治疗
- B: 雌孕激素连续联合用药
- C: 单纯雌激素补充治疗

D: 雌孕激素间隔用药

答案：B

67. 某女性，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发发生喘憋。体检：端坐体位，BP190/110mmHg，R30 次/分，Bp108 次/分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

A: 室性期前收缩

B: 阵发性室上性心动过速

C: 心房颤动

D: 心室颤动

答案：C

68. 治疗幽门螺杆菌感染的一线方案，其典型组方中不包括的药物是

A: 西咪替丁

B: 甲硝唑

C: 克拉霉素

D: 胶体果胶铋

答案：A

69. 属于蛋白酶抑制剂的抗 HIV 药物是

A: 利托那韦

B: 替诺福韦

C: 拉替拉韦

D: 阿德福韦

答案：A

70. 患者术后，给予肠外营养液 10%GS500ml、50%GS250ml、20%脂肪乳 250ml、8.5%复方氨基酸 750ml、水溶性维生素 10ml、脂溶性维生素 10ml、微量元素 10ml、10%氯化钠注射液 40ml、10%氯化钾注射液 30ml

- A: 450kcal
- B: 200kcal
- C: 700kcal
- D: 1150kcal

答案：A

71. 可造成儿童呼吸抑制，故 5 岁以下的儿童不宜应用的是

- A: 喷托维林
- B: 右美沙芬
- C: 可待因
- D: 苯丙哌林

答案：A

72. 应用患儿年龄、体重或体表面积等计算用药剂量，显示儿童用药应该

- A: 根据儿童特点选择适宜的给药方案
- B: 密切监护
- C: 严格掌握用药剂量
- D: 避免食物的影响

答案：C

73. 对某些患者应教会正确量取内服液体制剂，是针对

- A: 交代药品贮存条件与方法
- B: 交代用药途径及用药方法

C: 交代用药注意事项

D: 交代药物的用量

答案: D

74. 可能影响儿童骨骼发育的药物是()

A: 诺氟沙星

B: 阿莫西林

C: 头孢克洛

D: 复方磺胺甲噁唑

答案: A

75. 痉挛性便秘可选

A: 聚乙二醇粉

B: 硫酸镁

C: 乳果糖

D: 比沙可啶

答案: A

76. 妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

A: 受精后 1 周至 3 个月

B: 受精后 3 周至 3 个月

C: 受精后 3 周至 2 个月

D: 受精后 2 周至 3 个月

答案: B

77. (2017 年真题) 治疗水疱型脚癣宜选用 ()

- A: 复方苯甲酸酊
- B: 阿昔洛韦软膏
- C: 氢化可的松软膏
- D: 维 A 酸乳膏

答案：A

78. 具有中枢和周围抗多巴胺双重作用的是

- A: 甲氧氯普胺
- B: 莫沙必利
- C: 多潘立酮
- D: 西沙必利

答案：A

79. 患儿,女,5岁,误服香豆素灭鼠药,可选用的解救药物是 ()

- A: 维生素 K
- B: 亚甲蓝
- C: 纳洛酮
- D: 二巯丙醇

答案：A

80. 可造成儿童呼吸抑制,故 5 岁以下儿童不宜应用的是

- A: 右美沙芬
- B: 喷托维林
- C: 苯丙哌林
- D: 可待因

答案：B

81. 中效低精蛋白锌胰岛素的作用峰时为 ()。

- A: 1.5~4 小时
- B: 0.25~0.5 小时
- C: 0.6~1.5 小时
- D: 6~12 小时

答案：D

82. 能促使体格强壮、肌肉发达、增强爆发力，并缩短体力恢复时间的兴奋剂

- A: β -受体阻断剂
- B: 利尿剂
- C: 精神刺激剂
- D: 蛋白同化激素

答案：C

83. 药库接受了一批药品，其中需要在冷处贮存的是

- A: 双歧三联活菌胶囊
- B: 西地碘片
- C: 硫普罗宁片
- D: 乳酶生片

答案：A

84. 根据血红蛋白含量评估缺铁性贫血程度重度贫血为

- A: 90~120g / L
- B: 60~90g / L
- C: 30~60g / L
- D: 120~160g / L

答案：C

85. 药物的成本与产生的收益之间进行对比，评价治疗方案的经济性，以货币为单位。该药物经济学评价方法是

- A: 成本-效益分析
- B: 成本-效用分析
- C: 成本-效果分析
- D: 最小成本分析

答案：A

86. 癫痫持续状态首选的治疗方案是

- A: 口服丙戊酸钠 200mg
- B: 口服苯妥英钠 300mg
- C: 静脉注射地西泮 10mg
- D: 口服地西泮 10mg

答案：C

87. 处方调配差错的内容

- A: 加强药品货位管理
- B: 通过药剂师双人复核制
- C: 药品名称出现差错
- D: 确认差错发生的过程、细节

答案：C

88. 患者，男，72岁，既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。1个月前因出现哮喘症状就诊。医师处方：布地奈德气雾剂 200 μg bid 吸入，沙丁胺醇气雾剂 100 μg bid 吸入，氨氯地平片 5mg qd 口服及硝酸甘油片 0.5mg pm 舌下含服。

- A: 氨氯地平的不良反应

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

B: 硝酸甘油剂量不足

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/335130223114012033>