

2024浙江杭州市西湖区卫生健康局所属事业单位招聘笔试冲刺题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、患者，女，40岁，洗衣时突发右侧肢体活动不灵。查体：意识清，失语，二尖瓣区可闻双期杂音，心律不齐，右侧偏瘫，上肢重于下肢，偏身痛觉减退。其诊断最可能是（ ）。

- ☐ A. 蛛网膜下腔出血
- ☐ B. 脑栓塞
- ☐ C. 脑血栓形成
- ☐ D. 脑出血
- ☐ E. 短暂脑缺血发作

『正确答案』
B

『答案解析』
“二尖瓣区可闻双期杂音，心律不齐”提示该患者有风湿性心脏病（脑栓塞的高危因素）；脑栓塞发病急骤，，无前驱症状，其中大脑中动脉栓塞者多见，出现偏瘫、片深感觉障碍、失语或局灶性癫痫发作症状。

2、球管平衡是（ ）。

- ☐ A. 近球小管对滤过液的重吸收率为65%~70%
- ☐ B. 肾小球滤过率随肾小管吸收率而变化
- ☐ C. 肾小管的重吸收率为65%~70%
- ☐ D. 肾小球滤过率等于肾小管重吸收率
- ☐ E. 远曲小管重吸收率等于肾小球滤过率

『正确答案』
A

『答案解析』
暂无解析。

3、不参与甲硫氨酸循环的物质是（ ）。

- ☐ A. 甲硫氨酸
- ☐ B. 同型半胱氨酸
- ☐ C. 维生素B₁₂
- ☐ D. 叶酸
- ☐ E. 泛酸

『正确答案』
E

『答案解析』
暂无解析。

4、下列哪项是临床确定患者存在急性心肌损害最有价值的指标？（ ）

- ☐ A. 乳酸脱氢酶增高
- ☐ B. 肌钙蛋白T增高
- ☐ C. 血清肌红蛋白增高
- ☐ D. 磷酸激酶增高
- ☐ E. 心电图出现ST段水平下移

『正确答案』

B

『答案解析』

B项，急性心肌损害后，心肌纤维膜的破裂，引发细胞内的心肌坏死标记物释放入血。其中诊断急性心肌损害特异性最高的是肌钙蛋白。理论上正常人的血清中几乎不存在肌钙蛋白（cTnT），当急性心肌损害时，肌钙蛋白明显升高。肌钙蛋白是目前诊断心肌损害最有价值的指标之一。ACD三项，乳酸脱氢酶、磷酸激酶、肌红蛋白增高也并非只在心肌损伤时出现，当骨骼肌损伤、肝细胞损伤、肺部疾患等时也可增高，不是临床确诊急性心肌损害最有价值的指标。E项，心电图ST段水平下移可见于心肌缺血，无特异性。

5、某患者要做腰穿检查，有恐惧感，从医德要求考虑，临床医生应向病人做的主要工作是（ ）。

- ☐ A. 要征得病人知情同意
- ☐ B. 因诊断需要，先动员，后手术
- ☐ C. 告知做腰穿时应注意的事项
- ☐ D. 告知做腰穿的必要性，嘱病人配合
- ☐ E. 动员家属做病人思想工作

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

6、营养性缺铁性贫血，血象特点为（ ）。

- ☐ A. RBC比Hb减少明显
- ☐ B. 正细胞低色素性贫血
- ☐ C. RBC中心浅染区正常
- ☐ D. 网织RBC数正常或轻度减少
- ☐ E. 血小板、白细胞减少

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

7、哪组液体不是等张液（ ）。

- ☐ A. 11.2%乳酸钠10ml，5%葡萄糖50ml
- ☐ B. 0.9%氯化钠20ml，1.4%碳酸氢钠10ml
- ☐ C. 5%碳酸氢钠10ml，10%葡萄糖50ml
- ☐ D. 0.9%氯化钠20ml，10%葡萄糖100ml，11.2%乳酸钠20ml
- ☐ E. 5%碳酸氢钠10ml，10%葡萄糖75ml，11.2%乳酸钠10ml

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

8、男性，35岁，右侧甲状腺单发结节3cm×2cm，术中病理报告为甲状腺乳头状癌。最合适的进一步处理应该是（ ）。

- ☐ A. 缝合切口，结束手术
- ☐ B. 术后放射性碘治疗
- ☐ C. 化学药物治疗
- ☐ D. 右侧甲状腺全切和对侧大部切除
- ☐ E. 双侧全切加颈部淋巴廓清术

『正确答案』

D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/335314320144011141>