

2024 辽宁省瓦房店市《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题完整版含答案（巩固）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2019 年真题）患者，男，65 岁，因咳嗽、咳大量脓痰、呼吸困难入院，诊断为慢性阻塞性肺病急性加重。该患者临床治疗不应选用的药物是

- A: 右美沙芬
- B: 羧甲司坦
- C: 氨溴索
- D: 乙酰半胱氨酸

答案：A

2. （2017 年真题）高血压治疗药物选择时，ACEI 类药物禁用于（）

- A: 双侧肾动脉狭窄患者
- B: 痛风患者
- C: 胃溃疡患者
- D: 心力衰竭患者

答案：A

3. 妇女绝经后骨质疏松症的激素替代治疗方案为

- A: 钙剂+维生素 D+降钙素
- B: 钙剂+维生素 D+甲状旁腺激素
- C: 钙剂+维生素 D+雌激素
- D: 钙剂+维生素 D+双磷酸盐

答案：B

4. 根据《中国成人超重和肥胖预防控制指南》体重指数(BMI)判断为肥胖的标准是()

- A: $BMI \geq 28.0$
- B: $BMI \leq 18.5$
- C: $BMI < 21.5$
- D: $BMI \geq 24.0$

答案：A

5. 消化性溃疡发病机制中的防御因子为

- A: 吸烟
- B: 酒精
- C: Hp 感染
- D: 前列腺素 E

答案：D

6. 中成药舒筋活络酒具有祛风除湿、活血通络、养阴生津的功效，与其合用可加强对中枢神经系统抑制作用的药物是

- A: 复方利血平
- B: 氯苯那敏
- C: 甲氧氯普胺
- D: 地高辛

答案：B

7. 长期应用可引起维生素 K 缺乏的药物是

- A: 头孢菌素类药物
- B: 顺铂

C: 格列喹酮

D: 三环类抗抑郁药

答案: A

8. 能与胃蛋白酶、胰酶、淀粉酶中的蛋白结合，减弱其助消化药效的是

A: 酒中的乙醇

B: 食醋中的醋酸

C: 茶叶中的鞣酸

D: 食盐中的氯化钠

答案: C

9. 可引起再生障碍性贫血

A: 维生素 A

B: 抗组胺药

C: 苯妥英钠

D: 氯霉素

答案: D

10. 氨氯地平片的适宜服用时间是

A: 餐后

B: 早晨

C: 餐中

D: 餐前

答案: B

11. 关于治疗药物监测的论述，错误的是

A: 所有的治疗药物都必须进行监测

- B: 治疗药物监测可以实现给药个体化
- C: 是临床药学服务的重要内容之一
- D: 治疗药物监测的常用英文缩写是“TDM”

答案：A

12. 属于蛋白酶抑制剂的抗 HIV 药物是

- A: 替诺福韦
- B: 利托那韦
- C: 阿德福韦
- D: 拉替拉韦

答案：B

13. (2015 年真题) 患者因扁桃体炎给予头孢拉定治疗，服用 4 个小时后，面部出现皮疹，无其他不适。停药后皮疹消失，排除其他疾病可能。该病例用药与不良反应因果关系评价结果是 ()。

- A: 肯定
- B: 可能无关
- C: 可能
- D: 很可能

答案：D

14. 用于糖尿病患者可出现低血糖或高血糖隐患的是

- A: 培高利特
- B: 加替沙星
- C: 氟西汀
- D: 头孢菌素

答案：B

15. (处方容易混淆的常用外文缩写的识别) 右眼

- A: O
- B: DOL
- C: NS
- D: LD

答案：A

16. 急性感染、急性化学药物中毒如汞中毒可呈现

- A: 红细胞计数减少
- B: 血小板减少
- C: 淋巴细胞增多
- D: 白细胞增多

答案：D

17. 属于 HIV 蛋白酶抑制剂的是

- A: 奈韦拉平
- B: 洛匹那韦
- C: 阿巴卡韦
- D: 雷特格韦

答案：B

18. 抗肿瘤药物引起骨髓抑制，白细胞下降多开始于用药后

- A: 第 7 天
- B: 第 3 天
- C: 第 5 天
- D: 第 14 天

答案：A

19. 收录 5500 余种药物专论、4 万多篇参考文献的是

- A: 《药物事实与比较》
- B: 《美国药典药物信息》
- C: 《中国国家处方集》
- D: 《马丁代尔药物大典》

答案: D

20. 弱酸性药物离子化减少

- A: 肾小管重吸收增加
- B: 肾小管分泌减少
- C: 肾小球滤过减少
- D: 肾血流量减少

答案: A

21. 患者男性，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 肺动脉栓塞
- B: 下肢动脉栓塞
- C: 下肢深静脉血栓形成
- D: 病理性骨折

答案: C

22. 毒物种类很多，中毒方式各异，虽然有的毒物中毒尚无特效的解毒药，但救治原则基本相同。

- A: 巴比妥
- B: 苯巴比妥
- C: 硫喷妥钠
- D: 异戊巴比妥

答案：D

23. 第二代抗组胺药氯雷他定治疗过敏性鼻炎的用法、用量是

- A: 一次 10mg，每日 1 次
- B: 一次 2mg，每日 3 次
- C: 一次 4mg，每日 1 次
- D: 一次 4mg，每日 3 次

答案：A

24. 能刺激骨骼、肌肉和组织的生长发育的是

- A: 蛋白同化制剂
- B: 肽激素类
- C: 麻醉药品
- D: 利尿剂

答案：B

25. 患者，男，65 岁，患有骨质疏松症。根据患者饮食习惯，每日需补充元素钙 600mg。药师为其推荐碳酸钙(0.5g / 片)，该患者适宜的用法用量是

- A: 4 片 qd
- B: 2 片 tid
- C: 1 片 tid
- D: 6 片 qd

答案：C

26. (2019 年真题) 对乙酰氨基酚的妊娠毒性分级是

- A: B 级
- B: X 级

C: C 级

D: A 级

答案: A

27. 属于广谱抗病毒药，具有抗病毒、调节免疫和抗增生作用的是

A: 干扰素

B: 奥司他韦

C: 氟胞嘧啶

D: 更昔洛韦

答案: A

28. 餐前 30min 服用的药物是

A: 阿托伐他汀

B: 伊托必利

C: 复方氢氧化铝

D: 奥美拉唑

答案: C

29. 痛风患者的尿液常见

A: 酪氨酸和亮氨酸结晶

B: 尿酸盐结晶

C: 磷酸盐结晶

D: 草酸盐结晶

答案: B

30. 用于治疗铅中毒的特殊解毒剂是 ()

A: 纳洛酮

B: 乙酰胺

C: 二巯丁二钠

D: 氟马西尼

答案: C

31. 在医生的指导下使用已证明对胚胎与胎儿无害的药物，即

A: 选用对胎儿危害较小的药物

B: 禁止用试验性药

C: 用药必须有明确的指征和适应证

D: 可用可不用的药物应尽量不用或少用

答案: C

32. 饮酒可使其代谢加快、药效减弱的药物是

A: 利血平

B: 卡马西平

C: 维生素 B

D: 苯妥英钠

答案: D

33. 属于延长动作电位时程给药（第Ⅲ类）的抗心律失常药是

A: 胺碘酮

B: 拉贝洛尔

C: 维拉帕米

D: 美西律

答案: A

34. 舒筋活络酒不宜联用的是

A: 氢氧化铝

B: 阿托品

C: 苯巴比妥

D: 可待因

答案: C

35. 《国家非处方药目录》收录的治疗过敏性鼻炎的药物不包括

A: 赛洛唑啉滴鼻液

B: 1%麻黄碱滴鼻液

C: 羟甲唑啉滴鼻液

D: 丙酸倍氯米松鼻喷雾剂

答案: D

36. 关于尿路感染的说法，不正确的是

A: 大肠杆菌感染最为常见

B: 男性发病率稍高

C: 多见于育龄期和绝经后女性

D: 由细菌感染引起

答案: B

37. 与舒筋活络酒不宜联用的药物是

A: 阿托品

B: 可待因

C: 苯巴比妥

D: 氢氧化铝

答案: C

38. 辛伐他汀

A: 宜清晨服用

B: 宜睡前服用

C: 宜餐后服用

D: 宜餐前服用

答案: B

39. 乙型肝炎病毒表面抗体为

A: 不能抑制 HBV 的增殖，可反映肝细胞受到 HBV 侵害后的一项指标

B: 为一种保护性抗体，表明人体具有一定免疫力的指标

C: 乙型肝炎病毒感染早期血清中出现的一种特异性血清标记物

D: 不能抑制 HBV 的增殖，出现在 HBsAg 转阴之后，证明人体对 HBsAg 有一定的免疫清除率的指标

答案: B

40. 如发现“仙牛健骨颗粒”III期临床试验过程连续发生严重不良事件，确认后暂停其试验

A: 发现与规避假、劣药流入市场

B: 药品上市后风险评估

C: 药品上市前风险评估

D: 发现药品质量问题

答案: C

41. 肝病患者慎用的药品不包括

A: 对乙酰氨基酚

B: 多粘菌素

C: 甲氨蝶呤

D: 氯丙嗪

答案: B

42. 联合用药可使异烟肼失去抗菌作用的中成药

- A: 丹参片（丹参酮）
- B: 昆布片（碘）
- C: 蛇胆川贝液（苦杏仁苷）
- D: 香连片（黄连）

答案：B

43. 可引起血清尿素氮增高的是

- A: 肾衰竭
- B: 急性胰腺炎
- C: 胃溃疡
- D: 严重肝病

答案：A

44. 骨髓增生病

- A: 白细胞增多
- B: 红细胞沉降率减慢
- C: 血小板增多
- D: 淋巴细胞增多

答案：C

45. （2017 年真题）药师在指导患者合理用药时应同时关注药物、食物和膳食补充剂的相互影响。下列合用方式合理的是（）

- A: 左甲状腺素与钙剂同服
- B: 异烟肼与牛奶同服
- C: 硫酸亚铁与维生素 C 同服
- D: 华法林与人参同服

答案：C

46. 新生儿服用氯霉素，因其在体内蓄积导致灰婴综合征，引起药源性疾病的因素主要为

- A: 基础疾病因素
- B: 遗传因素
- C: 年龄因素
- D: 性别因素

答案：C

47. 一些权威性较高的二次文献中，记载应做皮肤敏感试验的药品中，维生素 B1 注射剂的皮试药液浓度是

- A: 5mg/ml
- B: 1mg / ml
- C: 2mg / ml
- D: 3mg / ml

答案：A

48. 服药期间饮酒可引起低血糖反应的是

- A: 格列本脲
- B: 硫酸亚铁
- C: 西咪替丁
- D: 泼尼松

答案：A

49. 主要用于抗病毒的药物是

- A: 氟胞嘧啶
- B: 阿糖腺苷
- C: 阿糖胞苷
- D: 氟尿嘧啶

答案：B

50. 患者，女，65 岁，因乳腺癌接受第二周期化疗。禁用的止吐药物是（）

- A: 地塞米松
- B: 甲氧氯普胺
- C: 昂丹司琼
- D: 苯海拉明

答案：B

51. 饮酒后酒精除了影响神经系统、心血管系统的功能外，还会影响药物的疗效作用和毒副作用。因此，在服用药物时应该考虑酒精对药物的影响。

- A: 痛风急性发作
- B: 血压升高
- C: 出现蛋白尿
- D: 嗜睡

答案：A

52. 患者，男，26 岁，自述头痛、咽喉痛、全身乏力、畏寒，偶尔咳嗽，并有鼻塞、流鼻涕、打喷嚏等症状。经检查后，测量口腔体温 37.8℃，脉搏 72 次/分，白细胞计数 $3.7 \times 10^9/L$ 。医生为患者开具的处方如下：

- A: 4 日
- B: 5 日
- C: 2 日
- D: 3 日

答案：A

53. 属于过敏介质阻释剂的是

- A: 氨茶碱
- B: 孟鲁司特
- C: 多索茶碱
- D: 曲尼司特

答案：D

54. 患者，女，27 岁，2 年前开始出现多汗、多食，近期因消瘦、心悸就诊。查体：甲状腺肿大，根据血 T₃、T₄ 及 TSH 检查结果，诊断为甲亢。目前该患者正处于哺乳期。

- A: 粒细胞减少
- B: 皮疹
- C: 肝功能损害
- D: 头痛

答案：A

55. 患者，男，61 岁，查体空腹血糖升高来诊，中等体型，无烟酒等不良嗜好。该患者既往慢性肾炎病史，伴轻中度肾功能不全。

- A: 二甲双胍
- B: 格列喹酮
- C: 格列美脲
- D: 胰岛素

答案：D

56. 可刺激胃肠黏膜，引起水肿或充血

- A: 食醋
- B: 脂肪

C: 食盐

D: 酒

答案: D

57. 患者,男,69岁,因高血压长期服用抗高血压药,近日患者出现足踝部水肿引起此不良反应的药物是()

A: 卡托普利

B: 普萘洛尔

C: 非洛地平

D: 多沙唑嗪

答案: C

58. 结核杆菌生命力顽强,且易产生耐药性,临床采用标准化学治疗方案

A: 2HRE / 7HR

B: 3HRZE / 9HR

C: 2HRZE / 4HR

D: 2HRZE / 4HR

答案: D

59. 饮酒可使其代谢加快、药效减弱的药物是

A: 苯妥英钠

B: 卡马西平

C: 利血平

D: 维生素 B1、维生素 B2

答案: A

60. (2017 年真题) 下列关于口服阿仑膦酸钠使用注意事项的说法, 错误的是 ()

- A: 食管炎为典型不良反应
- B: 口服后 30 分钟内应保持立位或坐位
- C: 应避免同时使用两种双膦酸盐
- D: 随餐服用, 并大量饮水, 可增加吸收、减少胃肠道刺激

答案: D

61. 以下有关肝功能不全病人用药原则的叙述中, 不正确的是

- A: 选用从肝脏排泄的药物
- B: 定期检查肝功能, 及时调整治疗方案
- C: 特别应避免与肝毒性的药物合用
- D: 避免或减少使用对肝脏毒性大的药物

答案: A

62. 患者, 男, 60 岁, 因上臂出现湿疹到药店购药, 药师应推荐的药品是 ()

- A: 利巴韦林软膏
- B: 特比萘芬乳膏
- C: 氢化可的松软膏
- D: 10%樟脑软膏

答案: C

63. 将 0.5g 氨茶碱注射液加到 5%葡萄糖注射液 350ml 中, 临床要求给药速度是 60mg/h, 输注速度是

- A: 36ml/h
- B: 42ml/h
- C: 60ml/h
- D: 15ml/h

答案：B

64. 预激综合征伴房颤患者，控制心室率时慎用的药物为

- A: 去乙酰毛花苷
- B: 胺碘酮
- C: 硝苯地平
- D: 利伐沙班

答案：A

65. 以健康受试者进行初步的临床药理学及人体安全性评价是指

- A: I 期临床试验
- B: 临床预试验
- C: III 期临床试验
- D: II 期临床试验

答案：A

66. 属于 5α -还原酶抑制剂，可抑制前列腺生长的药品

- A: 黄酮哌酯
- B: 阿夫唑嗪
- C: 非那雄胺
- D: 氟他胺

答案：C

67. 循证医学的证据分级中，"结果一致的 II、III 级临床研究结论或 I 级临床研究的推论"为几级证据

- A: C 级
- B: A 级
- C: B 级

D: D 级

答案: C

68. 患者用药咨询的内容是

A: 治疗药物监测

B: 自我保健

C: 新药信息

D: 首次剂量、维持剂量以及每日用药次数、间隔与疗效

答案: D

69. (2015 年真题) 患者，男，64 岁，身高 174cm，体重 92kg。既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊，临床处方，阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

A: 出现弥漫性肌痛或乏力，同时伴全身不适时，应及时就医

B: 单硝酸异山梨酯能扩张血管引起头痛，即使可耐受也必须停药

C: 患者使用抗血小板聚集药物时，应注意预防出血

D: 应注意监护血压变化，防止血压过度降低

答案: B

70. 如万络（罗非昔布）撤市发现大剂量服用万络者患心肌梗死和心脏猝死的危险增加了 3 倍

A: 发现与规避假、劣药流入市场

B: 药品上市前风险评估

C: 药品上市后风险评估

D: 发现药品质量问题

答案: C

71. (2017 年真题) 患者,男,80 岁,因发热、咳嗽、咳痰 2 天就诊诊断为社区获得性肺炎,给予左氧氟沙星、甘草合剂、氨溴索、对乙酰氨基酚、维生素 C 等治疗。患者用药 3 天后出现失眠、烦躁不安等症状最可能引起该症状的药物是 ()

- A: 氨溴索
- B: 左氧氟沙星
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 甘草合剂

答案: B

72. $30\text{g/L} \leq \text{Hb 量} < 60\text{g/L}$ 可诊断为

- A: 中度贫血
- B: 重度贫血
- C: 轻度贫血
- D: 基本正常

答案: B

73. 前记

- A: 临床诊断、费别
- B: 主要实验室数据
- C: 药品名称、剂型、规格、数量、用法用量
- D: 医师签名、药品金额

答案: A

74. 能提示患者大量或长期应用广谱抗生素的粪便细胞显微镜检出物是

- A: 上皮细胞
- B: 吞噬细胞增多
- C: 红细胞

D: 真菌

答案：D

75. 经肾排泄的药物，在肝功能障碍时

A: 尽可能避免使用

B: 须谨慎使用，必要时减量给药

C: 必须减量应用

D: 一般无须调整剂量

答案：D

76. 患者，男，48 岁，患有青光眼 3 年。今日因支气管哮喘急性发作，给予舒张支气管、抗炎等治疗，应告知该患者用药后需漱口的药物是（）

A: 布地奈德混悬液

B: 沙丁胺醇气雾剂

C: 孟鲁斯特纳咀嚼片

D: 多索茶碱注射液

答案：A

77. 医嘱：万古霉素 0.5g 溶解至 100ml 生理盐水中，滴注时间不得少于 75 分钟。已知所用输液器的滴系数为 15，试问每分钟滴数最多为

A: 23 滴

B: 26 滴

C: 20 滴

D: 15 滴

答案：C

78. 主要用于丙烯腈、氟化物、一氧化碳等中毒的解毒剂是

- A: 双解磷
- B: 亚硝酸钠
- C: 谷胱甘肽
- D: 盐酸烯丙吗啡

答案：C

79. pH 碱性的感染尿液常见

- A: 草酸盐结晶
- B: 尿酸盐结晶
- C: 磷酸盐结晶
- D: 酪氨酸和亮氨酸结晶

答案：C

80. 治疗严重先兆子痫的首选药物为

- A: 美托洛尔
- B: 硫酸镁
- C: 依那普利
- D: 氢氯噻嗪

答案：A

81. 患者，女，53 岁，因“冠状动脉粥样硬化性心脏病、急性心肌梗死”住院治疗。医师处方：硝酸甘油片、比索洛尔片、注射用重组链激酶冻干粉针剂、依那普利片、肝素钠注射液、辛伐他汀片比索洛尔的主要不良反应是

- A: 心动过缓、二至三度房室传导阻滞
- B: 出血
- C: 高钾血症
- D: 横纹肌溶解症

答案：A

82. 关于皮肤病外用剂型的选择，错误的说法

- A: 有渗液者，先用溶液剂湿敷，后用油剂
- B: 急性期局部有红肿、水疱、糜烂时，多选用糊剂和乳膏剂
- C: 皮损处于亚急性期时，可酌情选用糊剂、粉剂和洗剂
- D: 慢性期皮损增厚，呈苔藓样变时，多用软膏剂和乳膏剂

答案：B

83. 需要在服药时多饮水的药物不包括

- A: 平喘药
- B: 抗痛风药
- C: 氨基糖苷类抗生素
- D: 降糖药

答案：D

84. 急性支气管炎呈自限性，对于急性单纯性支气管炎不建议常规使用抗菌药物，除非是出现了肺炎。治疗通常是对症和支持疗法。

- A: 右美沙芬
- B: 伪麻黄碱
- C: 苯海拉明
- D: 愈创木酚甘油醚

答案：C

85. 流行性出血性结膜炎可选用

- A: 四环素眼膏
- B: 2%色甘酸钠滴眼剂
- C: 0.1%羟苄唑滴眼剂

D: 0.1%碘苷滴眼剂

答案：C

86. 为氧化剂，不能用于乐果中毒的洗胃液是

A: 活性炭混悬液

B: 淀粉溶液

C: 3%鞣酸溶液

D: 1: 5000 高锰酸钾

答案：D

87. 患者，男，40 岁，因肺结核使用抗结核药后，肌肉痉挛，四肢感觉异常，导致这种症状的药物是

A: 异烟肼

B: 乙胺丁醇

C: 吡嗪酰胺

D: 利福平

答案：A

88. “有助于建立、维持并增进药师与患者的专业性关系”的技能是

A: 药历书写技能

B: 自主学习能力

C: 沟通技能

D: 药品警戒技能

答案：C

89. 老年人使用可导致甲状腺功能异常、肺毒性或 Q-T 间期延长，不宜作为心房颤动一线用药的是：

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 地高辛

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/336051100055011030>