

2024 年河北省雄县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题完整题库及参考答案（巩固）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 对脑血管扩张作用较强的药物是()

- A: 尼莫地平
- B: 非洛地平
- C: 硝苯地平
- D: 尼索地平

答案：A

2. 可引起心率加快，瞳孔散大、视物模糊及中枢镇静作用的药物是

- A: 后马托品
- B: 山莨菪碱
- C: 东莨菪碱
- D: 阿托品

答案：C

3. 抑制胃酸分泌作用的药物是

- A: 枸橼酸铋钾
- B: 莫沙必利
- C: 奥关拉唑
- D: 碳酸钙

答案：C

4. 焦虑型、夜间醒来次数较多者

- A: 氯美扎酮
- B: 氟西泮
- C: 谷维素
- D: 夸西泮

答案：B

5. 服用 5 型磷酸二酯酶抑制剂可导致

- A: 肾功能异常
- B: 刺激性干咳
- C: 高血压
- D: 视物模糊、复视

答案：D

6. 铁剂的适应证为

- A: 恶性贫血
- B: 缺铁性贫血
- C: 巨幼细胞贫血
- D: 再生障碍性贫血

答案：B

7. 与醛固酮受体竞争性结合，拮抗醛固酮作用的保钾排钠药物是

- A: 螺内酯
- B: 甘露醇
- C: 氨苯蝶啶
- D: 乙酰唑胺

答案：A

8. 解救大剂量甲氨蝶呤中毒

- A: 昂丹司琼
- B: 氟他胺
- C: 地塞米松
- D: 亚叶酸钙

答案：D

9. 钩端螺旋体病、梅毒、回归热的首选药的是()

- A: 两性霉素 B
- B: 克林霉素
- C: 氯霉素
- D: 青霉素

答案：D

10. 下列哪种药物可使关闭的房角重新开放，从而降低眼内压

- A: 毛果芸香碱
- B: 噻吗洛尔
- C: 地匹福林
- D: 拉坦前列素

答案：A

11. 可使后者疗效显著下降的是

- A: 氯丙嗪
- B: 红霉素
- C: 他莫昔芬
- D: 维生素 C

答案：D

12. 地高辛的中毒血清浓度为()

- A: >20ng/ml
- B: >50ng/ml
- C: >5ng/ml
- D: >2ng/ml

答案: D

13. 早产儿、妊娠后期及哺乳期妇女禁用下列哪种药物

- A: 氯霉素
- B: 青霉素
- C: 罗红霉素
- D: 红霉素

答案: A

14. 患者，女性，63 岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、氨茶碱静脉滴注治疗。

- A: 腹部 B 超
- B: 血常规
- C: 茶碱血药浓度
- D: 胸部 CT

答案: C

15. 可使洋地黄化时发生心脏传导阻滞，尤其是同时静脉注射钙盐时，该药物是

- A: 硫酸镁
- B: 克拉霉素
- C: 胺碘酮
- D: 呋塞米

答案：A

16. 可引起肺毒性的抗肿瘤抗生素是

- A: 环磷酰胺
- B: 卡莫司汀
- C: 丝裂霉素
- D: 博来霉素

答案：D

17. (2021 年真题) 属于 5-羟色胺与去甲肾上腺素再摄取抑制剂的抗抑郁药物是 ()

- A: 马普替林
- B: 吗氯贝胺
- C: 文拉法辛
- D: 艾司西酞普兰

答案：C

18. 目前治疗开角型青光眼的一线用药是

- A: 碳酸酐酶抑制剂
- B: 拟胆碱能药
- C: 拟肾上腺素能药
- D: 前列腺素类药物

答案：D

19. 可用于骨和关节感染的药物是 ()

- A: 四环素
- B: 万古霉素
- C: 青霉素

D: 林可霉素

答案: D

20. 对贝特类（苯氧芳酸类）的叙述正确的是

A: 可降低 HDL-C

B: 能明显降低血浆 TG

C: 可升高 T

D: LDL-CC 主要用于原发性高胆固醇血症

答案: B

21. 利尿作用极弱，具有降低眼内压作用，可用于青光眼治疗的利尿剂是

A: 螺内酯

B: 呋塞米

C: 氢氯噻嗪

D: 乙酰唑胺

答案: D

22. 容易发生双硫仑样反应的药物包括()

A: 青霉素

B: 链霉素

C: 阿莫西林

D: 头孢唑林

答案: D

23. 用 1%麻黄素液滴鼻的主要目的是

A: 收缩鼻黏膜，抑制腺体分泌

B: 收缩血管，减轻炎症反应

C: 收缩血管，降低其通透性

D: 收缩鼻黏膜，改善鼻通气和鼻窦引流

答案：D

24. 氟替卡松吸入气雾剂用于重度哮喘时的用法和用量为

A: 一次 250~500 μg ，一日 2 次

B: 一次 50~100 μg ，一日 2 次

C: 一次 500~1000 μg ，一日 2 次

D: 一次 100~250 μg ，一日 2 次

答案：C

25. 下列药物组合混合可减弱抗菌活性的是

A: 青霉素+氯霉素

B: 青霉素+阿米卡星

C: 青霉素+红霉素

D: 青霉素+四环素

答案：B

26. 抗菌谱较广，还可用于治疗自身免疫性疾病

A: 阿霉素

B: 丝裂霉素

C: 放线菌素 D

D: 环磷酰胺

答案：D

27. 低度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选

A: 5-HT₃ 受体阻断剂+口服地塞米松

B: 奥美拉唑+口服地塞米松

C: 5-HT₃ 受体阻断剂+口服地塞米松+阿瑞吡坦

D: 每日化疗前，应用 5-HT₃ 受体阻断剂或口服地塞米松

答案：D

28. 不宜用于单纯性尿路感染初治病例的氨基糖苷类抗菌药物是

A: 万古霉素

B: 利福平

C: 阿米卡星

D: 盐酸克林霉素

答案：C

29. 主要用于治疗皮肤真菌感染，可抑制角鲨烯环氧酶活性，属于丙烯胺类的抗真菌药物是

A: 制霉菌素

B: 联苯苄唑

C: 阿莫罗芬

D: 特比萘芬

答案：D

30. 与氨曲南在结构上相似的头孢菌素类药是

A: 氨曲南

B: 头孢他啶

C: 头孢噻肟

D: 头孢美唑

答案：B

31. 可抑制细菌的 DNA 依赖性 RNA 多聚酶的是 ()。

A: 磷霉素

B: 替考拉宁

C: 舒巴坦

D: 利福平

答案：D

32. 用药过程中需要监护迟发性腹泻的是()

A: 紫杉醇

B: 长春碱类

C: 多柔比星

D: 伊立替康

答案：D

33. 风湿性心脏病重度二尖瓣狭窄宜

A: 常规剂量的洋地黄

B: 停用洋地黄

C: 快速洋地黄化

D: 不宜使用洋地黄

答案：D

34. 门冬酰胺酶能抑制蛋白质的合成，使细胞停止于()，从而降低其对甲氨蝶呤的敏感性，限制甲氨蝶呤的骨髓毒性

A: G

B: G

C: M 期

D: G

答案：D

35. (2017 年真题) 药师在急诊药房值班时, 接听病房咨询电话, 得知一新入院耐甲氧西林金黄葡萄球菌肺部感染的 7 岁儿童患者, 出现高热、肺纹加重, 患儿肾功能正常。欲静脉滴注万古霉素。

- A: 替考拉宁
- B: 头孢哌酮
- C: 头孢曲松
- D: 阿米卡星

答案: A

36. (2017 年真题) 减少钠离子内流而使神经细胞膜稳定, 属于乙内酰胺类抗癫痫药的是 ()

- A: 加巴喷丁
- B: 苯妥英钠
- C: 苯巴比妥
- D: 卡马西平

答案: B

37. (2018 年真题) 属于膨胀性泻药的是 ()

- A: 硫酸镁
- B: 聚乙二醇 4000
- C: 蓖麻油
- D: 乳果糖

答案: B

38. 与瑞格列奈无药物相互作用的是

- A: 伊曲康唑
- B: 吉非贝齐
- C: 克拉霉素

D: 环孢素

答案：C

39. 氯霉素抗菌谱广，而最主要的不良反应是()

A: 二重感染

B: 对造血系统的毒性

C: 对肝脏严重损害

D: 胃肠道反应

答案：B

40. 不属于抗乙型肝炎病毒的药品是

A: 干扰素- α

B: 泛昔洛韦

C: 恩替卡韦

D: 拉米夫定

答案：B

41. 其他 β -内酰胺类抗生素的主作用靶位是

A: 二氢叶酸合成酶

B: 细菌核蛋白体 50S 亚基

C: DNA 螺旋酶

D: 细菌胞浆膜上特殊蛋白 PBPs

答案：D

42. 关于 α 葡萄糖苷酶抑制剂的作用特点描述，不正确的是

A: 易导致低血糖

B: 临床用于各型糖尿病

C: 口服吸收很少

D: 可单用于老年患者或餐后高血糖患者

答案: A

43. 抑制排卵避孕药的较常见的不良反应是()

A: 多毛、痤疮

B: 增加哺乳期妇女的乳汁分泌

C: 肾功能损害

D: 子宫不规则出血

答案: D

44. 抑制磷酸二酯酶而加强心肌收缩力的药物是

A: 西地兰

B: 米力农

C: 螺内酯

D: 地高辛

答案: B

45. (2019 年真题) 服用后易出现呃逆、腹胀和嗝气，甚至引起反跳性胃酸分泌增加的药物是 ()

A: 替普瑞酮

B: 复方碳酸钙

C: 胶体果胶铋

D: 奥美拉唑

答案: B

46. 具有肾保护作用的降压药是

A: 氢氯噻嗪

B: 硝苯地平

C: 缬沙坦

D: 沙拉新

答案: C

47. 金刚烷胺和美金刚合用

A: 增加肾毒性

B: 增加锥体外系不良反应的风险

C: 增加中枢神经系统毒性(建议避免合用)

D: 可增加抗胆碱不良反应的危险

答案: C

48. 咪唑类药物的抗真菌作用机制是()

A: 竞争性抑制鸟嘌呤进入 DNA 分子中，阻断核酸合成

B: 影响真菌细胞膜通透性

C: 抑制以 DNA 为模板的 RNA 多聚酶，阻碍 mRNA 合成

D: 影响二氢叶酸合成

答案: B

49. 下列对皮肤真菌感染治疗药叙述错误的是()

A: 酮康唑为咪唑类抗真菌药

B: 奈替芬是丙烯胺类抗真菌药

C: 阿莫罗芬为唑类的局部抗真菌药

D: 环吡酮胺为吡啶酮类抗真菌药

答案: C

50. 属于二氢叶酸还原酶抑制剂的是

A: 长春瑞滨

B: 吉西他滨

C: 甲氨蝶呤

D: 巯嘌呤

答案: C

51. 属于第三代头孢菌素的药物是()。

A: 头孢拉定

B: 头孢氨苄

C: 头孢哌酮

D: 头孢吡肟

答案: C

52. 急性心肌梗死引起的急性室性心动过速可选用

A: 利多卡因

B: 硝苯地平

C: 美西律

D: 阿托品

答案: A

53. 作用较慢，首日剂量可增加至常规剂量 2~3 倍的利尿药物是

A: 氢氯噻嗪

B: 乙酰唑胺

C: 螺内酯

D: 呋塞米

答案: C

54. 治疗心绞痛急性发作的首选药物是()

A: 维拉帕米

B: 地尔硫

C: 普萘洛尔

D: 硝酸甘油

答案: D

55. 患者，女，41 岁，因进食不洁食物后发生腹泻，伴有恶心、呕吐及下腹痛，大便每日 6~8 次，为糊状或稀水状，伴有黏液。血常规检查提示：白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规：白细胞 8~10 / HP，红细胞 3~5 / HP。诊断：急性腹泻。医嘱：复方地芬诺酯片，2 片，口服，3 次 / 日；诺氟沙星胶囊，300mg，口服，2 次 / 日。

A: 肾功能

B: 尿量

C: 电解质

D: 肝功能

答案: C

56. (2018 年真题) 可抑制粒细胞浸润和白细胞趋化, 用于痛风急性发作的药物是 ()

A: 苯溴马隆

B: 非布索坦

C: 别嘌醇

D: 秋水仙碱

答案: D

57. 属于 β_2 受体激动剂的是

A: 孟鲁司特

B: 异丙托溴铵

C: 福莫特罗

D: 乙酰胆碱

答案：C

58. 属于 α_1 受体阻断剂治疗良性前列腺增生症的是

- A: 度他雄胺
- B: 西地那非
- C: 坦洛新
- D: 他达拉非

答案：C

59. 袢利尿药发挥利尿的作用点是

- A: 碳酸酐酶
- B: 磷酸二酯酶
- C: Na^+-Cl^- 共转运子
- D: $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 同向转运子

答案：D

60. 一般反应较轻，仍可能引起过敏性休克的是

- A: 格列本脲
- B: 西格列汀
- C: 二甲双胍
- D: 胰岛素

答案：D

61. 无雌激素、雄激素、肾上腺皮质激素样作用代谢物没有雌激素活性，可用于黄体功能不足的先兆流产治疗的药物是

- A: 环丙孕酮
- B: 地屈孕酮
- C: 甲羟孕酮

D: 屈螺酮

答案：B

62. 属于 I b 类抗心律失常药且具有抗癫痫作用的是()

A: 维拉帕米

B: 利多卡因

C: 苯妥英钠

D: 普鲁卡因胺

答案：C

63. 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)高检出率的医疗机构,进行人工瓣膜置换术时,为预防 MRSA 感染,可选用()

A: 青霉素 G

B: 头孢唑林

C: 氨曲南

D: 万古霉素

答案：D

64. 在体内可与含羟基或羧基的毒物结合形成低毒或无毒结合物排出体外,起到解毒和保护肝脏的作用,用于急、慢性肝炎治疗的药物是()

A: 硫普罗宁

B: 异甘草酸镁

C: 腺苷蛋氨酸

D: 葡醛内酯

答案：D

65. 与顺铂联合应用可致严重肾毒性的药物是

A: 利妥昔单抗

- B: 阿糖胞苷
- C: 氟尿嘧啶
- D: 甲氨蝶呤

答案：A

66. (2020 年真题) 使用某些头孢菌素或其他药物期间，饮酒可能引起“双硫仑样”反应，临床常见的表现不包括

- A: 血压升高或降低、心率加快
- B: 头痛、胸闷、气急、出汗
- C: 发热、血管扩张、面色潮红
- D: 喉头水肿、尿潴留

答案：D

67. 碳酸钙用于肾衰竭患者降低血磷时，适宜的服药时间是()

- A: 餐后 2h
- B: 餐前即刻
- C: 清晨或睡前
- D: 餐中

答案：D

68. 通过将身体的水分吸到肠道或防止大便中的水分被吸收来增加肠道中的水分来发挥致泻作用的是

- A: 甘油
- B: 酚酞
- C: 乳果糖
- D: 聚乙二醇 4000

答案：C

69. (2019 年真题) 患者，男，67 岁，为葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症患者，如果使用复方磺胺甲噁唑，可能引发的药源性疾病是 ()

- A: 肌肉震颤
- B: 急性溶血性贫血
- C: 抗生素相关性腹泻
- D: 红人综合征

答案: B

70. 可以降低血尿酸水平，但升高尿尿酸水平而导致肾结石的抗痛风药是

- A: 丙磺舒
- B: 秋水仙碱
- C: 呋塞米
- D: 别嘌醇

答案: A

71. 可能引起中性粒细胞减少的药物是

- A: 左甲状腺素
- B: 丙硫氧嘧啶
- C: 鲨肝醇
- D: 碘及碘化物

答案: B

72. 能升高血糖，对抗胰岛素的降血糖作用的是

- A: 格列喹酮
- B: 普萘洛尔
- C: 磺胺甲唑
- D: 甲状腺素

答案：D

73. 通过选择性抑制 5α -还原酶而抑制前列腺增生的药物是

- A: 甲睾酮
- B: 依立雄胺
- C: 特拉唑嗪
- D: 哌唑嗪

答案：B

74. 在物理降温配合下，可使体温降至正常以下，用于人工冬眠疗法的药物是

- A: 氯丙嗪
- B: 硫喷妥钠
- C: 阿司匹林
- D: 地西洋

答案：A

75. 下列关于雌激素的描述，错误的是

- A: 长期使用需监测血糖
- B: 雌激素治疗可能增加乳腺癌的风险
- C: 雌激素治疗前需评估患者发生血栓的风险
- D: 雌激素治疗可能诱发阴道出血

答案：A

76. 属于延长动作电位时程的抗心律失常药是()。

- A: 硝酸甘油
- B: 利多卡因
- C: 美托洛尔

D: 索他洛尔

答案: D

77. 服药期间须大量饮水，防止发生结晶尿的药物是

A: 左氧氟沙星

B: 磺胺甲恶唑

C: 克林霉素

D: 头孢呋辛

答案: B

78. 与青霉素相比，阿莫西林()

A: 对革兰阴性杆菌作用强

B: 对 β -内酰胺酶稳定

C: 对革兰阳性细菌的抗菌作用强

D: 对耐药金黄色葡萄球菌有效

答案: A

79. 天然的雌激素是()

A: 炔雌醚

B: 戊酸雌二醇

C: 黄体酮

D: 雌二醇

答案: D

80. 四环素联用钙剂使

A: 增加麦角中毒的风险

B: 调整抗凝血药的剂量

C: 口服吸收减少

D: 肝毒性增加

答案: C

81. 抑制过敏介质释放，主要用于预防哮喘发作的药物是

A: 色甘酸钠

B: 异丙肾上腺素

C: 特布他林

D: 倍氯米松

答案: A

82. 一般剂量长期疗法

A: 中毒性感染和休克

B: 变态反应性疾病

C: 顽固性支气管哮喘

D: 湿疹

答案: C

83. (2016 年真题) 可抑制细菌的 DNA 依赖性 RNA 多聚酶的是

A: 利福平

B: 替考拉宁

C: 舒巴坦

D: 磷霉素

答案: A

84. 以下不属于胰岛素的不良反应的是()

A: 低血糖

B: 脂肪萎缩与肥厚

C: 胰岛素抵抗

D: 高钾血症

答案：D

85. 疗效优于乙琥胺，但因有肝毒性，仅在癫痫小发作合并大发作时应用的药物是

A: 卡马西平

B: 苯巴比妥

C: 丙戊酸钠

D: 苯妥英钠

答案：C

86. 可对第八对脑神经造成损害的是()

A: 链霉素

B: 异烟肼

C: 乙胺丁醇

D: 利福平

答案：A

87. 不可与氟西汀合用的是

A: 肝药酶抑制剂

B: 单胺氧化酶抑制剂

C: 竞争性 β -内酰胺酶抑制剂

D: 核酸合成抑制剂

答案：B

88. 有心肌梗死、脑梗死病史患者可以使用

A: 选择性 COX-2 抑制剂

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 水杨酸类

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/336120030100011030>