临床眼科学练习题与答案

1、急性泪囊炎早期可 0

A、冷敷

B、热敷

C、泪道探通

D、泪道冲洗

答案：B

2、以下哪项不是原发开角型青光眼的危险因素（）

A、糖尿病

B、远视眼

C、近视眼

D、甲状腺功能低下

答案：B

3、下列哪项不是视网膜中央动脉阻塞的典型表现 0

A、黄斑樱桃红

B、视乳头苍白

C、视力突然下降

D、视网膜出血

答案：D

4、角膜是主要的屈光介质，其屈光度其相当于（）

A、19D 凸透镜

B、20D 凹透镜

C、42D 凸透镜

D、43D 凸透镜

答案：D

5、下列不是倒睫的临床表现的是（）

A、患者有眼痛、流泪和异物感

B、结膜充血

C、可出现角膜新生血管

D、倒睫一定是多根一起发生

答案：D

6、下列关于表层巩膜炎描述不正确的是（）

A、急性发病,周期性发作

B、一般不影响视力,有自限性

C、表层巩膜和球结膜弥漫性充血水肿

D、亦引起虹膜睫状体炎

答案：D

7、急性泪囊炎的临床表现（）

A、泪囊区皮肤红肿、压痛

B、可形成脓肿

C、结膜充血且有大量分泌物

D、以上都是

答案：D

8、角膜组织学分五层，下列损伤后可再生的是（）

A、角膜上皮层和基质层

B、角膜上皮层和内皮层

C、角膜上皮层和后弹力层

D、前弹力层和后弹力层

答案：C

9、Coldenhar 综合征不包括以下哪项（）

A、耳前瘘管

B、眼睑缺损

C、眶肿物

D、伴附耳

答案：C

10、成人眶内最常见的良性肿瘤是（）

A、炎性假瘤

B、甲状腺相关性眼病

C、海绵状血管瘤

D、脑膜瘤

答案：C

11、关于药物及中毒性白内障,下列叙述不正确的是（）

A、糖皮质激素性白内障停药后,少数患者混浊可逆转

B、缩瞳剂性白内障停药后,混浊多可停止进展

C、三硝基甲苯性白内障停药后仍可继续发展

D、缩睡剂性白内障多为后囊下混浊

答案：D

12、沙眼衣原体何时由我国汤飞凡、张晓楼等人首次分离出来（）

A、1950 年

B、1956 年

C、1960 年

D、1965 年

答案：B

13、以下不符合人工晶体眼的“调节”的是 0

A、手术后轻度近视

B、兼顾远、近视力

C、满足学习和生活需求

D、保证夜视力

答案：B

14、非屈光调节性内斜视表现为（）

A、AC/A 高

B、高度远视

C、一般不伴有弱视

D、屈光矫正后仍有内斜视

答案：A

15、我国沙眼的临床分为（）

A、I 期

B、II 期

C、III 期

D、IV 期

答案：C

16、晶状体的直径约为 0

A、7-1Imm

B、9-IOnini

Cˆ9-10.5mm

Dˆ4-5mm

答案：B

17、附在距角膜缘 6.9mm 处，腱长 8.8mm,宽 9.2mm 是（）

A、上直肌

B、下直肌

C、外直肌

D、内直肌

答案：C

18、手术时切口在睑皮肤面，与睑缘平行的疾病是（）

A、鳞屑性睑缘炎

B、外睑腺炎

C、睑板腺囊肿

D、内睑腺炎

答案：B

19、早起青光眼的视野不会出现那种病理改变 O

A、颗侧视岛

B、旁中心暗点

C、颜侧楔状缺损

D、鼻侧阶梯状暗点

答案：A

20、我国眼睑恶性肿瘤中最常见的为（）

A、皮脂腺癌

B、鳞状细胞癌

C、皮肤基底细胞癌

D、恶性黑色素瘤

答案：C

21、正常人 24 小时眼压差 W（）

A、3mmHg

B、4ImnHg

C、 5mmHg

D、 8mmHg

答案：D

22、属于机械性眼外伤的是（）

A、电光性眼炎

B、化学性眼外伤

C、眼挫伤

D、毒气伤

答案：C

23、泪膜破裂时间（BUT）测试结果中,表示泪膜不稳定的时间为（）

A、<10 秒

B、<15 秒

C、<20 秒

D、<25 秒

答案：A

24、角膜代谢所需营养的主要来源 0

A、房水

B、泪膜

C、泪液

D、角膜缘血管网

答案：D

25、〃下列有关〃疮症性〃失明的描述错误的（）〃

A、患者多有精神创伤,或情绪激动的历支

B、眼底检查正常

C、视野可向心性缩小或呈螺旋形缩小

D、瞳孔对光反射消失

答案：D

26、泪膜水样层的分泌主要是由（）

A、结膜杯状细胞

B、泪腺和副泪腺

C、睑板腺

D、结膜上皮细胞

答案：B

27、细菌性结膜炎患者的结膜分泌物呈（）

A、黏液液性或脓性

B、浆液性或水样

C、浆液性、黏液性和黏稠丝状

D、浆液性、黏稠丝状和脓性

答案：A

28、角膜结核最常见的的临床表现是（）

A、泡性角膜炎

B、边缘性角膜炎

C、角膜基质炎

I）、结核性角膜溃疡

答案：C

29、下列哪项不是急性虹膜睫状体炎的体征（）

A、瞳孔缩小

B、睫状充血

C、前房闪辉阳性

D、角膜基质层沉着物

答案：D

30、真菌性角膜炎治疗时，那一项不正确 O

A、全身应用抗真菌药物

B、禁用皮质类固醇

C、并发结膜炎者可用 1%匹罗卡品点眼

D、局部应用抗真菌药物

答案：C

31、引起急性泪腺炎的主要细菌是（）

A、克雷白杆菌

B、β 溶血性链球菌

C、白色念珠菌

D、金黄色葡萄球菌

答案：D

32、长期大量使用氯丙嗪易引起的眼部损害为（）

A、晶体前囊下浅棕色或灰白色小点沉着,最终形成白内障

B、视乳头水肿

C、角膜上皮内色素沉着

D、眼睑水肿

答案：A

33、下列哪项不是慢性泪腺炎的表现（）

A、上睑轻度下垂

B、疼痛剧烈

C、可见睑部肿胀泪腺

D、可触及质硬、活动包块

答案：B

34、中间葡萄膜炎的特征性改变（）

A、眼前有飘动的黑影

B、睫状体平坦部有雪堤样改变

C、视网膜血管炎

D、视力明显下降

答案：B

35、结膜炎最基本的体征是（）

A、结膜充血

B、结膜出血

C、结膜水肿

D、分泌物增多

答案：A

36、角膜鳞状上皮细胞癌常发生于（）

A、10-30 岁

B、30-50 岁

C、50-70 岁

D、70-90 岁

答案：C

37、角膜基质层占角膜总厚度的（）

A、50%

B、60%

C、70%

D、90%

答案：D

38、不属于重度伤的是（）

A、眼球穿通伤

B、眼内异物

C、毒气伤

D、眼睑广泛撕脱或缺损

答案：C

39、结膜炎最基本的体征是 0

A、滤泡形成

B、结膜充血

C、球结膜水肿

D、分泌物增多

答案：B

40、骨性眼眶大致呈（）

A、圆形

B、正方形

C、长方形

D、锥形

答案：D

41、玻璃体的基本病理改变是 0

A、玻璃体液化

B、玻璃体炎症

C、PVD

D、玻璃体出血

答案：A

42、带状疱疹病毒性睑皮炎感染的是O

A、三叉神经半月神经

B、三叉神经第一支

C、以上均是

D、以上均不是

答案：C

43、下列哪种结膜炎有假膜形成（）

A、流行性角结膜炎

B、急性出血性结膜炎

C、新生儿包涵体结膜炎

D、成人包涵体结膜炎

答案：A

44、结膜分泌物涂片中，发现大量嗜酸性细胞应考虑为（）

A、沙眼

B、滤泡性结膜炎

C、春季角结膜炎

D、慢性结膜炎

答案：C

45、下列不属于屈光不正的是（）

A、屈光参差

B、老视

C、近视

D、远视

答案：B

46、眼型重症肌无力的特征是（）

A、伴上睑下垂

B、有复视

C、有晨轻夜重现象

D、以上均是

答案：A

47、睑结膜面局限充血、肿胀,有硬结、疼痛和压痛，2-3 天后其中心形咸黄色脓点，多可自行穿破睑结膜面而痊愈。此病症为（）

A、外睑腺炎

B、溃疡性睑缘炎

C、鳞屑性险缘炎

D、内睑腺炎

答案：D

48、下列哪项不属于巩膜的特点（）

A、乳白色不透明

B、血管及细胞成分较少

C、代谢活跃

D、由致密的胶原纤维和弹力纤维组成

答案：C

49、引起玻璃体积血的主要疾病是（）

A、眼外伤

B、糖尿病性视网膜病变

C、视网膜静脉阻塞

D、视网膜血管炎

答案：D

50、动眼神经支配（）

A、外直肌

B、内直肌

C、内斜肌

D、内直肌、上直肌、下直肌与下斜肌

答案：D

51、巩膜葡萄肿发生的原因不可能是（）

A、巩膜变薄

B、眼内压增高

C、巩膜增厚

D、高度近视眼

答案：C

52、真菌性角膜炎中占首位致病菌的是（）

A、曲霉素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/337021124005006043