

2024 甘肃省临潭县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库（各地真题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 巴比妥类重度中毒时出现的中枢神经系统症状为

- A: 昏迷、血压降低、呼吸抑制、心动缓慢和晕厥
- B: 可见心律失常、心搏骤停
- C: 呼吸减慢、变浅不规则，或呈潮式呼吸
- D: 可引起狂躁发作

答案：D

2. 患者，男，72 岁既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。一个月前因出现哮喘症状就诊医师布地奈德气雾剂 200 μ g bid 吸入沙丁胺醇气雾剂 100 μ g prn 吸入，氨氯地平片 5mg qd 口服及硝酸甘油片 0.5mg prn 舌下含服治疗。

- A: 漱口→摇匀→呼气→按压阀门并深吸气→屏气约 10s
- B: 摇匀呼气→深吸气同时按压阀门→屏气约 10s→漱口
- C: 呼气→按压阀门并深吸气→屏气约 10s→漱口
- D: 呼气→摇匀→按压阀门并深吸气→屏气约 10s→漱口

答案：B

3. (妊娠的危险性分级)在有对照组的早期妊娠妇女中未显示对胎儿有危险(并在中、晚期妊娠中亦无危险的证据)，可能对胎儿的伤害极小

- A: A 级
- B: B 级

C: C 级

D: D 级

答案: A

4. 属于 5 α 还原酶抑制剂的是

A: 氟他胺

B: 依立雄胺

C: 黄酮哌酯

D: 雌三醇

答案: B

5. 洋地黄中毒的特征性表现为

A: 黄视、绿视

B: 快速房性心律失常伴传导阻滞

C: 恶心

D: 视力模糊

答案: B

6. 患者，男，58 岁，患 2 型糖尿病、高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo、瑞格列奈片 1mg tidpo、阿托伐他汀片 20mg qdpo 等药物治疗。

A: 停用瑞格列奈片

B: 停用二甲双胍肠溶片

C: 停用阿托伐他汀钙片

D: 停用瑞格列奈片和阿托伐他汀钙片

答案: B

7. 关于丁螺环酮治疗焦虑症的优点，下列说法不正确的为

- A: 镇静作用轻
- B: 起效快
- C: 无呼吸抑制
- D: 较少引起运动障碍

答案：B

8. 可导致嗜酸性粒细胞升高及维生素 K 减少的抗菌药物是

- A: 青霉素
- B: 美罗培南
- C: 头孢唑林
- D: 头孢哌酮

答案：D

9. 禁用油类泻剂导泻的毒物是 ()。

- A: 麻黄碱
- B: 磷化锌
- C: 阿片类药物
- D: 麦角胺

答案：B

10. 冠心病患者入不能耐受 ACEI，可考虑给予 ()

- A: AR
- B: α 受体拮抗剂
- C: 地高辛
- D: β 受体激动剂

答案：A

11. 用于治疗铅中毒的特殊解毒剂是 ()

- A: 纳洛酮
- B: 乙氟胺
- C: 氟马西尼
- D: 青霉胺

答案：D

12. 禁用阿朴吗啡催吐的毒物是()。

- A: 磷化锌
- B: 麦角胺
- C: 麻黄碱
- D: 阿片类药物

答案：D

13. 服用保泰松、水杨酸钠可呈现

- A: 橘红至红色
- B: 黄色
- C: 红至黑色
- D: 白陶土便

答案：C

14. (2017 年真题) 慢性阻塞性肺病急性加重期伴脓痰者宜选用的治疗方案是()

- A: 抗菌药物+短效支气管舒张剂+糖皮质激素
- B: 吸入型糖皮质激素+镇咳药+抗过敏药
- C: 吸入型糖皮质激素+磷酸二酯酶抑制剂
- D: 长效 β_2 受体激动剂+吸入型糖皮质激素

答案：A

15. 下列药物中，药师需要提示患者随身携带的是

- A: 胰酶肠溶胶囊
- B: 硝酸甘油片
- C: 甲硝唑片
- D: 高锰酸钾片

答案：B

16. 医师无权调配处方

- A: 有效性
- B: 技术性
- C: 经济性
- D: 法律性

答案：D

17. 若需要 70%的乙醇 1000ml，现有 95%的乙醇应如何配制

- A: 取 263.2ml95%的乙醇，加水稀释至 1000ml
- B: 取 736.8ml95%的乙醇，加 1000ml 水
- C: 取 736.8ml95%的乙醇，加水稀释至 1000ml
- D: 取 263.2ml95%的乙醇，加 1000ml 水

答案：C

18. 患儿，男，3 岁半，身高 95cm，体重 16kg 一天前开始发热，20h 左右出现腹泻，约 3h 一次大便，量少，黄色黏液便，呕吐 1 次。检查结果：体温 38.8° C，脉搏 118 次/分，呼吸 28 次/分，出现轻微脱水症状，白细胞计数 $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \times 10^9/L$ - $10.0 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

- A: 首选口服补液，必要时静脉补液
- B: 腹泻可致电解质丢失，故需特别注意补充电解质

C: 益生菌应避免与小檗碱、鞣酸蛋白同时服用

D: 药用炭可以吸附细菌和毒素，可与微生态制剂同时服用

答案：D

19. 属于容积性泻药的药物是

A: 比沙可啶

B: 硫酸镁

C: 乳果糖

D: 甘油栓

答案：B

20. 用于用药错误分级的是（）

A: CoChrAnE 分级

B: CoCkroft-GAut 公式

C: NCEMERP 标准

D: CLHD 公式

答案：C

21. 患儿，男，12 岁，连续 3 日夜间咳嗽就诊，首选的止咳药是

A: 氨溴索

B: 糖皮质激素

C: 苯丙哌林

D: 右美沙芬

答案：D

22. 紫外线加速一些药品的氧化、分解，归属于

A: 空气

B: 温度

C: 湿度

D: 日光

答案: D

23. 严重心脏病患者不能

A: 洗胃

B: 催吐

C: 实施血液净化

D: 强利尿

答案: B

24. 肾脏有效循环血量与肾小球滤过率较成人低 30%~40%可影响

A: 药物中毒

B: 药物吸收

C: 药物排泄

D: 药物代谢

答案: C

25. 应提示患者服用后舌苔、大便可呈灰褐色的是

A: 枸橼酸铋钾

B: 米索前列醇

C: 胰岛素注射剂

D: 氟西汀

答案: A

26. 蛋白酶抑制剂 ()

A: NRTIs

B: PIs

C: FIs

D: NNRTIs

答案：B

27. 某男性，27 岁，间断上腹痛 3 年，表现为餐后痛，1~2 小时后缓解，以冬春季多发。

A: PPI+西咪替丁+阿莫西林+铋剂

B: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铝碳酸镁

C: PPI+克拉霉素+阿莫西林+铋剂

D: 法莫替丁+克拉霉素+阿莫西林+铋剂

答案：C

28. (2018 年真题) 患者，女，45 岁，6 个月前因出现口吐白沫、意识变更、二便失禁，在专科医生指导下进行抗癫痫药物治疗，症状控制较好，近 3 个月服用西咪替丁，患者出现脱发、体重增加、胃肠道功能紊乱，该患者各地求医，服用各种药物，具体药物品种不详。围绕该病例，医师、药师、护士对抗癫痫药的安全用药和用药事项进行用药讨论。

A: 遵从联合治疗原则

B: 有条件的应测定药物血液浓度

C: 长期规律用药

D: 定期监测肝功能

答案：A

29. 消化性溃疡抗 H. pylori 的四联疗法使用疗程为 ()

A: 6~8 周

B: 10 日或 14 日

C: 8~12 周

D: 4~6 周

答案：B

30. 李女士，40 多岁，来药店咨询皮肤瘙痒用药。经询问和查看后得知：李女士手心皮肤干燥、脱皮，没有破裂，没有水疱和渗出（无感染征象），瘙痒严重，尤其是夜间。自述症状在逐渐加重，之前有过类似症状，但都很轻微。进一步询问得知，她最近开始在餐厅厨房工作，每天需要清洗大量碗筷。

- A: 地西泮
- B: 唑吡坦
- C: 文拉法辛
- D: 氯苯那敏

答案：D

31. 患者，女，69 岁，体型偏胖，BMI30.1kg / m²，患者诉平卧时常有反酸、烧心、胸痛，偶感背痛半年，近 1 周出现夜间咳嗽、咽部有异物感。自用止咳糖浆无效。查体：咽红，声音嘶哑；双肺听诊未闻及干、湿性啰音，偶有哮鸣音。既往史：高血压病史 12 年，服用氨氯地平片 5mgqd，平素血压可控制在 140 / 85mmHg 左右；高脂血症病史 10 年，服用阿托伐他汀钙片 20mgqd。

- A: 心绞痛
- B: 胃食管反流病
- C: 支气管哮喘
- D: 胃溃疡

答案：B

32. 妊娠期妇女甲亢首选

- A: 放射性 ¹³¹I
- B: 碘化钾

C: 丙硫氧嘧啶

D: 甲巯咪唑

答案: C

33. 治疗药物选择的基本原则及方法叙述错误的是

A: 经济性方面主要考虑药费，排除其他治疗成本

B: 用药安全是药物治疗的前提

C: 有效性是选择药物的首要标准

D: 给药方便性可能影响患者对治疗的依从性

答案: A

34. 可引起驾驶员视力模糊的药物是

A: 双嘧达莫

B: 东莨菪碱

C: 阿米洛利

D: 抗过敏药

答案: B

35. 李某，58 岁，高血压病史 10 年，伴慢性心功能不全，给予地高辛每日维持量治疗，突然出现窦性心动过缓，宜选用的治疗药物是

A: 维拉帕米？

B: 阿托品？

C: 普萘洛尔？

D: 肾上腺素？

答案: B

36. 是前药，其活性代谢产物是强效的选择性的甲型和乙型流感病毒神经氨酸酶抑制剂，通常用于甲型或乙型流感病毒治疗的是

- A: 干扰素
- B: 更昔洛韦
- C: 奥司他韦
- D: 氟胞嘧啶

答案：C

37. 提示：不要驾车，操作机器或高空作业等，是针对

- A: 氯苯那敏
- B: 铋制剂
- C: 氟西汀
- D: 卡托普利

答案：A

38. （2021 年真题）患者，男，58 岁，有高血压、冠心病、高脂血症、便秘、骨关节炎和胃溃疡病史，2 年前接受冠脉支架植入术。近日，患者先后在心内科、消化科、骨科就诊，开具药品如下：

- A: 同时使用双氯芬酸钠与阿司匹林会增加消化道出血风险，两药不宜合用
- B: 美托洛尔会影响阿司匹林的抗血小板活性，应停用
- C: 阿托伐他汀钙用于冠心病的治疗，需长期规律用药
- D: 如大便次数规律（如每日 1 次），聚乙二醇 4000 散可按需使用

答案：B

39. （2015 年真题）细菌感染患者可出现（）。

- A: 中性粒细胞增多
- B: 红细胞/血红蛋白减少
- C: 血小板增多
- D: 嗜酸性粒细胞增多

答案：A

40. 杨某，女，19 岁，咳嗽，有脓性痰，并伴有胸痛；发热 39℃；肺闻及湿性啰音；WBC $>13\times 10$

- A: 利福霉素
- B: 红霉素
- C: 左氧氟沙星
- D: 链霉素

答案：C

41. 患者男 50 岁临床诊断为焦虑症，给予氟西汀 20mgqd 治疗。对该患者用药教育的说法错误的是()

- A: 氟西汀应于睡前服用
- B: 不能突然停止服用氟西汀
- C: 服用氟西汀期间不能饮酒
- D: 不得随意自行调整氟西汀剂量

答案：A

42. 发现处方存在或潜在的问题，制定并实施干预和改进措施，归属于

- A: 处方点评
- B: 静脉药物配置
- C: 处方审核
- D: 治疗药物监测

答案：A

43. 冠状动脉粥样硬化心脏病患者，如没有用药禁忌症，欲服用阿司匹林作为一线预防，最佳剂量范围是

- A: 25~75mg/d

B: 75~150mg/d

C: 25~50mg/d

D: 150~300mg/d

答案：B

44. 吸烟后使平喘作用减退、维持时间缩短的药物是

A: 胰岛素

B: 西咪替丁

C: 氯丙嗪

D: 呋塞米

答案：D

45. 贫血患者常出现()

A: 血红蛋白减少

B: 中性粒细胞增多

C: 嗜酸性粒细胞增多

D: 血小板计数增多

答案：A

46. 患者，女，45岁，既往有扩张型心肌病，近1年出现劳累性呼吸困难，1天前因感冒出现发热、咳嗽、咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。肺动脉瓣区第二心音亢进及舒张早期和中期奔马律。

A: 毛花苷丙

B: 卡托普利

C: 硝苯地平

D: 地高辛

答案：A

47. (2016 年真题) 患者，女，64 岁，患 2 型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片 0.5gtidpo，瑞格列奈片 1mg tidpo，阿托伐他汀钙片 20mg qdpo 等药物治疗。

- A: 每次调整 1-4 单位
- B: 根据血糖水平调整低精蛋白锌胰岛素用量
- C: 开启使用中的低精蛋白锌胰岛素必须放入冷藏保存
- D: 每 3-5 天调整 1 次

答案: C

48. 药库接受了一批药品，其中需要在冷处贮存的是

- A: 双歧三联活菌胶囊
- B: 西地碘片
- C: 乳酶生片
- D: 硫普罗宁片

答案: A

49. 关于药物作用相加或增加疗效的举例, 克拉维酸钾、舒巴坦为 β -内酰胺酶抑制剂, 使青霉素类、头孢菌素类等 β -内酰胺类抗生素免受开环破坏, 抗菌疗效增强。是属于

- A: 延缓或降低抗药性
- B: 作用于不同的靶位
- C: 保护药品免受破坏
- D: 促进机体的吸收利用

答案: C

50. 患者，女，21 岁，近半年来食欲亢进，多汗体重明显减轻，伴有乏力、心悸。就诊查体见双手震颤，心率 104 次/分，化验结果：血清促甲状腺素 (TSH) $<0.1\text{mU/L}$ ，FT3、FT4 明显升高，肝肾功能基本正常，白细胞计数正常，诊断为甲状腺功能亢进症。首选的治疗方案是()

- A: 注意休息补充营养，使用甲巯咪唑治疗
- B: 选用 ^{131}I 治疗
- C: 甲状腺次全切除手术
- D: 碘化钾治疗，定期复查

答案：A

51. 治疗缺铁性贫血的首选药物是

- A: 维生素 B12
- B: 叶酸
- C: 硫酸亚铁
- D: 维生素 C

答案：C

52. 新药临床评价分为

- A: 四期
- B: 二期
- C: 一期
- D: 三期

答案：A

53. (2019 年真题) 关于处方开具和调剂的说法，正确的是

- A: 查处方时“四查”是指查对药名、剂型、规格和数量
- B: 应使用淡红色处方开具第二类精神药品
- C: 处方开具后 7 日内有效

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 调剂处方时应做到“四查十对”

答案: D

54. 尿液是人体泌尿系统排除的代谢废物，正常人每日排出尿液 1000～3000ml。其中 97% 为水分，而在 3% 的固体物质中，主要含有两大类物质：有机物（尿素、尿酸、肌酐等蛋白质代谢产物）和无机物（氯化钠、磷酸盐、硫酸盐、铵盐等）。

- A: 组织性蛋白尿
- B: 肾毒性蛋白尿
- C: 肾小管性蛋白尿
- D: 溢出性蛋白尿

答案：B

55. 合并心力衰竭的高血压患者，降压目标值为

- A: <130 / 80mmHg
- B: <125 / 75mmHg
- C: <140 / 90mmHg
- D: <150 / 90mmHg

答案：C

56. 人的体重指数（BMI）= 体重（kg） / 身高的平方（m²），中国人根据 BMI 值判断肥胖的标准是

- A: <18.5
- B: ≥26
- C: 18.5～23.9
- D: ≥28

答案：D

57. 李女士，40 多岁，来药店咨询皮肤瘙痒用药。经询问和查看后得知：李女士手心皮肤干燥、脱皮，没有破裂，没有水疱和渗出（无感染征象），瘙痒严重，尤其是夜间。自述症状在逐渐加重，之前有过类似症状，但都很轻微。进一步询问得知，她最近开始在餐厅厨房工作，每天需要清洗大量碗筷。

- A: 复方片仔癀软膏
- B: 氢化可的松软膏
- C: 异维 A 酸软膏
- D: 复方樟脑软膏

答案：B

58. 白细胞分类中，嗜酸性粒细胞参考范围为

- A: 1%~5%
- B: 50%~70%
- C: 20%~40%
- D: 3%~8%

答案：A

59. 促进铁剂吸收的

- A: 碳酸氢钠
- B: 维生素 C
- C: 胰酶
- D: 牛奶、蛋类

答案：B

60. 选择性单胺氧化酶 A 抑制剂

- A: 氟伏沙明
- B: 吗氯贝胺

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 米氮平

D: 氯米帕明

答案：B

61. 抗生素的理论效价指纯品的质量与效价单位的折算比率。以其特定的“盐” $1\mu\text{g}$ 作为 IU 的抗生素是

- A: 土霉素
- B: 红霉素
- C: 链霉素
- D: 四环素

答案：D

62. 老年 CAP 患者。不能选用的治疗药物是

- A: 大环内酯类
- B: 第三代头孢菌素
- C: 氟喹诺酮类
- D: 碳青霉烯类

答案：C

63. (2018 年真题) 患者，男，72 岁，患有阿尔茨海默病，给予卡巴拉汀每日 3mg 治疗。药师对该患者的用药指导，正确的是 ()

- A: 每日早晚空腹口服
- B: 每日早晚与食物同服
- C: 每晚睡前口服
- D: 每日清晨空腹口服

答案：B

64. 具有长效、平稳、血药浓度无峰值特点的胰岛素/胰岛素类似物是

- A: 普通胰岛素
- B: 低精蛋白锌胰岛素

C: 预混胰岛素

D: 甘精胰岛素

答案: D

65. 抗肿瘤药物中，影响核酸合成的药物是

A: 放线菌素

B: 依托泊苷

C: 顺铂

D: 甲氨蝶呤

答案: D

66. 吩噻嗪类抗精神病药中毒出现

A: 心血管毒性

B: 谵妄、躁狂、幻觉

C: 明显的锥体外系症状

D: 肌肉震颤、抽搐

答案: C

67. 肾功能不全患者宜选用的药物是

A: 经肝肾双途径消除的药物

B: 肾毒性小、经肝代谢的药物

C: 经肝肠循环消除的药物

D: 肝毒性小、经肾代谢的药物

答案: B

68. 下列药物中，可引起黑便的药物为（）

A: 复方氢氧化铝

B: 硫糖铝片

C: 铝碳酸镁

D: 枸橼酸铋钾

答案: D

69. 适宜于餐前给药的药物是

A: 二甲双胍

B: 复方铝酸铋

C: 法莫替丁

D: 缬沙坦

答案: B

70. 出血性脑血管病患者的卧床休息时间，脑出血

A: 4~5 周

B: 2~4 周

C: 2~3 周

D: 1~2 周

答案: B

71. 患者,男,57 岁,化验结果:TC4.6mmol/L(参考值

<5.2mmol/L),TG11.0mmol/L(参考值 0.56——1.70mmol/L)尿酸

508umol/L(参考值<420umol/L),应首选的调脂药物为()

A: 非诺贝特

B: 考来烯胺

C: 烟酸

D: 依折麦布

答案: A

72. 肝脏具有十分重要和复杂的生理功能。首先是人体内各种物质代谢和加工的中枢，其次是有生物转化和解毒功能，所有进入人体的药物或毒物，都会在肝脏发生氧化、还原、水解、结合等化学反应，最后以原形药或代谢物的形式排出体外。

- A: 急性胰腺炎
- B: 缺铁性贫血
- C: 糖尿病
- D: 肝硬化

答案：D

73. 患者，男，40 岁，体重 70kg，因咳痰伴发热入院，诊断为肺炎，欲给予左氧氟沙星片实施治疗。该药说明书提示：肌酐清除率低于 50ml / min 时需要调整给药方案。该患者入院时行肾功能检查：血肌酐 (Cr) 130 μ mol / L。医师给出的治疗方案是

- A: 延长给药间隔时间
- B: 经验剂量的 3 / 4
- C: 不需要调整给药方案
- D: 经验剂量的 1 / 2

答案：C

74. 进行药学信息的收集、保管、整理、评价、传递、提供和利用，是

- A: 参与健康教育
- B: 药物信息服务
- C: 处方审核
- D: 处方点评

答案：B

75. 患者，男，57 岁，查体：心率 54 次/分，既往患有痛风。近期体检发现高血压，未服药时血压维持在 150 / 95mmHg 左右，建议服药控压，适宜该患者的降压药是

- A: 美托洛尔
- B: 氢氯噻嗪
- C: 哌唑嗪
- D: 氯沙坦

答案：D

76. (2018 年真题) 在患者入院、转科和出院时，药师通过核对新开的医嘱和已有的医嘱，核对患者目前的整体用药情况，避免漏用药物、重复用药。剂量错误和不良药物相互作用等，以保证患者用药安全的药学服务过程，属于 ()

- A: 药物利用评价
- B: 药学干预
- C: 处方审核
- D: 药物重整

答案：D

77. 患者，女，24 岁，已婚，因痤疮购药咨询，应告知患者对育龄妇女有严重的致畸作用，药师不应推荐的治疗药物是

- A: 红霉素乳膏
- B: 异维 A 酸片
- C: 阿达帕林凝胶
- D: 过氧化苯甲酰凝胶

答案：B

78. 选择药物的首要标准是药物治疗的

- A: 安全性?
- B: 方便性?
- C: 有效性?
- D: 经济性?

答案: C

79. 以快速、准确地获得问题的答案是指

- A: 对问题进行确定并归类
- B: 形成答案并以口头形式提供给询问者
- C: 对文献进行评价、分析和整理
- D: 确立有效的检索方法、查阅文献

答案: D

80. 嗜酸性粒细胞正常参考区间是

- A: 0.01~0.05
- B: 0.03~0.08
- C: 0.20~0.40
- D: 0~0.01

答案: A

81. (2017 年真题) 处方外文缩写 OU 代表 ()

- A: 左眼
- B: 右耳
- C: 双眼
- D: 左耳

答案: C

82. 可促进去铁胺的螯合，用于慢性铁中毒的是

- A: 维生素 C
- B: 维生素 A
- C: 维生素 D
- D: 维生素 B1

答案：A

83. 提示首次取硝酸甘油片的患者"要随身携带、在心绞痛发作时含于舌下"，是针对

- A: 交代药品贮存条件与方法
- B: 交代用药注意事项
- C: 交代用药途径及用药方法
- D: 交代药物的用量

答案：C

84. (2016 年真题) 高血压伴痛风的患者慎用的药物是 ()。

- A: 氢氯噻嗪
- B: 普萘洛尔
- C: 硝苯地平
- D: 卡托普利

答案：A

85. 以下引起药源性疾病的影响因素中，主要是药物相互作用的是

- A: 服用阿司匹林引起哮喘、慢性荨麻疹
- B: 着色胶囊剂引起固定性药疹
- C: 同服氟西汀与华法林的患者呈现牙龈出血
- D: 二甘醇是"亮菌甲素"事件的祸首

答案：C

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/337100010046010024>