压疮的分类、测量、评估与记录

压疮的定义

- 皮肤或深部组织由于压力、或者压力混合剪切力及或摩擦力作用引起局部损伤
- 常发生在骨隆突处
- 很多与压疮有关的因素或混合因素的重要性依然有待说明

压疮评估的目的

- 获取伤口的基本资料
- 制定治疗和护理计划
- 评估治疗/护理的效果
- 促进沟通、促进连续护理
- 判断治疗费用和愈合时间

完整的伤口评估

- 全身一般状况的评估
- 全身系统性因素的评估
- 伤口局部性因素的评估
- 心理、社会环境的评估

完整的伤口评估

- 全身一般状况的评估:
- 性别、年龄、生命体征、发育体型
- 营养状态、意识状态、面容与表情
- 体位、步态

国际常用的伤口分类

- 按颜色（红、黄、黑）分类
- 按压疮分期分类
- 按组织受损程度分类：
- 分为部分皮层和全皮层伤口

压疮分期

- 第一期：**淤血红润期**
- 皮肤然完整，但出现不褪色的红色，通常发生在骨突处，该部分软组织在之前可能有疼痛、坚实、柔软、潮湿或与邻近组织相比较较热或冷
- 第一期损伤在深色皮肤的病人很难发现



压疮分期

- 第二期:**炎性浸润期**
- 表皮及部分真皮组织缺失
- 表现为无腐肉的红色或粉红色基底开放性浅层溃疡，也可表现为表皮完整或已破溃的含血清的水泡
- 有光泽或干涸的浅层溃疡，无腐肉或瘀伤
- 区别：皮肤撕裂、胶布撕伤、会阴皮炎区别





压疮分期

- 第三期:**浅度溃疡期**
- 全皮层缺失，可见皮下脂肪组织，但未达骨、肌腱或肌肉
- 可能有腐肉，但不遮蔽组织损伤的深度
- 也许存在潜行



压疮分期

- 第四期：**坏死溃疡期**
- 全皮层缺失，暴露肌腱、肌肉或骨头
- 常有潜行和窦道存在
- 深度因解剖部位不同而不同
- 愈合后的疤痕组织抗张力强度只有正常的40%



压疮分期?

- 无法界定：
- 全皮层缺失、但溃疡基底被黄色、棕褐色、灰色、绿色或棕色的腐肉掩盖及或有棕褐色、褐色或黑色的焦痂在溃疡的底部





以伤口基底颜色分类：红色伤口

- 炎症期、增生期或成熟期
- 暗红\浅红\深红

  提示：健康肉芽组织，牛肉红，闪亮，有坚实的圆卵石样的外观



以伤口基底颜色分类：黄色伤口

- 存在黄色腐肉和坏死的细菌
- 常以块状形式存在
- 最常在慢性伤口中看到黄色\白色外观、干的\湿的、纤维状无活性的组织



以伤口基底颜色分类：黑色伤口

- 伤口内有缺乏血流造成的坏死组织
- 伴有软或埂的结痂棕—灰—黑色
- 焦痂：黑色坏死组织、表面干燥、皮革样坚韧的结痂



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/338002017044006023