北京住院医师儿内科Ⅰ阶段《新生儿专业必看考点》新版

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：足月新生儿生后 2 天，因黄疸 1 天而入院，皮肤重度黄染，心肺腹脐无异常。母亲血型为”O”型，子为”A”型，血红蛋白 135g／L，网织红细胞 7.8%。该病发病机制可能为（　）。A.同族免疫性溶血

B.自身免疫性溶血

C.异常血红蛋白

D.红细胞膜缺陷

E.红细胞酶缺陷

2、单项选择题：新生儿生后 4 天开始气促、发绀、口吐泡沫，体温不升，呼吸快而不规则，肺部听诊未闻及啰音，母体分娩早期破水 24 小时，最可能是（　）。A.新生儿窒息

B.新生儿呼吸窘迫综合征

C.新生儿肺炎

D.新生儿湿肺

E.新生儿颅内出血

3、单项选择题：一个 Rh 溶血病患儿的血型是 O，CcDEe，其母为 A，ccdee，现需交换输血。下列血型的血选哪一种最理想 A.O，CcDEBA，ccdEeCO，CCDEED.O，ccdeeE.A，CcdEe20.-足月顺产儿，母乳喂养，生后 24 小时黄疸明显，血清胆红素 210μmol／L，母血型 O，Rh（+）。为明确诊断。下列检查哪项首选（　）。A.血培养

B.测 G6PD 活性

C.暂停母乳喂养

D.网织红细胞计数

E.血型及抗人球蛋白试验

4、单项选择题：新生儿衣原体感染首选药物为（　）。A.红霉素

B.庆大霉素

C.青霉素

D.头孢拉定

E.氨苄西林

5、单项选择题：新生儿患 Rh 溶血病，以下哪种情况不会出现（　）。A.母亲 RhD 阴性，胎儿 RhD 阳性

B.Rh 溶血病多发生于第 2 胎

C.Rh 溶血病多发生于未输过血母亲的首次妊娠中

D.Rh 溶血病症状随胎次增加而加重

E.母体产生抗 Rh-IgG 抗体进入胎儿母体内产生溶血

6、单项选择题：下列新生儿肝炎与先天性胆道闭锁鉴别中最有价值的是（　）。A.黄疸发展速度

B.大便颜色

C.小便颜色

D.动态观察胆红素

E.有无先天感染

7、单项选择题：患婴非特异性免疫功能低下的可能原因是（　）。A.皮肤表面脂肪少

B.黏膜较干燥

C.单核细胞杀菌功能低于成人

D.白介素 2 低下

E.γ-干扰素低下

8、单项选择题：小儿智能低下，胸骨左缘闻及 3～4 级收缩期杂音，最可能的诊断是（　）。A.21-三体综合征

B.苯丙酮尿症

C.先天性甲状腺功能减低症

D.先天性心脏病

E.急性风湿热

9、单项选择题：新生儿日龄 5 天，在家出生，近 1 天来拒奶、面灰、手足凉，黄疸迅速加重，白细胞 20×10／L，中性粒细胞 75%，淋巴细胞 25%，血总胆红素 257.8μmol／L。最可能的诊断是（　）。A.新生儿败血症

B.新生儿核黄疸

C.新生儿破伤风

D.胆红素脑病

E.新生儿硬肿症

10、单项选择题：关于病理性黄疸的临床特点，以下哪项不正确（　）。A.生后 24 小时内出现

B.无论早产儿还是足月儿，血清胆红素均>205～257μmol/L

C.足月儿黄疸持续 2 周不消退

D.早产儿持续 4 周不消退

E.黄疸退而复现

11、单项选择题：新生儿出血症经典型，发病时间为（　）。A.生后 24 小时内

B.生后 2～3 天

C.生后 7 天

D.生后 14 天

E.生后 1 个月

12、单项选择题：新生儿肠腔内 β-葡萄糖醛酸苷酶的主要作用是（　）。A.水解结合胆红素

B.水解葡萄糖醛酸

C.水解间接胆红素

D.促进合成结合胆红素

E.促进合成葡萄糖醛酸转移酶

13、单项选择题：一足月新生儿，静脉血细胞压积 75%。生后 12h 小儿嗜睡。引起本例嗜睡最不可能的因素是（　）。A.脑血栓形成

B.低血糖

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/338020131015006063