专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年安徽省固镇县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷200题题库及答案（各地真题）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.易被胃酸破坏，口服吸收少，故临床一般服用其肠衣片或酯化物的是

A：氨曲南

B：红霉素

C：阿奇霉素

D：克拉霉素

答案：B

2.治疗慢性心力衰竭，ACEI和其联合有协同作用的是()

A：β受体阻断药

B：留钾利尿药

C：噻嗪类利尿药

D：人促红素

答案：A

3.下列药物中属于抗纤维蛋白溶解药的是

A：酚磺乙胺

B：卡巴克络

C：氨甲环酸

D：维生素K1

答案：C

4.患者，女，49岁，间断上腹部饱胀、恶心1年。患者1年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药（具体不详）治疗后症状好转。2个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部B超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3次/日。

A: 不会促进乙酰胆碱的释放

B: 不会导致催乳素增多

C: 不会导致Q-T间期延长及室性心律失常

D: 不会导致锥体外系反应

答案：A

5.下列有关奎尼丁的叙述，不正确的是

A: 抑制Na+内流和K+外流

B: 可用于强心苷中毒

C: 可用于治疗心房扑动和心房颤动

D: 具有抗胆碱和仅受体阻断作用

答案：B

6.下列关于雌激素的描述，错误的是

A: 长期使用需监测血糖

B: 雌激素治疗可能增加乳腺癌的风险

C: 雌激素治疗前需评估患者发生血栓的风险

D: 雌激素治疗可能诱发阴道出血

答案：A

7.高血压伴精神抑郁者不宜选用

A: 硝苯地平

B：利血平

C：尼莫地平

D：普萘洛尔

答案：B

8.大剂量静脉给药时，可能出现可逆性黄疸的抗生素是()

A：利奈唑胺

B：小檗碱

C：夫西地酸

D：磷霉素

答案：C

9.与磺胺甲噁唑具有协同抑菌和杀菌作用的是()

A：诺氟沙星

B：甲氧苄啶

C：呋喃唑酮

D：磺胺嘧啶

答案：B

10.阻断M

A：氢氧化铝

B：哌仑西平

C：雷尼替丁

D：奥美拉唑

答案：B

11.（2016年真题）属于抗雄激素类，可用于晚期前列腺癌治疗的首选药品是

A: 氟他胺
B: 乙烯雌酚
C: 他莫昔芬
D: 托瑞米芬
答案：A

12.ACEI与其联用，除可增强降压效果外，还可减少后者引起的高肾素血症以及对血尿酸和血糖的不良影响的是()
A: β受体阻断药
B: 人促红素
C: 留钾利尿药
D: 噻嗪类利尿药
答案：D

13.干扰肿瘤细胞转录过程和阻止RNA合成的抗肿瘤药是
A: 紫杉醇
B: 氟胞嘧啶
C: 多柔比星
D: 博来霉素
答案：C

14.患者，男，5岁，体重25kg，有癫痫史、青霉素过敏史。因急性胆囊炎合并腹腔感染住院治疗。查体和实验室检查：白细胞计数15.8×109/L，体温39.5℃，肝、肾功能正常，医师处方美罗培南静脉滴注(说明书规定儿童剂量为一次20mg/kg)
A: 乙琥胺
B: 丙戊酸钠
C: 左乙拉西坦

D：地西泮

答案：B

15.可与硝酸酯类药物发生相互作用的是

A：伐地那非

B：坎利酮

C：呋塞米

D：丙酸睾酮

答案：A

16.服用地西泮后病情不会加重的是

A：COPD

B：高血压

C：抑郁症

D：重症肌无力

答案：B

17.左旋多巴除了用于抗震颤麻痹外，还可用于

A：乙型肝炎

B：脑膜炎后遗症

C：心血管疾病

D：肝性脑病

答案：D

18.属于α受体激动剂，缓解鼻黏膜充血肿胀的药物是

A：麻黄碱

B：过氧化氢

C：克罗米通

D: 酮替芬

答案：A

19.关于多柔比星治疗时使用右雷佐生的叙述，不正确的是

A: 使用右雷佐生的目的是保护心肌

B: 与多柔比星同时给药

C: 右雷佐生剂量应为多柔比星剂量的10倍

D: 右雷佐生水解后能与多柔比星螯合

答案：B

20.泛昔洛韦口服后代谢为

A: 喷昔洛韦

B: 更昔洛韦

C: 阿昔洛韦

D: 西多福韦

答案：A

21.考来替泊的降脂作用机制主要是

A: 增加脂蛋白酶活性

B: 抑制细胞对LDL的修饰

C: 阻滞胆汁酸在肠道的重吸收

D: 抑制脂肪分解

答案：C

22.服药后尿、唾液、汗液、痰液、泪液等排泄物均可显橘红色的药物是（）

A: 利福平

B: 乙胺丁醇

C: 吡嗪酰胺

D: 链霉素

答案：A

23.患者，女，66岁，5天前无明显诱因出现发热，最高39℃，伴寒战；无咳嗽、咳痰。于门诊阿莫西林抗感染治疗4日无改善，遂转入院治疗。入院查体：T38．8℃，R21次，BP110／70mmHg，HR110次／分。神清、精神差、颈软，咽不红、双扁桃体不大；双肺呼吸音清，无明显干湿啰音。查血常规白细胞13．4×109／L，中性粒细胞82．1%，胸片、肝肾功能未见明显异常。入院后给予亚胺培南西司他丁0．59，每6小时一次。

A: 需关注中枢神经系统不良反应

B: 询问过敏史，使用期间密切关注过敏反应

C: 有可能引起维生素D缺乏症状

D: 如需连续给药1周以上，应进行肝功能检查

答案：C

24.早产儿、新生儿禁用()

A: 利福平

B: 夫西地酸

C: 四环素可的松

D: 氯霉素

答案：D

25.下列描述正确的是()

A: 有刺激性的药物应从高浓度开始逐渐递减

B: 根据病变部位不同选择不同浓度和强度的药物

C: 外用药经皮吸收后不会产生不良反应

D: 手掌损害应选择低效的制剂

答案：B

26.在血液中几乎不与血浆蛋白结合的口服降糖药是

A: 罗格列酮

B: 达格列净

C: 吡格列酮

D: 二甲双胍

答案：D

27.以下关于过氧苯甲酰的描述中，不正确的是

A: 可杀灭痤疮丙酸杆菌

B: 为强还原剂，极易分解

C: 可分解出新生态氧而发挥作用

D: 可导致皮肤干燥，脱屑

答案：B

28.分子中含有强碱性基团，可与肝素分子中的硫酸根迅速结合，形成无活性的稳定复合物，使肝素失去抗凝活性的是

A: 酚磺乙胺

B: 鱼精蛋白

C: 氨甲环酸

D: 维生素K1

答案：B

29.属于第一代头孢菌素口服制剂的是()。

A: 头孢吡肟

B: 头孢拉定

C：头孢克肟

D：头孢克洛

答案：B

30.下列不属于强心苷类正性肌力药的是

A：洋地黄毒苷

B：地高辛

C：多巴胺

D：去乙酰毛花苷

答案：C

31.属于第三代头孢菌素的药物是()。

A：头孢氨苄

B：头孢吡肟

C：头孢哌酮

D：头孢拉定

答案：C

32.下列不属于中效能利尿药的是

A：氢氟噻嗪

B：吲哒帕胺

C：氢氯噻嗪

D：氨苯蝶啶

答案：D

33.可致前庭、耳蜗神经功能障碍，妊娠期妇女和新生儿禁用的抗菌药物是

A：林可霉素类

B: 四环素类

C: 酰胺醇类(氯霉素)

D: 氨基糖苷类

答案：D

34.易发生持续性干咳不良反应的药品是()。

A: 硝苯地平

B: 氢氯噻嗪

C: 硝酸甘油

D: 福辛普利

答案：D

35.氨基苷类抗生素的抗菌机制是

A: 抑制细菌细胞壁的合成

B: 影响叶酸代谢

C: 抑制蛋白质合成的全过程

D: 影响胞浆膜的通透性

答案：C

36.主要用于解热镇痛，但几乎没有抗炎作用的药物是

A: 对乙酰氨基酚

B: 塞来昔布

C: 吲哚美辛

D: 阿司匹林

答案：A

37.2~3分钟起效，5分钟达最大效应的硝酸酯类药物是

A: 哌唑嗪

B: 普萘洛尔

C: 硝酸甘油

D: 硝苯地平

答案：C

38.作用机制是表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂的是

A: 吉非替尼

B: 紫杉醇

C: 枸橼酸他莫昔芬

D: 巯嘌呤

答案：A

39.支原体、衣原体引起的肺炎宜选用()

A: 克林霉素

B: 万古霉素

C: 阿奇霉素

D: 氟康唑

答案：C

40.（2020年真题）属于第一代抗精神病药物的是

A: 氯氮平

B: 利培酮

C: 奥氮平

D: 氯丙嗪

答案：D

41.以下所列药物中，能促进小肠对维生素D的吸收是

A: 雌激素

B：考来烯胺

C：硫糖铝

D：矿物油

答案：A

42.通过将身体的水分吸到肠道或防止大便巾的水分被吸收来增加肠道中的水分来发挥致泻作用的是

A：聚乙二醇4000

B：甘油

C：乳果糖

D：酚酞

答案：C

43.外用糖皮质激素作用强度的比较，正确的是()。

A：卤米松>氟轻松>地塞米松

B：地塞米松>卤米松>氯轻松

C：地塞米松>氟轻松>卤米松

D：卤米松>地塞米松>氟轻松

答案：A

44.（2017年真题）为避免引起大面积中毒性表皮坏死松解症,服用前提倡做人体白细胞抗原等位基因检测的抗癫痫药是（）

A：丙戊酸钠

B：卡马西平

C：氟硝西泮

D：托吡酯

答案：B

45.服用伊马替尼的时间是

A：餐前1小时

B：进餐时

C：睡前

D：餐后2小时

答案：B

46.氟西汀的作用机制是

A：抑制5-HT及去甲肾上腺素的再摄取

B：选择性抑制5-HT的再摄取，增加突触间隙5-HT浓度

C：抑制突触前膜对去甲肾上腺素的再摄取

D：抑制A型单胺氧化酶，减少去甲肾上腺素、5-HT及多巴胺的降解

答案：B

47.可用于治疗绦虫感染的药物是

A：氯硝柳胺

B：林旦

C：联嗪

D：甲硝唑

答案：A

48.属于磷酸二酯酶抑制剂的平喘药是

A：布地奈德

B：多索茶碱

C：沙美特罗

D：孟鲁司特

答案：B

49.抑制DNA多聚酶

A：甲氨蝶呤

B：羟基脲

C：阿糖胞苷

D：氟尿嘧啶

答案：C

50.不属于维生素B2缺乏临床表现的是

A：脚气病

B：阴道炎

C：白内障形成

D：口角炎

答案：A

51.伴随剂量增大，阿托品出现的症状以下排序正确的是

A：显著口干、心率减慢、心率加快、肠蠕动减少

B：心率减慢、心率加快、显著口干、肠蠕动减少

C：心率加快、心率减慢、显著口干、肠蠕动减少

D：瞳孔扩大、心率加快、胃液分泌抑制、胃肠道平滑肌兴奋性降低

答案：B

52.患者，男，35岁，农民。感觉头昏乏力入院。查体：粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白60g/L，诊断为钩虫感染、缺铁性贫血。

A：驱钩虫+亚叶酸钙

B：驱钩虫+注射右旋糖酐铁

C：输血+注射右旋糖酐铁

D：驱钩虫+口服铁剂

答案：D

53.男性，70岁，进食后饱胀不适伴反酸5年余，黑便1天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡（A1期）伴出血。

A: 胶体果胶铋胶囊

B: 埃索美拉唑

C: 阿莫西林

D: 克拉霉素

答案：A

54.患者，男，56岁，诊断为肝性脑病Ⅳ级，建议给予该患者使用的氨基酸是

A: 支链氨基酸

B: 芳香族氨基酸

C: 杂环氨基酸

D: 脂肪族氨基酸

答案：A

55.属于延长动作电位时程的抗心律失常药是()。

A: 利多卡因

B: 美托洛尔

C: 硝酸甘油

D: 索他洛尔

答案：D

56.伊曲康唑属于()

A: 多烯类抗真菌药

B: 唑类抗真菌药

C: 棘白菌素类抗真菌药

D: 丙烯胺类抗真菌药

答案：B

57.胰岛素对代谢的作用叙述错误的是

A: 促进糖原合成

B: 抑制糖原分解

C: 抑制脂肪的合成

D: 减少酮体生成

答案：C

58.酒精、镇静剂、镇痛药、阿片类或神经类药物急性中毒患者禁用()。

A: 曲马多

B: 哌替啶

C: 芬太尼

D: 吗啡

答案：A

59.蒙脱石散是

A: 吸附剂

B: 抗分泌药

C: 微生态制剂

D: 抗动力药

答案：A

60.（2016年真题）外用糖皮质激素作用强度的比较，正确的是

A: 卤米松>地塞米松>氟轻松

B: 地塞米松>卤米松>氯轻松

C：地塞米松>氟轻松>卤米松

D：卤米松>氟轻松>地塞米松

答案：D

61.以下关于奥利司他使用的叙述，错误的是

A：药效在给药后24～48小时即可显现，停止治疗后48～72小时恢复

B：应在餐时或餐后1小时内服用，如有一餐未进或食物中不合脂肪，可省略一次服药

C：体重指数为23的人可使用

D：脂溶性维生素应在服用本品2小时后或在睡前服用

答案：C

62.广谱调血脂药物是

A：氯贝丁酯

B：烟酸

C：考来烯胺

D：吉非罗齐

答案：B

63.（2019年真题）患者，男，34岁，晨起出现上腹部剧烈疼痛，考虑为胃肠道平滑肌痉挛，适宜该患者使用的治疗药物是（）

A：溴吡斯的明

B：多潘立酮

C：酚妥拉明

D：山莨菪碱

答案：D

64.可引起胃肠道出血的是()

A: 氨苯蝶啶

B: 螺内酯

C: 氢氯噻嗪

D: 呋塞米

答案：D

65.可用于肝硬化腹水以及加速某些毒物排泄的药物是

A: 托拉塞米

B: 氨苯蝶啶

C: 氢氯噻嗪

D: 乙酰唑胺

答案：A

66.戈那瑞林的禁忌不包括

A: 妊娠期妇女

B: 垂体相关性闭经者

C: 肝肾病患者

D: 垂体腺瘤患者

答案：C

67.利尿作用最强，特别当急、慢性肾衰竭(肌酐清除率<30ml/min)时可作为首选治疗的利尿药为()

A: 留钾利尿药

B: 袢利尿药

C: 噻嗪类利尿药

D: 碳酸酐酶抑制剂

答案：B

68.可增强吗啡对平滑肌的松弛作用的药物是

A：纳洛酮

B：苯甲酸钠咖啡因

C：氟马西尼

D：阿托品

答案：D

69.关于胶体果胶铋用药教育的说法,错误的是()

A：妊娠期妇女禁用胶体果胶铋

B：胶体果胶铋使用后大便可能会变黑

C：胶体果胶铋宜与牛奶同时服用

D：胶体果胶铋使用后口中可能有氨味

答案：C

70.患者，女，60岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊，塞来昔布胶囊，碳酸氢钠治疗。

A：促进血栓形成

B：胃肠道反应

C：肾结石

D：尿道刺激

答案：D

71.用于预防绝经期妇女骨质疏松的治疗药()

A：米非司酮

B：地塞米松

C：雷洛昔分

D：黄体酮

答案：C

72.属于丙烯胺类的是

A：制霉菌素

B：氟胞嘧啶

C：卡泊芬净

D：特比萘芬

答案：D

73.可抑制花生四烯酸转化为白三烯()

A：过氧苯甲酰

B：阿达帕林

C：维A酸

D：异维A酸

答案：B

74.硫脲类药物的基本作用是

A：抑制碘泵

B：抑制甲状腺过氧化酶

C：抑制Na+-K+泵

D：抑制甲状腺蛋白水解酶

答案：B

75.具有抗炎作用,可用于各型肝炎治疗的药物是()

A：异甘草酸镁

B：双环醇

C：门冬氨酸钾镁

D：多烯磷脂酰距

答案：A

76.抗瘤谱较广，对恶性淋巴瘤效果显著，还能用于治疗自身免疫性疾病的药物是

A：博来霉素

B：多柔比星

C：环磷酰胺

D：长春新碱

答案：C

77.将乙胺丁醇与链霉素合用治疗结核病的目的是

A：阻止或延迟结核杆菌对链霉素产生耐药性

B：延长链霉素作用时间

C：延迟肾脏排泄链霉素

D：有利于药物进入结核感染病灶

答案：A

78.（2021年真题）可致超敏反应综合征（AHS），推荐用药前做HLA-B*5801基因筛查的抗痛风药物是（）

A：非布司他

B：秋水仙碱

C：苯溴马隆

D：别嘌醇

答案：D

79.左甲状腺素成人维持量是

A：125ug

B：25-75ug

C: 75-125ug

D: 55-75ug

答案：C

80.抗菌谱较窄，对放疗有增敏作用

A: 放线菌素D

B: 环磷酰胺

C: 丝裂霉素

D: 阿霉素

答案：A

81.下列说法中错误的是

A: ER阳性者，绝经前、后均可使用他莫昔芬

B: 他莫昔芬是目前临床上最常用的乳腺癌内分泌治疗药

C: 芳香氨酶抑制剂可用于绝经前乳腺癌患者

D: 芳香氨酶抑制剂主要包括来曲唑和阿那曲唑

答案：C

82.可引起血压下降、缩瞳、欣快感的受体是

A: μ2受体

B: μ1受体

C: K受体

D: δ 受体

答案：D

83.最常见不良反应为干咳，严重不良反应为血管神经性水肿的是

A: 氨氯地平

B: 卡托普利

C：地高辛

D：哌唑嗪

答案：B

84.患者，男，5岁，体重25kg，有癫痫史、青霉素过敏史。因急性胆囊炎合并腹腔感染住院治疗，体征和实验室检查，白细胞计数15.8×109/L，体温39.5℃，肝、肾功能正常，医师处方美罗培南静脉滴注(说明书规定儿童剂量为一次20mg/kg)。

A：丙戊酸钠

B：地西泮

C：乙琥胺

D：左乙拉西坦

答案：A

85.呋塞米的适应证不包括

A：高钠血症

B：高钾血症

C：充血性心力衰竭

D：高血压危象

答案：A

86.既能增加糖分解和减少糖生成，又能改善对胰岛素的敏感性的药物是

A：二甲双胍

B：氢氧化镁

C：胰岛素

D：罗格列酮

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/338023067046007022