北京住院医师儿外科Ⅰ阶段《小儿骨科考试试题》模拟练习卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：40 岁男性患者，腰腿痛反复发作伴跛行 4 月余。体查：腰椎左侧弯，右侧椎旁压痛，右直腿抬高试验 40°（+），加强试验（+），趾背伸力减弱，间隙水平 CT 扫描发现椎管右前方有一部分钙化阴影，左侧神经根浸没，首选诊断（　）。A.椎管狭窄症

B.腰椎间盘突出症

C.退行性腰椎病

D.腰椎结核

E.椎管内肿瘤

2、单项选择题：手指主动活动障碍，被动活动正常，最常见的原因是（　）。A.指间关节及掌指关节损伤

B.屈指肌腱断裂粘连

C.前臂肌肉缺血挛缩

D.上肢主要神经断裂

E.皮肤损伤瘢痕粘连

3、单项选择题：患儿，出生后 3 周发现左颈部肿块，质硬，头偏向左侧，下颌及面部转向右侧，肿块有一定活动度，无触痛。应采取的治疗方法为（　）。A.按摩，被动矫正

B.抗生素治疗

C.肿瘤切除术

D.颈椎牵引

E.观察病情变化

4、单项选择题：诊断成人脊柱结核最可靠的依据是（　）。A.有低热、盗汗史

B.血沉快

C.结核菌素试验（+）

D.X 线片示椎间隙狭窄，相邻椎体边缘模糊

E.全身虚弱、贫血

5、单项选择题：女性，生后 14 天发现右颈部包块，较硬，头向右偏，下颌转向左侧。6 个月后颈部包块消失，面部不对称。若手术治疗，何时手术最佳（　）。A.3 岁

B.1 岁

C.6 个月

D.6 岁

E.8岁

6、单项选择题：路遇一车祸病人，见右小腿中段开放性骨折，伤口流血，肢体畸形。应该如何处理为好（　）。A.积极联系救护车运送

B.寻找木板、树枝将肢体妥善固定

C.用清洁手帕包扎伤口，用围巾、外衣等将肢体与健肢一起绑扎，急送医院

D.告知医院地址，以便伤员能尽快送来诊治

E.围观，不知所措，束手无策

7、单项选择题：处理开放性骨折的最关键性步骤为（　）。A.应用抗生素

B.彻底清创

C.修复软组织缺损

D.及早闭合伤口

E.固定骨折

8、单项选择题：发生筋膜间隙综合征的主要原因是（　）。A.主要神经损伤

B.肌肉痉挛

C.筋膜间隙内高压

D.病变以下血供受阻

E.静脉血栓

9、单项选择题：有关骨肉瘤的临床特点，下列哪项是正确的（　）。A.骨肉瘤好发于四肢骨骺生长最快的股骨远端.胫骨近端和肱骨近端

B.骨肉瘤绝大部分为多发

C.一旦病理学检查确诊为骨肉瘤，应该马上行截肢手术

D.骨肉瘤也较多发于脊柱、骨盆

E.全部病人80%～90%病变发生于膝关节周围

10、单项选择题：下述骨折均是稳定性骨折，除外（　）。A.嵌插骨折

B.青枝骨折

C.横骨折

D.裂缝骨折

E.斜骨折

11、单项选择题：6岁以上儿童先天性髋关节脱位的手术方法，不宜采用（　）。A.股骨短缩截骨术

B.髋臼成形术

C.股骨旋转截骨术

D.骨盆内移截骨术

E.Salter骨盆旋转截骨术

12、单项选择题：急性骨髓炎在骨膜下或骨髓内抽得脓液后，最关键的治疗措施是（　）。A.多次抽脓并注入抗生素

B.进行脓液细菌培养及药敏试验，根据结果调整用药

C.联合使用大量抗生素

D.局部引流

E.局部固定防止病理性骨折

13、单项选择题：人工全髋关节的髋臼常用下列哪种材料做成（　）。A.聚甲基丙烯酸甲酯

B.超高分子高密度聚乙烯

C.过氧化二甲酰

D.甲基丙烯酸甲酯一苯乙烯共聚物

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/338045016015006063