

药理医学单招实验试题

1.丁卡因不能用于（）

A.浸润麻醉(正确答案)

B.表面麻醉

C.传导麻醉

D.腰麻

E.硬膜外麻醉

2.普鲁卡因不能用于（）

A.浸润麻醉

B.表面麻醉(正确答案)

C.传导麻醉

D.腰麻

E.硬膜外麻醉

3.普鲁卡因不宜用于表面麻醉的原因（）

A.毒性大

B.刺激性大

C.粘膜穿透力强

D.扩散力强

E.粘膜穿透力弱(正确答案)

4.丁卡因常用于表面麻醉是因为（）

A.毒性较大

B.作用持久

C.粘膜穿透力强(正确答案)

D.比较安全

E.局麻效力强

5.普鲁卡因产生局麻作用的机制是 ()

A.阻断钠内流(正确答案)

B.阻滞氯内流

C.阻滞钙内流

D.阻滞钾内流

E.阻滞钾外流

6.易出现过敏反应的局麻药是 ()

A.丁卡因

B.普鲁卡因(正确答案)

C.布比卡因

D.利多卡因

E.三甲卡因

7.丁卡因毒性比普鲁卡因大 ()

A.20

B.10 倍(正确答案)

C.5 倍

D.30 倍

E.40 倍

8.口腔溃疡患者采用下列哪种局麻药作为首选 ()

A.丁卡因(正确答案)

B.普鲁卡因

C.布比卡因

D.利多卡因

E.三甲卡因

9.扁桃体摘除手术不能使用的局麻药是 ()

A.丁卡因

B.普鲁卡因

C.布比卡因

D.利多卡因

E.硫喷妥钠(正确答案)

10.毛果芸香碱的缩瞳作用是因为 ()

A.抑制胆碱酯酶

B.阻断 α 受体

C.激动M受体(正确答案)

D.激动 β 受体

E.阻断M受体

11.可用于抢救有机磷农药中毒的药物是 ()

A.肾上腺素

B.氯解磷定(正确答案)

C.多巴胺

D.呋塞米

E.洛贝林

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/338121007043006043>