2024辽宁省南芬区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背200题题库大全（黄金题型）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.（2021年真题）影响药物治疗有效性的因素不包括（）

A：给药途径

B：药物相互作用

C：患者的病生理状态

D：药品价格

答案：D

2.与西咪替丁、喹诺酮类及大环内酯类药物合用，应减少其用量的药品是

A：异丙托溴铵

B：孟鲁司特

C：氨茶碱

D：噻托溴铵

答案：C

3.有关"书写处方药品剂量与数量"的叙述中，最正确的是

A：以罗马数字书写药品用量

B：以阿拉伯数字书写

C：按照药品说明书

D：不能超过药品说明书中的用量

答案：B

4.(用药与尿液检查异常)氨苄西林可能引起

A: 尿血红蛋白

B: 尿酮体

C: 尿沉渣结晶

D: 尿肌酐

答案：C

5.应提示患者，该药品内附药片，须先溶解再滴眼

A: 胰岛素笔

B: 复方甲硝唑栓

C: 利福平滴眼剂

D: 噻托溴铵粉吸入剂

答案：C

6.吗啡的禁用范围是

A: 1岁以下婴儿

B: 3岁以下幼儿

C: 婴幼儿

D: 新生儿

答案：A

7.丝裂霉素的主要毒副作用是（）

A: 肺纤维化

B: 溶血性尿毒症

C: 心脏毒性

D: 出血性膀胱炎

答案：B

8.宜溶解于温开水中后服用

A：粉剂

B：泡腾片

C：糖浆剂

D：胶囊剂

答案：B

9.判断尿路感染是复发还是再感染，多以在停药后几周再发为依据

A：3周

B：5周

C：4周

D：6周

答案：D

10.患者，女，26岁，临床诊断为“甲状腺功能亢进症”，给予丙硫氧嘧啶450mg/d治疗，应嘱咐患者定期复查以下哪项指标

A：红细胞

B：白细胞

C：嗜酸粒细胞

D：血红蛋白

答案：B

11.（2016年真题）患者，男，身高180cm，体重90kg，腰围100cm，其体重指数（BMI）是（）。

A：30.2

B：20

C：27.8

D: 18

答案：C

12.下列药物中，适宜在餐前服用的是

A: 莫沙必利片

B: 西咪替丁片

C: 伊马替尼片

D: 双氯芬酸钠片

答案：A

13.患者，女，64岁，患2型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片0.5gtidpo，瑞格列奈片1mgtidpo，阿托伐他汀钙片20mgqdpo等药物治疗。

A: 根据血糖水平调整低精蛋白锌胰岛素用量

B: 每3～5天调整1次

C: 开启使用中的低精蛋白锌胰岛素必须放入冷藏保存

D: 每次调整1～4单位

答案：C

14.主要经肾脏排泄的药物或活性代谢产物易在体内蓄积，是由于

A: 肾功能随年龄增长而减退

B: 脂肪组织随年龄增长而增加，血浆白蛋白浓度降低

C: 肝药酶活性的个体化差异影响大于年龄的增长

D: 胆汁分泌缺乏

答案：A

15.异丙嗪属于

A: 抗组胺药

B: 血管扩张药

C: 镇痛药

D: 利尿剂

答案：A

16.填写具体；如患卵巢囊肿合并肺部感染注射头孢曲松引起不良反应，应填写肺部感染

A: 不良反应/事件的结果

B: 用药原因

C: 用药起止时间

D: ADR/ADE过程描述

答案：B

17.需要长期使用肾上腺皮质激素的小儿应避免选用()。

A: 泼尼松

B: 地塞米松

C: 甲泼尼松

D: 可的松

答案：B

18.患者在使用丙戚酸钠时应监测血药浓度,适宜的血药浓度范围是（）

A: 4~12ug/ml

B: 50~150ug/ml

C: 10~20ug/ml

D: 10~40ug/ml

答案：B

19.属于A型单胺氧化酶抑制剂的是

A：吗氯贝胺

B：文拉法辛

C：阿米替林

D：氟西汀

答案：A

20.药品不良反应按照程度分为轻度、中度、重度三级。

A：指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无需治疗

B：没有临床症状，无需治疗

C：指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害

D：指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害

答案：C

21.患者，女，28岁，近一个月出现阴道分泌物增多，痛痒明显，阴道检查时发现粘稠的奶酪样分泌物，经验治疗首选的药物是()

A：甲硝唑

B：咪康唑

C：青霉素钠

D：头孢曲松钠

答案：B

22.（2021年真题）静脉滴速过快，易致红人综合征的药物是（）

A：美罗培南

B：克拉霉素

C：头孢哌酮

D：万古霉素

答案：D

23.属于中效的胰岛素制剂是

A: 精蛋白锌胰岛素

B: 低精蛋白锌胰岛素

C: 甘精胰岛素

D: 赖脯胰岛素

答案：B

24.患者,女67岁出现认知功能障碍5年,诊断为阿尔茨海默病,予以美金刚治疗。下列药物中,可增加美金刚血药浓度的是（）

A: CYP3A4制剂

B: 碳酸氢钠

C: CYP2D6抑制剂

D: 氯化铵

答案：B

25.适用于伴发膀胱过度活动症的良性前列腺增生症的是（）

A: 奥昔布宁

B: 特拉唑嗪

C: 米多君

D: 非那雄胺

答案：A

26.以下对"发热的指标"的叙述中，不正确的是

A: 腋下温度超过36.6℃

B: 直肠温度超过37.6℃

C: 腋下温度超过37.0℃

D: 口腔温度超过37.3℃

答案：A

27.炎症性痤疮的首选外用抗菌药物是

A：夫西地酸乳膏

B：过氧化苯甲酰凝胶

C：水杨酸软膏

D：维A酸凝胶

答案：B

28.患者，女，72岁，近一个月出现入睡困难，多梦易醒，尝试非药物治疗效果不明显，推荐的药物治疗方案是

A：苯巴比妥100mgpoqn

B：地西泮5mgpoqn

C：氯硝西泮2mgpoqn

D：扎来普隆5mgpoqn

答案：D

29.可能增加严重心血管疾病风险，减肥治疗的风险大于获益，已于2010年10月在我国停止生产、销售和使用的减重药是

A：安非拉酮

B：芬特明

C：奥利司他

D：西布曲明

答案：D

30.下列药物中服用后可在乳汁中分泌较多的是

A：地西泮

B：青霉素G

C: 头孢呋辛

D: 华法林

答案：A

31.下列哪个不是慢性咽炎的临床表现

A: 有刺激性咳嗽

B: 咽喉部不适、干燥、发痒、疼痛或有异物感

C: 清晨起床后常会吐出微量的稀痰，伴有声嘶

D: 常伴有发热

答案：D

32.患者，女，42岁。临床诊断“小三阳”，其临床意义是

A: HBeAg阳性

B: HBsAg、HBeAb和HBcAb同为阳性

C: HBsAg、HBeAg和HBcAb同为阳性

D: HBsAg阳性

答案：B

33.癫痫持续状态的好发年龄段为（）

A: 65岁以上

B: 1岁以内及65岁以上

C: 55岁以上

D: 6岁以内

答案：B

34.属于5α还原酶抑制剂的是（）

A: 度他雄胺

B: 普适泰

C: 雌三醇

D: 氟他胺

答案：A

35.患者，男，35岁，患有先天性双侧肾动脉狭窄。近期血压一直在150/110mmHg左右，药师建议服药控制，该患者禁用的药物是

A: 洛伐他汀

B: 氢氯噻嗪

C: 卡托普利

D: 普萘洛尔

答案：C

36.患者，男，30岁，因反复发作呼吸困难，咳嗽、胸闷入院。每年春季发作，持续3年，查体：双肺满布哮鸣音，HR807欠/分，律齐，无杂音。

A: 慢性支气管炎

B: 慢性支气管炎合并肺气肿

C: 支气管哮喘

D: 阻塞性肺气肿

答案：C

37.用于缓解胆石症患者疼痛症状的药物是

A: 脂肪乳

B: 头孢曲松与甲硝唑联用

C: 复方阿嗪米特

D: 匹维溴铵

答案：D

38.属于高选择性 α4β2尼古丁-乙酰胆碱受体部分激动/部分拮抗药，可帮助吸烟者缓解戒断症状，减少对吸烟的渴求和满足感，但存在癫痫发作罕见不良反应的戒烟药物是

A: 可乐定

B: 安非他酮

C: 尼古丁替代药物

D: 伐尼克兰

答案：D

39.（2018年真题）患者，女，42岁，因成骨肉瘤使用环磷酰胺甲氨蝶呤联合化疗，用药过程中，者出现出血性膀胱炎。适宜的处理措施是（）

A: 给予糖皮质激素冲击治疗

B: 停药，给予亚叶酸钙治疗

C: 停药，给予糖皮质激素

D: 停药，水化，给予美司钠治疗

答案：D

40.患者术后，给予肠外营养液10%GS500ml、50%GS250ml、20%脂肪乳250ml、8．5%复方氨基酸750ml、水溶性维生素10ml、脂溶性维生素10ml、微量元素10ml、10%氯化钠注射液40ml、10%氯化钾注射液30ml

A: 200kcal

B: 450kcal

C: 700kcal

D: 1150kcal

答案：C

41.肝功能不全者服用由肝脏清除，但并无明显毒性反应的药物时
A：须谨慎使用，必要时减量给药
B：必须减量应用
C：避免使用
D：一般无需调整剂量
答案：A

42.（2018年真题）过敏性结膜炎和春季卡他性结膜炎可选用（）
A：色甘酸钠滴眼液
B：玻璃酸钠滴眼液
C：氧氟沙星滴眼液
D：七叶洋地黄双苷滴眼液
答案：A

43.正常剂量氯化钾的妊娠毒性分级是()
A：C级
B：X级
C：A级
D：B级
答案：C

44.下列“给药时间是依据生物钟规律而设定”的事例中，最正确的是
A：清晨服用帕罗西汀
B：清晨服用硫酸镁
C：餐前服用格列本脲
D：餐前服用阿莫西林
答案：A

45.是归纳、综合、整理后的出版物，使用最为广泛

A：网站信息

B：二级信息源资料

C：三级信息源资料

D：期刊论文

答案：C

46.为血液中的主要吞噬细胞，在白细胞中所占比例最高，且在急性感染中起重要作用的细胞为

A：嗜酸性粒细胞

B：中性粒细胞

C：淋巴细胞

D：嗜碱性粒细胞

答案：B

47.分为儿童卷、化学药品与生物制品卷的是

A：《英国国家处方集》

B：《医师案头参考》

C：《国家基本药物处方集（2012年版）》

D：《中国国家处方集（2010年版）》

答案：D

48.融合抑制剂（）

A：FIs

B：NRTIs

C：PIs

D：NNRTIs

答案：A

49.在治疗蛔虫病的药物中，可能引起"蛔虫游走而口吐蛔虫"的是

A: 甲苯咪唑

B: 枸橼酸哌嗪

C: 三苯双脒

D: 噻嘧啶

答案：A

50.患者，男，68岁，既往体健，因“受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热2天”入院。查体：体温39．1℃，血压138／80mmHg，心率102次／分，呼吸32次／分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果：白细胞计数11．2×109／L，中性粒细胞百分比85％。胸部x线：左肺下叶渗出性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

A: 阿莫西林一克拉维酸钾+阿奇霉素

B: 多西环素

C: 阿奇霉素

D: 左氧氟沙星+阿奇霉素

答案：A

51.老年人退热服用贝诺酯，1日3次；1日用量不得超过

A: 2.5g

B: 1.5g

C: 2.0g

D: 3.0g

答案：A

52.针对单纯性酒精中毒严重患者，下列救治措施，错误的是

A: 适当补充维生素C

B: 静脉注射5%葡萄糖注射液100ml和胰岛素20U

C: 静脉注射纳洛酮0.4mg

D: 肌内注射维生素B1.维生素B6和烟酸各100mg

答案：B

53.运动员禁用药物中，利尿剂产生的危害是

A: 诱发高血压、冠心病、心肌梗死、脑动脉硬化和脑血管破裂，以及引起肝癌、肾癌等疾患

B: 长期使用后突然停药，则会引发心跳过速、心肌梗死，乃至突然死亡

C: 能使伤口进一步恶化、导致呼吸困难和药物依赖

D: 易造成人体严重脱水、肾衰竭

答案：D

54.可引起尿胆红素阳性的是

A: 再生障碍性贫血

B: 肺结核

C: 肾小球肾炎

D: 病毒性肝炎

答案：D

55.哺乳期妇女应用下列药物会对乳婴产生何种不良影响,氯喹

A: 可能引起乳婴视神经损害、智力障碍

B: 导致新生儿血钙过高

C: 可能致胎儿畸形

D: 可引起过期妊娠、产程过长和产后出血

答案：A

56.(血常规检查异常的病症)骨髓增生病

A: 红细胞沉降率减慢

B: 淋巴细胞增多

C: 血小板增多

D: 白细胞增多

答案：C

57.以下属于急性肾盂肾炎的表现的是

A: 老年人表现不典型，可仅表现为纳差、淡漠、谵妄等

B: 尿液常浑浊，有异味

C: 可出现排尿不适、下腹痛和排尿困难

D: 约30%可出现血尿

答案：A

58.头孢曲松

A: 与呋塞米合用可加重肾功能损害

B: 与多种药物存在配伍禁忌，一般应单独给药

C: 与丙戊酸钠合用可导致血药浓度过低而引发癫痫

D: 与氯霉素合用因竞争药物的结合位点而产生拮抗作用

答案：B

59.以下所列药物中，适宜用于儿童患者的是()。

A: 氟喹诺酮类

B: 氨基糖苷类

C: 万古霉素

D: 青霉素

答案：D

60.可显著升高HDL-ch的是

A：依折麦布

B：依曲康唑

C：他汀类与烟酸联用

D：螺内酯

答案：C

61.（2015年真题）用于紧急避孕药的药物是（）。

A：罗格列酮

B：黄体酮

C：左炔诺孕酮

D：甲睾酮

答案：C

62.肠外营养1g氮能提供的热量是

A：7kcal

B：3kcal

C：9kcal

D：4kcal

答案：D

63.不宜直接给患者服用，应溶解在水中服用，以免呛入气管

A：胶囊剂

B：糖浆剂

C：泡腾片

D：粉剂

答案：D

64.急性缺血性脑卒中溶栓治疗的时间窗为（）

A：0.5h

B：2h

C：1h

D：3h

答案：D

65.流行性结膜炎者宜选用的滴眼液是

A：维生素B2

B：色甘酸钠

C：磺胺醋酰钠

D：碘苷

答案：D

66.从事药学服务的药师必须具备的专业技能是

A：药物警戒技能

B：沟通技能

C：调剂技能

D：药历书写技能

答案：C

67.患者,男,40岁,因感冒所致鼻塞到药店购药,药师应推荐的药品是()

A：氯苯那敏片

B：酚麻美敏片

C：对乙酰氨基酚片

D：萘甲唑啉滴鼻液

答案：D

68.肠外营养液中1g氮能提供的热量是

A：7kcal

B：3kcal

C：4kcal

D：9kcal

答案：C

69.便秘可选用的非处方药是

A：莫沙必利

B：酚酞

C：盐酸小檗碱

D：乳果糖

答案：D

70.适合睡前服用的是

A：氟伐他汀

B：奥利司他

C：吲哚美辛

D：多潘立酮

答案：A

71.竞争自肾小管排泄、延长半衰期的是

A：西咪替丁+格列本脲

B：多潘立酮+维生素C

C：四环素+硫酸亚铁

D：青霉素+丙磺舒

答案：D

72.下列白细胞计数中，成人静脉血的正常参考值为

A：（4.3～10.0）×109/L

B：（15.0～20.0）×109/L

C：（4.0～10.0）×109/L

D：（3.5～10.0）×109/L

答案：D

73.1级高血压标准是

A：收缩压≥180mmHg和(或)舒张压≥110mmHg

B：收缩压160～179mmHg和(或)舒张压100～109mmHg

C：收缩压140～159mmHg和(或)舒张压90～99mmHg

D：收缩压120～139mmHg和(或)舒张压80～89mmHg

答案：C

74.妊娠期女性患泌尿系统感染，需给予氨苄西林治疗，给药剂量需要适当增加，主要原因是

A：吸收降低

B：代谢更快

C：排泄更快

D：分布更广

答案：C

75.患者，女，85岁，既往有高血压病史，慢性心力衰竭，给予地高辛每日维持量治疗，近Et频发室性心动过速，检测血钾值在正常范围。如果患者出现严重的室性心动过速、室颤，需采用

A：电复律

B：苯海拉明

C：阿托品

D: 胺碘酮

答案：D

76.抑制磷酸二酯酶，增加细胞内cAMP含量，缓解慢性心衰症状的是

A: 硝普钠

B: 地高辛

C: 多巴酚丁胺

D: 氨力农

答案：D

77.依据生物钟规律，适宜睡前服用的药品是

A: 氟伏沙明

B: 奥利司他

C: 苯海拉明

D: 沙丁胺醇

答案：D

78.患者,女,59岁,绝经后3年,近日出现腰背疼痛,负重时疼痛加剧骨密度T值为-3.5,诊断为骨质疏松每天补充维生素D800IU元素钙500mg同时给予唑来膦酸治疗。唑来膦酸正确的给药方案是()

A: 4mg静脉滴注,每日一次

B: 5mg静脉滴注,每年一次

C: 5mg静脉滴注,每周一次

D: 10mg口服每日一次

答案：B

79.归属专业学术机构网站的是

A: www.ashp.org

B: www.merck.com

C: www.googl

D: www.cmt.com.cn

答案：A

80.患者，男，58岁，患2型糖尿病、高脂血症，给予二甲双胍肠溶片0.5gtidpo、瑞格列奈片1mgtidpo、阿托伐他汀片20mgqdpo等药物治疗。

A: 停用二甲双胍肠溶片

B: 停用瑞格列奈片

C: 停用阿托伐他汀钙片

D: 停用瑞格列奈片和阿托伐他汀钙片

答案：A

81.联合用药可使异烟肼失去抗菌作用的中成药

A: 昆布片（碘）

B: 丹参片（丹参酮）

C: 香连片（黄连）

D: 蛇胆川贝液（苦杏仁苷）

答案：A

82.患者，女，39岁，有哮喘病史。1天前因发热服用阿司匹林250mg，用药后30分钟哮喘严重发作，大汗、发绀、强迫坐位。

A: 吸入倍氯米松

B: 吸入色甘酸钠

C: 口服麻黄碱

D: 吸入沙丁胺醇

答案：D

83.吸附力强、可阻止毒物吸收，但是对氰化物无效的洗胃液是

A：鸡蛋白

B：药用炭混悬液

C：1%硫酸镁溶液

D：牛奶-水混合液

答案：B

84.以下药物中，可引起白细胞计数降低的药物为

A：埃索美拉唑

B：枸橼酸铋钾

C：铝碳酸镁

D：法莫替丁

答案：C

85.可抑制血小板聚集和释放的药物是

A：肝素

B：噻氯匹定

C：链激酶

D：华法林

答案：B

86.分解尿酸成为可溶性产物，可诱发抗体生成而使疗效下降，尤其适用于放疗或化疗所致的高尿酸血症的药物是

A：枸橼酸氢钾钠

B：苯溴马隆

C：非布司他

D：拉布立酶

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/345032103114012033