专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

# 2024福建省寿宁县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷200题题库（A卷）

## 第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.适用于年轻、震颤突出的患者

A：司来吉兰

B：苯海索

C：左旋多巴

D：恩托卡朋

**答案：B**

2.下列药物中，可经脑脊液途径给药的为

A：甲氨蝶呤

B：长春新碱

C：塞替派

D：氟尿嘧啶

**答案：A**

3.阿司匹林可导致

A：肾小球滤过率下降

B：不可逆性肾小管坏死

C：结晶沉积

D：前列腺素合成障碍

**答案：D**

4.结果一致的Ⅱ、Ⅲ级临床研究结论或Ⅰ级临床研究的推论属于()分级。

A：C级

B：D级

C：A级

D：B级

**答案：D**

5.(痛风的不同分期的治疗原则)，哪个时期的治疗原则是应有效控制血尿酸浓度、排酸

A：发作间歇期

B：急性发作期

C：痛风性肾病治疗期

D：首次发作期

**答案：A**

6.可以导致中性粒细胞减少的药物是

A：甲巯咪唑

B：头孢氨苄

C：辛伐他汀

D：对乙酰氨基芬

**答案：A**

7.（2016年真题）荨麻疹患者常出现（）。

A：嗜酸性粒细胞增多

B：血红蛋白减少

C：中性粒细胞增多

D：血小板计数增多

**答案：A**

8.患者，男，42岁，胃癌根治术后，病理为胃窦低分化腺癌，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇＋顺铂＋氟尿嘧啶。

A: 皮脂腺囊肿

B: 晚期顽固性卵巢癌

C: 晚期顽固性膀胱癌

D: 非精原细胞性生殖细胞癌

**答案：A**

9.接种乙肝疫苗可产生哪种抗体()。

A: HBeAb

B: HBeAg

C: HBsAb

D: HBsAg

**答案：C**

10.最常用的解热镇痛药为

A: 谷维素

B: 阿司匹林

C: 塞来昔布

D: 对乙酰氨基酚

**答案：D**

11.赵某，男性，60岁，既往高血压病史8年。与邻居吵架后突然起病，言语不清、左侧肢体无力、意识不清。查体：BP210／120mmHg，中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激阳性，左侧肢体无法活动，左侧巴宾斯基征阳性。

A: 止血
B: 扩容
C: 降血压
D: 脱水
**答案：D**

12.调剂工作未执行双人核对制度，归属于
A: 患者经济拮据
B: 产品缺陷
C: 操作失误
D: 管理缺失
**答案：D**

13.应在餐前服用的药物是()
A: 胶体果胶铋胶囊
B: 氨茶碱片
C: 吡罗昔康片
D: 呋塞米片
**答案：A**

14.从事药学服务的药师应具备较好的投诉应对能力，正确、妥善地应对投诉的重要意义是
A: 提高用药顺应性
B: 使患者获得有关的用药指导
C: 警惕与防范用药错误
D: 增进患者对药师工作的信任
**答案：D**

15.用于用药错误分级的是（）

A：NCEMERP标准

B：CLHD公式

C：CoChrAnE分级

D：CoCkroft-GAut公式

**答案：A**

16.除解热镇痛药外，可推荐给长期精神紧张的头痛患者应用的处方药是

A：氟西汀

B：卡马西平

C：地西泮

D：谷维素

**答案：C**

17.关于蛇咬伤中毒后的一般处理措施，叙述错误的是

A：每隔15～20min放松带子1～2min.以防止肢体缺血坏死

B：在伤口上做多个“十”字小切口以便排毒

C：用1：1000高锰酸钾溶液反复冲洗伤口

D：用绳索将伤口的近心端5cm处捆住，以防止毒液在体内扩散

**答案：C**

18.下列叙述正确的是

A：淋巴细胞为有粒细胞

B：白细胞均是有粒细胞

C：有粒细胞根据其颗粒的嗜好可分为中性、嗜酸性、嗜碱性3种

D：单核细胞为有粒细胞

**答案：C**

19.在中成药活胃胶囊、神曲胃痛片、陈香白露片、复方陈香味片、复方田七胃痛片中，所含有的共同组分是

A: 氧化镁

B: 氢氧化铝

C: 碳酸氢钠

D: 碳酸镁

**答案：C**

20.患者，女，51岁，体检时发现血压160/105mmHg，糖耐量试验餐后2小时血糖为9.56mmol/L(参考范围<7.8mmol/L)，甘油三酯1.2mmol/L(参考范围0.56~1.70mmol/L)，总胆固醇6.26mmol/L(参考值范围<5.2mmol/L)，低密度脂蛋白胆固醇4.85mmol/L(参考值范围2.1~3.1mmol/L)，高密度脂蛋白胆固醇为20mmol/L(参考值范围1.2~6.5mmol/L，肌酐60μmol/L(参考值范围45~84μmol/L)。蛋白尿：++。临床诊断为高血压、高脂血症、糖耐量异常。

A: 减少脂肪摄入

B: 不必限量

C: 控制体重

D: 增加运动

**答案：B**

21.给予非甾体解热镇痛药的依据是

A: 腹膜透析容易丢失水溶性维生素

B: 有助于合成红细胞

C: 肾脏功能发生衰竭时缺乏活性形式的维生素D

D: 透析患者会出现骨和关节疼痛或头痛

**答案：D**

22.急性或轻型肝炎时，肝功能检查结果可能显示的是

A: AST/ALT 比值>1

B: AST/ALT 比值<1

C: AST 下降

D: ALT 下降

**答案：B**

23.患者,男,80岁,临床诊断为前列腺增生，给予多沙唑嗪治疗。药师对该患者的用药指导正确的是()

A: 睡前服用,注意监测肾功能

B: 睡前服用,定期监测肝功能

C: 睡前服用,起床站立时应缓慢,预防体位性低血压

D: 每日服用一次,定期监测血糖,防止发生低血糖反应

**答案：C**

24.哺乳期妇女应用后可使乳儿出现易激惹、尖叫、惊厥等神经系统症状，男婴则出现乳房增大的药物是

A: 含雌、孕激素的避孕药

B: 卡托普利

C: 喹诺酮类药物

D: 四环素

**答案：A**

25.患者，男，57岁,因出现全身酸痛、乏力、高热等症状就诊，经流行病学调查及相关实验室检查，诊断为H1N1甲型流感。该患者可选用的神经氨酸酶抑制剂是()

A: 金刚烷胺

B：利巴韦林

C：金刚乙胺

D：奥司他韦

**答案：D**

26.（2021年真题）治疗艾滋病的非核苷类逆转录酶抑制剂是（）

A：依非韦伦

B：利巴韦林

C：拉米夫定

D：阿昔洛韦

**答案：A**

27.服用保泰松、水杨酸钠可呈现

A：黄色

B：白陶土便

C：橘红至红色

D：红至黑色

**答案：D**

28.第二类精神药品每张处方不超过几日常用量

A：3日

B：4日

C：5日

D：7日

**答案：D**

29.在治疗痛风时，应用排尿酸药的过程中应多饮水，一日尿量宜保持在

A: 1000ml以上

B: 2000ml以上

C: 1500ml以上

D: 500ml以上

**答案：B**

30.肝肾两种途径清除的药物在严重肝功能减退时血药浓度升高

A: 尽可能避免使用

B: 一般无须调整剂量

C: 须谨慎使用，必要时减量给药

D: 必须减量应用

**答案：D**

31.患者女,25岁,两天前淋雨后开始发热,体温39.0℃,咳嗽,咳铁锈色黏痰,化验结果提示白细胞计数及中性粒细胞比例升高,诊断为肺炎,经验性抗感染治疗时适宜选用的药物（）

A: 头孢他啶

B: 头孢唑林

C: 阿米卡星

D: 阿奇霉素

**答案：B**

32.使尿液呈碱性，可增加抗菌活性、减轻肾毒性，食醋则会加重其毒性作用的是

A: 林可霉素类

B: 氨基糖苷类

C: 大环内酯类

D: 头孢菌素类

**答案：B**

33.可抑制血小板聚集和释放的药物是

A：肝素

B：噻氯匹定

C：链激酶

D：华法林

**答案：B**

34.慢性肾脏病降压治疗首选的是

A：ACEI

B：钙制剂

C：ARB

D：RAAS拮抗剂

**答案：D**

35.高血压首选的利尿剂是

A：呋塞米

B：氨苯蝶啶

C：氢氯噻嗪

D：乙酰唑胺

**答案：C**

36.下列药学服务的重要人群中，特殊人群是指

A：肝肾功能不全者

B：应用特殊剂型者

C：药物治疗窗窄、需要做监测者

D：需要重新选择药品或调整用药方案者

**答案：A**

37.治疗苯二氮

A：呼吸抑制时给氧，必要时做人工呼吸

B：血液透析和血液灌流疗法

C：催吐、洗胃、硫酸钠导泻

D：血压下降时，选用升压药如去甲肾上腺素

**答案：B**

38.容易氧化的药物是

A：青霉素类

B：阿扑吗啡

C：牛痘菌苗

D：胃蛋白酶

**答案：B**

39.减轻前列腺张力和膀胱出口梗阻

A：索利那新

B：度他雄胺

C：特拉唑嗪

D：哌唑嗪

**答案：C**

40.患者，男，35岁。于中饭后即开始有胃部疼，胀满食少，现感觉脐周硬、闷痛拒按，于1日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因饱食而导致的继发性消化不良。

A：多潘立酮

B：胰酶片

C: 复合消化酶胶囊

D: 莫沙必利

**答案：D**

41.以下有关高血压的药物治疗方案的叙述中，不正确的是

A: 药物治疗高血压时要考虑患者的合并症

B: 可采用两种或两种以上药物联合用药

C: 首先选用血管扩张剂和中枢性抗高血压药

D: 采用最小有效剂量，根据需要可考虑逐渐增加

**答案：C**

42.头痛，伴颈部僵硬、恶心、发热和全身痛，可能有

A: 动脉瘤

B: 脑肿瘤

C: 脑血管意外

D: 脑膜炎

**答案：D**

43.复方铝酸铋

A: 宜餐后服用

B: 宜睡前服用

C: 宜清晨服用

D: 宜餐前服用

**答案：D**

44.吸附力强、可阻止毒物吸收，但是对氰化物无效的洗胃液是

A: 药用炭混悬液

B: 牛奶-水混合液

C：鸡蛋白

D：1%硫酸镁溶液

**答案：A**

45.促进肌肉发达增加爆发力的兴奋剂是

A：苯丙胺

B：阿托品

C：呋塞米

D：甲睾酮

**答案：D**

46.女，37岁，前来药店购买退热药，药师应进行的咨询与指导，错误的是

A：顾客告知自己母亲72岁，有慢阻肺病史，昨日出现头痛、肌肉酸痛、咽痛、咳嗽，前来替母亲购药，药师应建议顾客带家属就医，不宜自我药疗

B：若经过咨询得知顾客是为家里3岁女儿购买，不应推荐阿司匹林

C：如果得知顾客为本人购药，且已经服用过对乙酰氨基酚3日，症状未缓解，药师可建议患者联合服用布洛芬口服液

D：如果顾客购买对乙酰氨基酚口服液，应告知患者3天后症状未缓解需及时就医

**答案：C**

47.中度药品不良反应是指

A：指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害

B：没有临床症状，无须治疗

C：指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无须治疗

D：指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害

**答案：D**

48.患者，男，体检发现尿血红蛋白阳性，特向药师咨询，怀疑为药物所致，以下可导致尿血红蛋白阳性的药物是

A: 氯丙嗪

B: 庆大霉素

C: 秋水仙碱

D: 两性霉素B

**答案：C**

49.(联合用药)感染性腹泻患者应用小檗碱+鞣酸蛋白属于

A: 非适应证用药

B: 超剂量用药

C: 过度治疗用药

D: 超适应证用药

**答案：C**

50.乳母服用红霉素，乳汁中红霉素的量高于总用药量1%的机制是其

A: 在母体血浆中处于结合状态

B: 呈弱酸性

C: 呈弱碱性

D: 解离度大

**答案：C**

51.一般给予肠外营养的热氮比为

A: NPC7:3

B: 150kcal:1gN

C: NPC5：5

D: 100kcal:1gN

**答案：B**

52.适用于有完整子宫、绝经后期仍希望有月经样出血的妇女()

A: 雌孕激素序贯用药

B: 单纯孕激素补充治疗

C: 雌孕激素连续联合用药

D: 单纯雌激素补充治疗

**答案：A**

53.常引起粪便白细胞增多的是

A: 急性胰腺炎

B: 细菌性痢疾

C: 阻塞性黄疸

D: 溶血性黄疸

**答案：B**

54.可了解工作效果、并为之后工作的进一步完善的是

A: 对查阅的资料进行评价、分析和整理

B: 形成答案并以口头形式提供给询问者

C: 随访了解效果，并建立档案

D: 对问题进行确定并归类

**答案：C**

55.氯喹与链霉素合用

A: 加重神经肌肉接头抑制作用

B: 引起心脏房室传导阻滞

C: 诱发癫痫

D: 根治间日疟

**答案：A**

56.以下所列腹泻类别中，最适宜应用酶制剂的是()。

A: 病毒性腹泻

B: 肠道菌群失调所致的腹泻

C: 激惹性腹泻

D: 消化性腹泻

**答案：D**

57.服用地西泮等苯二氮

A: 咖啡

B: 烟

C: 酒

D: 浓茶

**答案：B**

58.患者，女，35岁，临床诊断为高甘油三酯血症，用非诺贝特微粒型胶囊调节血脂治疗，下列给药正确的用法与用量为

A: 0.1gtid

B: 0.5gtid

C: 0.5gqd

D: 0.2gqd

**答案：D**

59.含有马兜铃酸的中药，可引起的典型药源性疾病是

A: 慢性肾衰竭

B: 消化性溃疡

C：粒细胞减少症

D：溶血性贫血

**答案：A**

60.1型糖尿病患者首选的药物是

A：格列苯脲

B：二甲双胍

C：胰岛素

D：格列喹酮

**答案：C**

61.某口服避孕药复方制剂，其成分为：每片含屈螺酮3mg和炔雌醇0.03mg。说明书部分内容节选如下，请回答问题。

A：在服用以前所用的另种复方激素避孕药的停药期末开始服用本品

B：在取出最后一个周期包中的透皮贴剂的当天开始服用本品

C：在服用前一种复方激素避孕药最后一片的当天开始服用本品

D：在取出最后一个阴道环的当天开始服用本品

**答案：C**

62.需与脂餐同服，以增加其口服吸收生物利用度的痤疮治疗药是

A：米诺环素

B：过氧化苯甲酰

C：维A酸

D：口服短效避孕药

**答案：C**

63.胃食管反流病的患者应避免使用的药物是

A：特拉唑嗪

B：阿司匹林

C：阿仑膦酸钠

D：美托洛尔

**答案：C**

64.（2015年真题）他汀类药物引起的典型药源性疾病是（）。

A：胃肠类疾病

B：血液系统疾病

C：神经系统疾病

D：肝病

**答案：D**

65.一般情况下，为治疗感冒连续服用抗感冒药的时间不应该超过

A：9日

B：5日

C：7日

D：3日

**答案：C**

66.以下治疗手足浅表性真菌感染的药物中，尤其适用于角化鞍裂型足癣的处方药是

A：特比萘芬

B：尿素

C：苯甲酸

D：依沙吖啶

**答案：A**

67.女，30岁。G2P1既往月经规律，月经量少，身体健康，要求长期采取避孕措施。

A: 长效口服避孕药

B: 安全期避孕

C: 紧急避孕药

D: 宫内节育器

**答案：D**

68.患者，女性，62岁，自述近日常有一过性黑矇，雾视、视野中有黑点，一侧面部无力、麻木。医师诊断为短暂性脑缺血。

A: 300～500mg/d

B: 200～300mg/d

C: 300mg/d

D: 75～150mg/d

**答案：D**

69.药物不良反应报告的描述项目

A: 药品不良反应动态变化的相关症状体征、检查及干预措施结果

B: 采取措施干预不良反应的时间

C: 患者疾病发病时间

D: 患者用药记录

**答案：A**

70.属于超适应证用药的是

A: 食管癌应用顺铂、氟尿嘧啶、表柔比星进行治疗

B: 肠炎、细菌感染性腹泻同时应用小檗碱、双八面体蒙脱石散、盐酸地芬诺酯进行治疗

C: Ⅰ类手术切口应用第三代头孢菌素

D: 黄体酮用于排除结石

**答案：D**

71.患者，女，78岁，患有心衰，接受地高辛治疗，为了安全起见，药师定期给患者做血药浓度监测，血药浓度应控制在

A: 2.5～5.0μg/L

B: 0.5～0.9μg/L

C: 0.1～0.4μg/L

D: 15～30μg/L

**答案：B**

72.患者，女，45岁，1年前临床诊断为室上性心动过速，服用美托洛尔片25mgbid。近日因反复胃痛就诊，胃镜检查诊断为胃溃疡，幽门螺杆菌阳性。既往有膝关节疼痛，长期服用非甾体抗炎药。医师处方：奥美拉唑肠溶片20mgqd，甲硝唑片0.4gtid，克拉霉素片50mgbid，枸橼酸铋钾胶囊220mgtid。患者溃疡治愈后，因膝关节疼痛需要长期服用非甾体抗炎药。为降低溃疡复发风险，首选的预防药物是

A: 替普瑞酮

B: 奥美拉唑

C: 枸橼酸铋钾

D: 多潘立酮

**答案：B**

73.下列药物中使用前无需皮试的是

A: 紫杉醇注射剂

B: 抑肽酶注射剂

C: 苄星青霉素注射剂

D: 抗狂犬病病毒血清注射剂

**答案：A**

74.血清天门冬氨酸氨基转移酶(AST)的正常值参考范围是

A：速率法：<40U/L

B：速率法：成人<40U/L

C：<40U/L

D：成人<60U/L

**答案：B**

75.下列说法错误的

A：噻嘧啶与枸橼酸哌嗪合用可增强疗效

B：抗蠕虫药对妊娠及哺乳期妇女不宜应用

C：空腹服用抗蠕虫药可增强疗效

D：急性化脓性或弥漫性皮炎禁用抗蠕虫药

**答案：A**

76.高血压合并糖尿病、肾功能不全，宜选用的药物是

A：氢氯噻嗪

B：美托洛尔

C：缬沙坦

D：非洛地平

**答案：C**

77.乳酸性酸中毒患者宜选用()。

A：格列喹酮

B：瑞格美脲

C：二甲双胍

D：胰岛素

**答案：D**

78.缺血性脑卒中的二级预防用药中不包括（）

A：缬沙坦

B：阿司匹林

C：阿托伐他汀

D：依达拉奉

**答案：D**

79.脂溶性最高，作用快而短的是

A：戊巴比妥

B：苯巴比妥

C：硫喷妥

D：巴比妥

**答案：C**

80.血液具有输送营养、氧气、抗体、激素和排泄废物及调节水分、体温、渗透压、酸碱度等功能。成人的血液占体重的8%～9%。血液中的成分分为血浆(无形成分)和细胞(有形成分)两大部分。在正常情况下，血细胞主要包括红细胞、白细胞、粒细胞、淋巴细胞、血小板等。

A：31～60g/L

B：>90g/L

C：61～90g/L

D：<30g/L

**答案：D**

81.患者，女，40岁。误服化学物质硫酸铜，可缓解硫酸铜所导致的胃肠道刺激作用的洗胃液是

A：淀粉溶液

B：牛奶与水等量混合

C：活性炭混悬液

D：3%～5%鞣酸溶液

**答案：B**

82.可用于治疗夜盲症的药物是

A：维生素A

B：维生素C

C：复合维生素B

D：维生素

**答案：A**

83.使用后不能饮酒或含酒精饮料，以免发生“双硫仑样反应”的药物是

A：甲硝唑含漱液

B：地塞米松粘贴片

C：西地碘含片

D：氯己定含漱液

**答案：A**

84.（2015年真题）欲用95%乙醇和蒸馏水配制70%乙醇1000ml，所取95%乙醇体积约为（）。

A：665ml

B：700ml

C：737ml

D：500ml

**答案：C**

85.黄体酮用于输尿管结石

A: 超适应证用药

B: 盲目联合用药

C: 过度治疗用药

D: 无适应证用药

**答案：A**

86.患儿，女，4岁半，身高110cm，体重15KG，一天前发热(39℃)，咽喉痛，无咳嗽、吐血，家长主诉在家中应用退烧药治疗，发病左右出现腹泻，约2~5次大便，量少，黄色粘液便，呕吐一次。体格检查：T38.8℃，P118次/分，R28次/分。咽微充血，出现轻脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃，实验室检查：WBC：5×10

A: 动力性腹泻

B: 分泌性腹泻

C: 消化不良性腹泻

D: 感染性腹泻

**答案：D**

87.（2016年真题）患者，男，50岁，诊断为高血压、冠心病。

A: 氯吡格雷片

B: 对乙酰氨基酚片

C: 华法林片

D: 双嘧达莫片

**答案：A**

88.可主要引起淋巴细胞增多的疾病为

**以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。**
**如要下载或阅读全文，请访问：**
https://d.book118.com/345130242114012033