

2024 辽宁省桓仁满族自治县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题完整版附答案【基础题】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，男，72 岁，在晨练中突然感觉胸痛，倒地不起，周围伙伴急忙拨打 120。医务人员赶到现场后，初步诊断是心绞痛急性发作。经简单急救后，将病人送至医院治疗。并为患者开具了下列药物：阿司匹林肠溶片、洛伐他汀、硝苯地平、硝酸甘油。

- A: 普伐他汀
- B: 氯吡格雷
- C: 硝酸异山梨酯舌下片
- D: 比索洛尔

答案：C

2. 对肠道寄生虫具有神经肌肉阻滞作用，蛔虫产生痉挛性麻痹作用的是

- A: 枸橼酸哌嗪
- B: 噻嘧啶
- C: 阿苯达唑
- D: 甲苯咪唑

答案：B

3. 泡腾片的注意事项是

A: 不宜在口中久含，以免影响其掩盖药物味道、控制药物在一定部位释放的目的

B: 用后应漱口

C: 不宜直接给患者服用，应溶解在水中服用，以免引起窒息

D: 宜用温开水送服，直接服用会黏附在咽喉和食管壁上引起刺激、恶心等不适

答案：C

4. (2016 年真题) 治疗过敏性结膜炎可选用的药物是 ()。

A: 羟甲基纤维素钠滴眼液

B: 氧氟沙星滴眼液

C: 色甘酸钠滴眼液

D: 酞丁安滴眼液

答案：C

5. 药品不良反应按照程度分为轻度、中度、重度三级。

A: 指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害

B: 没有临床症状，无需治疗

C: 指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无需治疗

D: 指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害

答案：D

6. 可提示完全梗阻性黄疸的是

A: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$

B: $>342 \mu\text{mol/L}$

C: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

D: $34.2 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

答案：B

7. 妊娠早期初始，受精后半个月以内，患者用药不当的影响是

- A: 中枢神经系统发育迟缓
- B: 几乎见不到药物的致畸作用
- C: 女性生殖系统发育迟缓
- D: 可导致颅面部畸形、腭裂等

答案：B

8. 以下关于抑郁症的介绍错误的是

- A: 抑郁症的好发年龄在 20~50 岁
- B: 该病具有高发病、高复发、高致残的特点
- C: 及时恰当的治疗能提高抑郁症的临床治愈率
- D: 抑郁症的病因明确

答案：D

9. 患者，女，实验室检查：血红蛋白 95g/L，临床诊断为缺铁性贫血，处方口服硫酸亚铁片，下列向患者交代的用药注意事项，错误的是

- A: 不宜同时进食牛奶和蛋类
- B: 宜空腹服用
- C: 不宜与钙剂同时服用
- D: 宜同时补充维生素 C

答案：B

10. 应嘱咐患者避免冷饮冷食，避免暴露于低温或接触冰冷物体以防药物不良反应加重的是

- A: 顺铂
- B: 卡培他滨
- C: 卡铂
- D: 奥沙利铂

答案：D

11. 患者，女，56 岁。患直肠癌，其粪外观可呈现

- A: 鲜血便
- B: 乳凝块便
- C: 白陶土样便
- D: 细条便

答案：D

12. 细菌性尿路感染最常见的致病菌是()

- A: 克雷伯杆菌
- B: 铜绿假单胞菌
- C: 肠球菌
- D: 大肠埃希菌

答案：D

13. 属于癌痛治疗第三阶梯的止痛药物为

- A: 曲马多
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 羟考酮
- D: 可待因

答案：C

14. 相互作用使不良反应减少的联合用药是

- A: 普萘洛尔联用美西律
- B: 苄丝肼联用左旋多巴
- C: 阿托品联用氯磷定
- D: 阿托品联用吗啡

答案：D

15. 可吸附砷、沉淀汞的洗胃液是

- A: 1%氯化钠溶液
- B: 药用炭混悬液
- C: 3%~5%鞣酸溶液
- D: 鸡蛋白

答案：D

16. 不宜直接给患者服用，应溶解在水中服用，以免呛入气管

- A: 胶囊剂
- B: 糖浆剂
- C: 泡腾片
- D: 粉剂

答案：D

17. 大剂量或连续使用顺铂可导致

- A: 肾间质纤维化
- B: 直接肾毒性
- C: 不可逆性肾小管坏死
- D: 肾小管阻塞

答案：C

18. (2019 年真题) 患者，男，70 岁，高血压病史 14 年，服用依那普利 20mg/日，平时血压控制不佳，今晨大便时突然出现头疼、头晕，随即出现右侧肢体活动不利。血压为 190/100mmHg，头颅 CT 检查结果为左侧脑出血，出血量约 10ml，拟采用内科治疗，该患者首先应采取的治疗措施是

- A: 静脉滴注甘露醇注射液

- B: 口服氨氯地平片
- C: 静脉滴注硝酸甘油注射液
- D: 肌肉注射利血平注射液

答案：A

19. 患者，女，58 岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。日前体检：身高 160cm，体重 70kg；白细胞 8.0×10

- A: 高脂血症
- B: 糖尿病
- C: 肝炎
- D: 感染性疾病

答案：B

20. 过量服用维生素 D 导致中毒的典型临床表现是

- A: 骨质疏松或骨折
- B: 间质性肾炎或肾结石
- C: 骨骼发育不良或骨软化
- D: 横纹肌溶解或肌痛

答案：B

21. 急性支气管炎呈自限性，对于急性单纯性支气管炎不建议常规使用抗菌药物，除非是出现了肺炎。治疗通常是对症和支持疗法。

- A: 伪麻黄碱
- B: 右美沙芬
- C: 愈创木酚甘油醚
- D: 苯海拉明

答案：D

22. 选择性单胺氧化酶 A 抑制剂

- A: 氯米帕明
- B: 米氮平
- C: 氟伏沙明
- D: 吗氯贝胺

答案：D

23. 可用于治疗口腔溃疡，大剂量服用后，尿液可能呈黄色的药物是

- A: 维生素
- B: 维生素 A
- C: 复合维生素 B
- D: 维生素 C

答案：C

24. (2015 年真题) 阿卡波糖片的适宜服药时间是 ()。

- A: 餐后
- B: 餐中
- C: 清晨
- D: 餐前

答案：B

25. 下列治疗蛔虫病的药物中，以对肠道寄生虫具有神经-肌肉阻滞作用而显效的是

- A: 噻嘧啶
- B: 噻苯达唑
- C: 甲苯咪唑
- D: 阿苯达唑

答案：A

26. 需要在服药时多饮水的药物不包括

- A: 平喘药
- B: 降糖药
- C: 抗痛风药
- D: 氨基糖苷类抗菌药

答案：B

27. 慢性肾盂肾炎时，尿中可见（）。

- A: 白细胞管型
- B: 血红蛋白尿
- C: 红细胞管型
- D: 乳糜尿

答案：A

28. 处方审核“四查十对”中“四查”不包括

- A: 处方
- B: 药品成本
- C: 配伍禁忌
- D: 药品

答案：B

29. 某女性，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛；查体：T38℃，肾区叩击痛；血常规见 WBC15X10⁹ / L，中性粒细胞百分比 85%，尿常规见尿液混浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

- A: 首选针对革兰阳性菌的药物
- B: 选用肾毒性小、不良反应少的抗菌药物
- C: 如该患者为妊娠期，可选用氨苄青霉素

D: 抗菌药物在尿和肾内的浓度要高

答案：A

30. 白细胞分类中，淋巴细胞参考范围为

A: 50%~70%

B: 1%~5%

C: 3%~8%

D: 20%~40%

答案：D

31. (新生儿期的药动学特点)肾脏的有效循环血量与肾小球滤过率较成人低 30%~40%可影响

A: 药物吸收

B: 药物代谢

C: 药物排泄

D: 药物中毒

答案：C

32. 可用红霉素的敏感性预测自身敏感性的药物是

A: 替考拉宁

B: 阿莫西林

C: 克拉霉素

D: 头孢洛林

答案：C

33. 氢氯噻嗪与地高辛同服出现心律失常的机制是

A: 减少不良反应

B: 协同作用

C: 敏感化作用

D: 竞争性拮抗作用

答案: C

34. 育龄期妇女癫痫可酌情选用 ()

A: 乙琥胺

B: 丙戊酸钠

C: 卡马西平

D: 托吡酯

答案: C

35. 以餐后血糖升高为主，伴餐前血糖轻度升高，应该首选的降糖药是

A: 罗格列酮

B: 阿卡波糖

C: 格列本脲

D: 二甲双胍

答案: A

36. 患者,男,62岁,临床使用青蒿素和乙胺嘧啶联合治疗疟疾,产生的药物相互作用属于()

A: 敏感化作用,药品不良反应增加

B: 拮抗作用,药品不良反应增加

C: 降低抗药性,疗效增加

D: 增加靶器官药物浓度,药品不良反应减少

答案: C

37. 多数非甾体抗炎药适宜

A: 清晨服用

- B: 餐前服用
- C: 餐中服用
- D: 餐后服用

答案：D

38. 百日咳、结核病、水痘、麻疹、风疹、流行性腮腺炎、传染性肝炎，可呈现

- A: 红细胞计数减少
- B: 血小板减少
- C: 淋巴细胞增多
- D: 白细胞增多

答案：C

39. 以下治疗沙眼的药物中，属于处方药的是

- A: 2%硝酸银
- B: 酞丁安滴眼剂
- C: 硫酸锌滴眼剂
- D: 红霉素眼膏

答案：A

40. (2019 年真题) 某批次青霉素钠原料 1mg 相当于 1670 单位效价，生产规格为 80 万 U/支的青霉素钠产品，每支所需的装量是

- A: 0.48g
- B: 1.33g
- C: 2.088mg
- D: 1.33mg

答案：A

41. 淋巴细胞正常参考区间是

A: 0.01~0.05

B: 0~0.01

C: 0.03~0.08

D: 0.20~0.40

答案：D

42. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

A: 肾病患者服用呋喃妥因可引起周围神经炎

B: 服用阿司匹林出现哮喘、慢性荨麻疹等

C: 氯霉素在新生儿体内蓄积呈现灰婴综合征

D: 口服避孕药致阿米替林清除率下降

答案：D

43. 下列影响老年人血药浓度的因素中，叙述错误的是

A: 常规剂量连续给药就有可能引起蓄积性中毒

B: 心肝肾及胃肠等主要器官功能在不断下降

C: 与血浆蛋白结合率增加，使游离型药物减少

D: 对药物的代谢、排泄减慢，血浆半衰期延长

答案：C

44. 中国药学会医院药专业委员会推荐的国内药历格式不包括

A: 正文

B: 用药记录

C: 基本情况

D: 病历摘要

答案: A

45. 进行药学信息的收集、保管、整理、评价、传递、提供和利用，是

A: 处方审核

B: 处方点评

C: 参与健康教育

D: 药物信息服务

答案: D

46. 起效较慢，需要 3 个月才可以改善由前列腺增生所导致的尿路梗阻，减少残余尿量的 5 α 还原酶抑制剂是

A: 特拉唑嗪

B: 阿夫唑嗪

C: 非那雄胺

D: 氟伏沙明

答案: C

47. 患者，48 岁，胸痛部位在心前区，为压迫性疼痛，发作数秒钟，含服硝酸甘油 1~2 秒疼痛即消失。

A: 左旋氨氯地平

B: 曲美他嗪

C: 普伐他汀

D: 哌唑嗪

答案: A

48. 乳母服用华法林，乳汁中几乎不会含有华法林的机制是其

A: 解离度大

B: 在母体血浆中处于结合状态

C: 呈弱酸性

D: 呈弱碱性

答案：B

49. 助消化药不宜与抗菌药物、吸附剂同时服用；如必须联用，应间隔的时间是

A: 1.5 小时

B: 0.5 小时

C: 2~3 小时

D: 1 小时

答案：C

50. 某患者，女，14 岁，尿频、尿急、尿痛 3 天，伴腰痛。肾区叩击痛，血分析见白细胞及中性粒细胞百分比升高，尿分析见尿液浑浊，尿白细胞+++，临床诊断为急性肾盂肾炎。

A: 头孢曲松

B: 环丙沙星

C: 磺胺甲噁唑

D: 呋喃妥因

答案：B

51. 氰化氢中毒呈现

A: 抽搐、进行性加重

B: 呼出气体中可有苦杏仁气味

C: 出血、凝血时间延长

D: 恶心、呕吐、口内有金属味

答案：B

52. 痛风急性发作期不宜服用，以防发生转移性痛风发作的是

- A: 秋水仙碱
- B: 泼尼松
- C: 苯溴马隆
- D: 别嘌醇

答案：C

53. 以延长患者生命时间为量化指标所开展的药物经济学评价方法属于

- A: 成本-效益分析
- B: 最小成本分析
- C: 成本-效果分析
- D: 成本-效用分析

答案：C

54. 致癌、致畸作用常发生于用药数月或数年后，因此必须

- A: 了解患者及家族的过敏史
- B: 注意定期监测器官功能
- C: 注意特殊人群用药
- D: 注意药物的迟发反应

答案：D

55. 是归纳、综合、整理后的出版物，使用最为广泛

- A: 三级文献源
- B: 二级文献
- C: 药学网络
- D: 研究论文

答案：A

56. 可能诱发心血管脑病、引起肝癌、肾癌的是

- A: 易制毒药品
- B: 肽激素类
- C: 精神刺激剂
- D: 蛋白同化制剂

答案：D

57. 哺乳期妇女应用下列药物会对乳婴产生何种不良影响,妊娠早期服用甲氨蝶呤

- A: 导致新生儿血钙过高
- B: 可能致胎儿畸形
- C: 可能引起乳婴视神经损害、智力障碍
- D: 可引起过期妊娠、产程过长和产后出血

答案：B

58. 患者，男，50岁，血压 170 / 95mmHg，伴有双侧肾动脉狭窄，单药治疗控制血压效果不佳，宜选择的联合用药方案是

- A: 利尿剂+AR
- B: β 受体阻断剂+ARB
- C: 利尿剂+CCB
- D: α 受体阻断剂+ACEI

答案：C

59. (2015 年真题) 用于紧急避孕药的药物是 ()。

- A: 左炔诺孕酮
- B: 甲睾酮
- C: 黄体酮

D: 罗格列酮

答案：A

60. 杨某，男性，25 岁，间断上腹痛 2 年，表现为两餐之间出现上腹痛，持续至下餐进餐后缓解，以秋冬季多发。

A: 碳酸氢钠?

B: 氯化氢?

C: 奥美拉唑?

D: 克拉霉素?

答案：B

61. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素、药物因素。

A: 药动学相互作用

B: 药物的使用

C: 药理作用

D: 药物制剂因素

答案：B

62. 下列对于轻度沙眼疗效最好的药物是

A: 酞丁安

B: 磺胺醋酰钠

C: 硫酸锌

D: 红霉素

答案：A

63. 对小动脉、小静脉和微静脉均有扩张作用，用于高血压危象、高血压脑病、恶性高血压等高血压急症的是

- A: 氨力农
- B: 地高辛
- C: 多巴酚丁胺
- D: 硝普钠

答案：D

64. 氯喹与伯氨喹合用

- A: 加重神经肌肉接头抑制作用
- B: 诱发癫痫
- C: 根治间日疟
- D: 引起心脏房室传导阻滞

答案：C

65. 患者，女，5岁，体重 25kg。两天前受凉后发热，最高体温 38.9℃，并伴有鼻塞、咳嗽、喷嚏、流鼻涕等感冒症状。家长到药店购买酚麻美敏口服溶液、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚混悬滴剂和盐酸麻黄碱滴鼻液。

- A: 每天用药最多不应超过 5 次，用药不超过 3 天
- B: 每天用药最多不应超过 3 次，用药不超过 3 天
- C: 每天用药最多不应超过 4 次，用药不超过 3 天
- D: 每天用药最多不应超过 6 次，用药不超过 3 天

答案：C

66. 表现为“牛肉样舌”的疾病为

- A: 再生障碍性贫血
- B: 巨幼红细胞贫血

C: 缺铁性贫血

D: 白血病

答案：B

67. 以下毒物中毒，适宜服吐根糖浆催吐的是

A: 阿米替林

B: 氯硝西洋

C: 苯巴比妥

D: 磷化锌

答案：A

68. 适宜餐前给药的药物是

A: 法莫替丁

B: 二甲双胍

C: 缬沙坦

D: 复方铝酸铋

答案：D

69. (2015 年真题) 下列关于脑梗死急性期药物治疗的说法，正确的是 ()。

A: 急性脑梗死的溶栓治疗时间窗是 48 小时内

B: 应在使用溶栓药的同时联合使用阿司匹林

C: 血小板计数 $<100 \times 10^9/L$ 时应禁用溶栓药

D: 甘油果糖脱水作用较甘露醇强且快

答案：C

70. 由带状疱疹所致的严重后遗症神经痛，应选的药物是 ()

A: 卡马西平片

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 对乙酰氨基酚片
- C: 羟考酮缓释片
- D: 芬太尼透皮贴剂

答案：A

71. (2015 年真题) 解救有机磷中毒过程中，如阿托品应用过量，应立刻给予 ()。

- A: 毛果芸香碱
- B: 麻黄碱
- C: 东莨菪碱
- D: 山莨菪碱

答案：A

72. (抗癫痫药物的选择)，癫痫全身强直阵挛发作的一线用药是

- A: 卡马西平
- B: 扑米酮
- C: 加巴喷丁
- D: 乙琥胺

答案：A

73. 药师在接受护士用药咨询时，应重点关注的内容是

- A: 药品的生产厂商和批号
- B: 药物制剂的等效性
- C: 注射剂的配制和滴注速度等
- D: 药品经济学知识

答案：C

74. 患者，女，71 岁，2 型糖尿病史 10 年。化验结果糖化血红蛋白 (HbA) 9.2%，空腹血糖 10.5mmol/L，餐后血糖 15.5mmol/L。目前服用二甲双胍片 0.5gtidpo，格列美脲片 2mgtidpo，罗格列酮片 2mgbidpo，甲钴胺片 0.5mgtidpo，羟苯磺酸钙胶囊 250mgbidpo。

- A: 立刻喝白开水 200mL
- B: 立刻口服糖水或糖块
- C: 立刻舌下含服硝酸甘油片
- D: 立刻服用美托洛尔片

答案：B

75. 黏膜保护剂

- A: 埃索美拉唑
- B: 法莫替丁
- C: 多潘立酮
- D: 铝碳酸镁

答案：D

76. 患者，女性，25 岁，因面色苍白、头晕、乏力 1 年余，加重伴心悸 1 个月来诊。经诊断为缺铁性贫血。

- A: 叶酸
- B: 右旋糖酐铁
- C: 葡萄糖酸亚铁
- D: 琥珀酸亚铁

答案：A

77. 常见药源性疾病有药源性胃肠道疾病、肝脏疾病、肾脏疾病、血液疾病、神经系疾病、高血压病。

- A: 阿洛司琼

B: 阿米替林

C: 利血平

D: 呋塞米

答案：B

78. 可引起驾驶员视力模糊的药物是

A: 抗过敏药

B: 双嘧达莫

C: 东莨菪碱

D: 阿米洛利

答案：C

79. 糖尿病合并肾病患者首选的口服降血糖药为

A: 格列美脲

B: 格列喹酮

C: 格列吡嗪

D: 格列齐特

答案：B

80. 患者，女，22岁，因淋雨导致发热、咳痰伴胸痛1天就诊。查体：体温38.6℃，脉搏90次/分，呼吸24次/分，血压正常；双肺布满湿啰音。实验室检查：WBC $11 \times 10^9 / L$ ，胸片显示斑片状浸润性阴影。既往无过敏史。选用有效抗生素治疗后2天，体温恢复正常，咳痰减少。

A: 副流感病毒

B: 铜绿假单胞菌

C: 肺炎链球菌

D: 鲍曼不动杆菌

答案：C

81. 氯喹与链霉素合用

- A: 根治间日疟
- B: 加重神经肌肉接头抑制作用
- C: 引起心脏房室传导阻滞
- D: 诱发癫痫

答案：B

82. 适用于静脉推注的抗肿瘤药为

- A: 阿糖胞苷
- B: 塞替派
- C: 氮芥
- D: 甲氨蝶呤

答案：C

83. 患者男,65 岁,身高 170cm,体重 60kg,经血糖检测、糖耐量试验和肾功能检测(肌酐清除率 45ml/min),诊断为 2 型糖尿病、肾功能不全,该患者应首选的药物是

- A: 格列齐特
- B: 格列喹酮
- C: 格列吡嗪
- D: 格列本脲

答案：B

84. 轻度支气管哮喘的临床表现不包括

- A: 可有焦虑
- B: 步行或上楼时气短

C: 呼吸频率轻度增加，可闻及散在哮鸣音

D: 心率增快 >120 次 / 分

答案：D

85. 稳定型心绞痛发作时的治疗选用

A: 阿司匹林

B: 氯贝丁酯

C: 低分子肝素

D: 硝酸甘油

答案：D

86. 必须立即用清水冲洗至少 5 分钟是清除 ()

A: 皮肤污染酚类毒物

B: 眼内污染毒物

C: 眼内进入固体腐蚀性颗粒

D: 毛发被毒物污染

答案：B

87. 控制癫痫持续状态应首选

A: 静脉注射地西洋

B: 静脉注射丙戊酸钠

C: 口服硫酸镁

D: 肌内注射地西洋

答案：A

88. 毒物种类很多，中毒方式各异，虽然有的毒物中毒尚无特效的解毒药，但救治原则基本相同。

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

A: 卡马西平

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/346051113055011030>