

2024 江西省德兴市《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题完整题库（网校专用）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 同时使用 2 种药物，药物不良事件的发生率为

A: 0.38

B: 0.13

C: 0.72

D: 0.58

答案：B

2. 可主要引起嗜酸性粒细胞增多的疾病为

A: 过敏性疾病如支气管哮喘、荨麻疹等

B: 糖尿病

C: 肾移植术后发生排斥反应

D: 胃溃疡

答案：A

3. 下列药品中，归属妊娠毒性药物 A 级的是

A: 青霉素

B: 美托洛尔

C: 环丙沙星

D: 氯化钾

答案：D

4. 验证药物对目标适应证患者的治疗作用和安全性是指

- A: 临床预试验
- B: II 期临床试验
- C: I 期临床试验
- D: III 期临床试验

答案：D

5. 最常见的急性肾盂肾炎致病菌是

- A: 粪肠球菌
- B: 变形杆菌
- C: 葡萄球菌
- D: 大肠埃希菌

答案：D

6. 需要在凉暗处贮存的药品是

- A: 阿卡波糖片
- B: 头孢曲松钠
- C: 硝酸甘油
- D: 复方甘草合剂

答案：D

7. 药物警戒涉及与药品相关的研究和活动，但不包括

- A: 处方调配错误
- B: 疫苗的不良反应
- C: 药物的有效成分鉴定
- D: 药品超说明书用药

答案：C

8. 药物治疗结核病的原则不可随意间断用药、停药、换药

- A: 联合
- B: 早期
- C: 适量
- D: 规律

答案：D

9. 以下有关肝功能不全病人用药原则的叙述中，不正确的是

- A: 特别应避免与肝毒性的药物合用
- B: 选用从肝脏排泄的药物
- C: 避免或减少使用对肝脏毒性大的药物
- D: 定期检查肝功能，及时调整治疗方案

答案：B

10. 患者，男，60 岁，诊断为高血压伴蛋白尿，首选的药物是

- A: 美托洛尔
- B: 螺内酯
- C: 维拉帕米
- D: 氯沙坦

答案：D

11. 属于雄激素受体拮抗剂，使增生的前列腺体积缩小的药品

- A: 阿夫唑嗪
- B: 非那雄胺
- C: 黄酮哌酯
- D: 氟他胺

答案：D

12. (2018 年真题) 在患者入院、转科和出院时,药师通过核对新开的医嘱和已有的医嘱,核对患者目前的整体用药情况,避免漏用药物、重复用药。剂量错误和不良药物相互作用等,以保证患者用药安全的药学服务过程,属于 ()

- A: 药学干预
- B: 处方审核
- C: 药物利用评价
- D: 药物重整

答案: D

13. 胰岛素的给药时间适宜餐前 5~10 分钟给药的胰岛素制剂种类是

- A: 赖脯胰岛素
- B: 门冬胰岛素
- C: 普通胰岛素
- D: 精蛋白锌胰岛素

答案: B

14. 临床给药可根据药物半衰期确定给药间隔时间和给药途径

- A: 每日给药 1 次
- B: 每个半衰期给药 1 次
- C: 每 2~3 个半衰期给药 1 次
- D: 静脉滴注给药

答案: B

15. 作用于 DNA 化学结构的药物是

- A: 培美曲塞
- B: 放线菌
- C: 依托泊苷

D: 顺铂

答案：D

16. 痛经伴有精神紧张者可口服

A: 谷维素

B: 布洛芬

C: 对乙酰氨基酚

D: 阿司匹林

答案：A

17. (2016 年真题) 患者，女，62 岁，患有 2 型糖尿病，平时未规律监测血糖，今日来院复诊，欲了解近三个月的血糖总体控制情况，应检测的指标是 ()。

A: 糖化血红蛋白

B: 空腹血糖

C: 血红蛋白

D: 餐后 2 小时血糖

答案：A

18. 大剂量或连续使用顺铂可导致药源性肾病的机制是

A: 阻塞肾小管、肾小球

B: 肾间质纤维化

C: 前列腺素合成障碍

D: 不可逆性肾小管坏死

答案：D

19. 正常人的体温在 37℃ 左右，但各个部位的温度不尽相同，内脏温度最高，头部次之，皮肤和四肢末端的温度最低。发热是指人体体温升高，超过正常范围。发热是人体对致病因子的一种全身性防御反应，是患病时常伴发或主要表现的一种症状。

A: 37.4℃～38℃

B: 38.1℃～39℃

C: 41℃ 以上

D: 37℃ 以上

答案：B

20. 根据药物对胎儿的危害，美国 FDA 将妊娠用药毒性分为 A、B、C、D、X 五个级别，依那普利的妊娠毒性分级是()

A: C 级

B: D 级

C: X 级

D: A 级

答案：B

21. 以保证正常起居（避免夜尿）的是

A: 阿苯达唑

B: 抗忧郁药

C: 氨基糖苷类

D: 利尿药

答案：D

22. （2015 年真题）观察人体对新药的耐受程度和药动力学评价阶段是（）。

A: IV 期临床试验

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: I 期临床试验

C: III期临床试验

D: II 期临床试验

答案: B

23. 下列哪种属于配伍相容中化学稳定性的变化

A: 沉淀的变化

B: 渗透压的变化

C: 颜色的变化

D: 浓度的变化

答案: D

24. (2017 年真题) 患者, 男 52 岁, 身高 168cm, 体重 85kg, 痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖 7.8mmol/L (正常值: 3.9~6.1mmol/L), 餐后血糖 14.8mmol/L (正常值: <7.8mmol/L), 血尿酸 580 μ mol/L (正常值: 男性 180~440 μ mol/L), LDL-c 3.7mmol/L (正常值: 2.1~3.1mmol/L) 肌酐清除率 100ml/min。颈动脉彩超提示: 动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断 2 型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

A: ALT 升高

B: 腹胀

C: 低血糖

D: 心律失常

答案: B

25. 在"应用软膏剂和乳膏剂的注意事项"中, 不正确的是

A: 涂敷后封包以增加药物的吸收、提高疗效

B: 不宜涂敷于口腔、眼结膜

C: 涂敷前将皮肤清洗干净

D: 一般不要涂敷破损、溃烂、渗出的部位

答案：A

26. 患者，男，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

- A: 莫西沙星对非典型病原体无效
- B: 莫西沙星属于氟喹诺酮类
- C: 莫西沙星可覆盖社区获得性肺炎的常见病原体
- D: 莫西沙星对厌氧菌无效

答案：A

27. 患者，男，50 岁，高血压病史 3 年，期间先后使用硝苯地平片和硝苯地平控释片控制血压，近日出差曾饮酒和饮用多种饮料，出现血压波动情况。

- A: 控释片与普通片含量相同，可以固定时间，间替换服用
- B: 控释片一般一日三次给药，与普通片给药次数相同
- C: 控释片比普通片起效快，作用时间长
- D: 控释片比普通片含剂量高，不易嚼碎服用，不然会导致低血压

答案：D

28. 药物相互作用包括发生在体内的药动学、药效学方面的作用；以及发生在体外的配伍变化，如引起理化反应使药品出现混浊、沉淀、变色和活性降低。

- A: 伊曲康唑
- B: 红霉素
- C: 利福平
- D: 异烟肼

答案：C

29. 可引起良性颅内压增高、囟门隆起

A: 抗组胺药

B: 氯霉素

C: 维生素 A

D: 苯妥英钠

答案：C

30. 下列关于甲状腺功能亢进症患者教育的说法，错误的是

A: 哺乳期伴甲状腺功能亢进症患者首选甲巯咪唑

B: 禁食富含碘的食物

C: 避免饮用咖啡等兴奋性饮料

D: 避免使用含碘药物

答案：A

31. 患者，男，35 岁。于中饭后即开始有胃部疼，胀满食少，现感觉脐周硬、闷痛拒按，于 1 日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因饱食而导致的继发性消化不良。

A: 六味安消散

B: 莫沙必利

C: 胰酶片

D: 多潘立酮

答案：D

32. 大剂量或连续使用顺铂可导致

A: 肾小管阻塞

B: 直接肾毒性

C: 肾间质纤维化

D: 不可逆性肾小管坏死

答案: D

33. 下列高血压的降压目标普通高血压患者

A: $<120/80\text{mmHg}$

B: $<130/80\text{mmHg}$

C: $<140/90\text{mmHg}$

D: $<150/80\text{mmHg}$

答案: C

34. 患者，男，46 岁，因心绞痛伴房颤，给予维拉帕米治疗。维拉帕米的禁忌证是（）

A: 痛风

B: 冠心病

C: 双侧肾动脉狭窄

D: 心力衰竭

答案: D

35. 菌群失调性腹泻常见的病因是

A: 肠道正常细菌的数量或比例失去平衡

B: 细菌、真菌、病毒、寄生虫感染

C: 外界的各种刺激，如受寒、过食辛辣食物等

D: 直肠或结肠溃疡、肿瘤或炎症

答案: A

36. （2017 年真题）可分泌到乳汁中引起新生儿黄疸的药物是（）

A: 头孢克洛

B: 复方磺胺甲噁唑

C: 阿莫西林

D: 诺氟沙星

答案：B

37. 后记

A: 主要实验室数据

B: 药品名称、剂型、规格、数量、用法用量

C: 临床诊断、费别

D: 医师签名、药品金额

答案：D

38. 下列药物中属于溶栓药物的是（）

A: 利伐沙班

B: 血凝酶

C: 华法林

D: 阿替普酶

答案：D

39. 最有可能确认患者用药伤害事件的方法是

A: 病历审查

B: 计算机检测方法

C: 直接观察

D: 岗位工作问责

答案：A

40. 患者，女，21 岁，未婚，患有甲状腺功能亢进症。应用丙硫氧嘧啶 150mg tid 治疗 4 个月后，出现体重增加、乏力、怕冷、突眼加重，治疗方案应调整为

- A: 加大丙硫氧嘧啶用量
- B: 丙硫氧嘧啶减量并加用甲状腺素片
- C: 放射性 ^{131}I 治疗
- D: 换用另一种抗甲状腺药物

答案：B

41. 一般不会改变血红蛋白正常值的药物是

- A: 维生素 B
- B: 硝酸甘油
- C: 伯氨喹
- D: 维生素 K

答案：A

42. 关于丁螺环酮治疗焦虑症的优点，下列说法不正确的为

- A: 镇静作用轻
- B: 起效快
- C: 较少引起运动障碍
- D: 无呼吸抑制

答案：B

43. 妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

- A: 妊娠 1~3 周
- B: 妊娠 1~2 周

C: 妊娠 3~4 周

D: 妊娠 3~5 周

答案: D

44. 妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

A: 碳青霉烯类

B: 青霉素

C: 头孢菌素

D: 氯霉素

答案: D

45. 患者女 56 岁，诊断为高血压伴快速型心律失常，首选的药物是（）

A: 美托洛尔

B: 氯沙坦

C: 维拉帕米

D: 螺内酯

答案: A

46. 妇女口服避孕药致阿米替林清除率下降，引起药源性疾病的因素主要为

A: 年龄因素

B: 遗传因素

C: 基础疾病因素

D: 性别因素

答案: D

47. 妊娠后期长期使用，可导致胎儿严重出血，甚至死胎的药物是

- A: 雌孕激素、雄激素
- B: 叶酸拮抗剂
- C: 阿司匹林
- D: 沙利度胺

答案：C

48. 医生开具处方，必须使用药品的名称是

- A: 药品习用名
- B: 药品化学名
- C: 药品商标名
- D: 药品通用名

答案：D

49. 由服用利尿药所引起的尿失禁属于

- A: 真性尿失禁
- B: 急迫性尿失禁
- C: 急性、可逆性/暂时性尿失禁
- D: 压力性尿失禁

答案：C

50. 服用促胃动力药多潘立酮治疗消化不良，最佳用药时间是

- A: 餐后 1h
- B: 餐后
- C: 餐前
- D: 餐前 0.5~1h

答案：D

51. 用于前列腺增生症的高选择性 α 1A 受体阻断剂是 ()

- A: 托特罗定
- B: 索利那新
- C: 特拉唑嗪
- D: 坦索罗辛

答案: D

52. 容易缩短凝血酶原时间的药物是

- A: 利伐沙班
- B: 口服避孕药
- C: 普通肝素
- D: 华法林

答案: B

53. 患者，男，65 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次，阿卡波糖 0.1g. 一日 3 次。罗格列酮 4mg，一日一次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级，轻度肾功能不全，长期服用贝那普利、阿司匹林。

- A: 贝那普利
- B: 二甲双胍
- C: 阿卡波糖
- D: 阿司匹林

答案: B

54. 氟尿嘧啶、环磷酰胺与海螵蛸粉、白及粉、奋乃静、鲨肝醇组成复方制剂的目的是

- A: 减轻骨髓抑制
- B: 保肝

C: 减轻胃肠道反应

D: 减轻焦虑

答案: C

55. 临床上治疗焦虑症应用最广泛的药物为

A: 阿米替林

B: 舍曲林

C: 氟伏沙明

D: 帕罗西汀

答案: D

56. 下列病痛中，不适宜应用解热镇痛药治疗的是

A: 肠绞痛

B: 关节痛

C: 牙痛

D: 肌肉痛

答案: A

57. 杨某，女，19 岁，淋雨受凉后咳嗽、咯脓性痰并伴有胸痛，体温 39℃，听诊肺部有湿啰音。WBC $12 \times 10^9 / L$ 。该患者对青霉素过敏。

A: 哮喘

B: 支气管炎

C: 社区获得性肺炎

D: 肺结核

答案: C

58. 服药后或同时饮酒可致使药效学增强的药物是

A: 利血平

- B: 别嘌醇
- C: 地西泮
- D: 苯妥英钠

答案：C

59. 适用于各型癫痫的药物

- A: 卡马西平
- B: 苯妥英钠
- C: 丙戊酸钠
- D: 拉莫三嗪

答案：C

60. 妊娠期尿路感染

- A: 宜选用毒性小的抗菌药物
- B: 患者无尿路感染症状，但中段尿培养连续两次（同一菌株），尿细菌数 $>10^5\text{cfu/ml}$
- C: 治疗后症状消失，尿菌阴转后在 6 周内再次出现菌尿，菌种与上次相同
- D: 治疗后症状消失，尿菌阴性，但在停药 6 周后再次出现真性细菌尿，菌株与上次不同

答案：A

61. 与阿米卡星合用会影响其排泄导致急性肾损害的药物是()

- A: 维生素 B
- B: 阿司匹林
- C: 伏立康唑
- D: 铝碳酸镁

答案：B

62. 严重水肿可使用

- A: 呋塞米
- B: 氢氯噻嗪
- C: 乙酰唑胺
- D: 氨苯蝶啶

答案：A

63. 治疗咳嗽应依据咳嗽的频率和程度选药，剧咳者宜首选的非处方止咳药是

- A: 吗啡
- B: 右美沙芬
- C: 可待因
- D: 苯丙哌林

答案：D

64. 癫痫全面性发作首选

- A: 佐匹克隆
- B: 丙戊酸钠
- C: 布桂嗪
- D: 多奈哌齐

答案：B

65. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第一跖趾关节剧痛，3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 $500 \mu\text{mol/L}$ ；足部 X 线示非特征性软组织肿胀。

- A: 别嘌醇
- B: 丙磺舒

C: 苯溴马隆

D: 秋水仙碱

答案: D

66. 在药学信息咨询服务中，二级信息源资料的最突出的优势是

A: 对一个具体问题提供的信息全面、详实

B: 可提供丰富的信息

C: 提供的信息最新

D: 读者能自己评价信息，免受他人观点影响

答案: B

67. 治疗肺炎的抗菌药物的疗程一般为

A: 15 天

B: 7~10 天

C: 5 天

D: 3 天

答案: B

68. 处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件。处方按其性质分为法定处方和医师处方。《处方管理办法》还将处方分为麻醉药品处方、急诊处方、儿科处方、普通处方等。印刷用纸根据实际需要颜色区分，并在处方右上角以文字注明。

A: 淡红色

B: 淡黄色

C: 淡绿色

D: 淡橙色

答案: B

69. 可能导致血小板 (PLT) 计数减少的药物是

- A: 氯氮平
- B: 阿司匹林
- C: 苯妥英钠
- D: 胰岛素

答案：B

70. 属于药物信息服务的最重要的部分的是

- A: 确立有效的检索方法、查阅文献
- B: 对文献进行评价、分析和整理
- C: 形成答案并以口头形式提供给询问者
- D: 对问题进行确定并归类

答案：C

71. 患者女 58 岁，有 2 型糖尿病史，因头疼、头晕就诊，体征和实验室检查，餐前血糖 7.8mmol/L，餐后血糖 11.2mmol/L，糖化血红蛋白 8.8%，血压 166/96mmHg，蛋白尿>1g/24h，推荐在降糖的基础上，合并选用

- A: 氢氯塞嗪
- B: 特拉唑嗪
- C: 二甲双胍
- D: 赖诺普利

答案：D

72. 肝肾两种途径清除的药物在严重肝功能减退时血药浓度升高

- A: 须谨慎使用，必要时减量给药
- B: 一般无须调整剂量
- C: 尽可能避免使用

D: 必须减量应用

答案：D

73. 在患者药物治疗的每一个不同阶段（入院、转科或出院时），药师通过与患者沟通或复核，了解其在医疗交接前后的整体用药情况是否一致，与医疗团队一起对不适当的用药方案进行调整，并做详细全面的记录，从而预防医疗过程中的药物不良事件，保证患者用药安全的过程。这一深入开展的药学服务属于

A: 药物评价

B: 处方审核

C: 药物重整

D: 药学干预

答案：C

74. 静滴、静注等给药途径的不良反应发生率较高，说明药源性疾病的药物因素是

A: 药物制剂因素

B: 药物的使用

C: 生理因素

D: 不良生活方式

答案：B

75. 清洁手术的预防用药时间不超过

A: 6 小时

B: 48 小时

C: 24 小时

D: 12 小时

答案：C

76. 患者，男，67 岁，因带状疱疹前来就诊，实验室检查肌酐清除率 100ml/min 。医生处方阿昔洛韦片治疗，对于该患者，适宜的用法与用量是

- A: 0.4g，每日 2 次
- B: 0.4g，每日 3 次
- C: 0.4g，每日 5 次
- D: 0.4g，每日 4 次

答案：C

77. 不宜选用静脉滴注 5%碳酸氢钠注射液碱化尿液的情况是

- A: 苯巴比妥中毒
- B: 苯妥英钠中毒
- C: 司可巴比妥中毒
- D: 异戊巴比妥中毒

答案：D

78. 2 级高血压是指

- A: 收缩压 $<120\text{mmHg}$ 和舒张压 $<80\text{mmHg}$
- B: 收缩压 $160\sim179\text{mmHg}$ 和（或）舒张压 $100\sim109\text{mmHg}$
- C: 收缩压 $140\sim159\text{mmHg}$ 和（或）舒张压 $90\sim99\text{mmHg}$
- D: 收缩压 $\geq 180\text{mmHg}$ 和（或）舒张压 $\geq 110\text{mmHg}$

答案：B

79. 不能发现"长时间应用才能发生或停药后迟发"的药品不良反应，缘于

- A: 管理漏洞
- B: 病例数目少

C: 考察不全面

D: 观察时间短

答案: D

80. 关于胆石症的患者教育，错误的是

A: 使用抗菌药物

B: 避免快速减重和不吃早餐

C: 低胆固醇饮食

D: 有消化不良症状应做鉴别诊断

答案: A

81. 严重肝功能减退者服用经肝、肾两种途径清除的药物时

A: 一般无需调整剂量

B: 必须减量应用

C: 须谨慎使用，必要时减量给药

D: 避免使用

答案: B

82. 可抑制血小板聚集和释放的药物是

A: 链激酶

B: 噻氯匹定

C: 肝素

D: 华法林

答案: B

83. (2015 年真题) 静脉注射青霉素的适宜溶媒是 ()。

A: 0.9 氯化钠注射液

B: 50%葡萄糖注射液

C: 5%葡萄糖注射液

D: 复方氯化钠注射液

答案：A

84. 患者，男，65 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次，阿卡波糖 0.1g. 一日 3 次。罗格列酮 4mg，一日一次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级，轻度肾功能不全，长期服用贝那普利、阿司匹林。

A: 无糖饼干

B: 馒头

C: 葡萄糖

D: 蔗糖

答案：C

85. (2017 年真题) 患者，男 52 岁，身高 168cm，体重 85kg，痛风病史 6 年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖 7.8mmol/L (正常值: 3.9~6.1mmol/L)，餐后血糖 14.8mmol/L (正常值: <7.8mmol/L)，血尿酸 580 $\mu\text{mol/L}$ (正常值: 男性 180~440 $\mu\text{mol/L}$)，LDL-c 3.7mmol/L (正常值: 2.1~3.1mmol/L) 肌酐清除率 100ml/min。颈动脉彩超提示: 动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断 2 型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

A: 适量运动

B: 控制体重

C: 低嘌呤饮食

D: 应用阿司匹林

答案：D

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/346231034054011030>