三基理论知识考试题及答案

1、以下关于对被居家隔离居民采取的措施,错误的是

A、对密切接触者环境进行评估

B、每日至少对密切接触者早晚各测量1 次体温

C、实施医学观察的工作人员应做好个人防护

D、密切接触者医学观察期满后,如无异常情况,应及时解除医学观察

E、疑似病例排除后,其密切接触者仍需进行医学观察

答案：E

2、 脑血栓形成患者发病时间常在

A、血压剧烈上升时

B、感觉风寒时

C、睡眠或安静时

D、情绪激动时

E、剧烈运动时

答案：C

3、下列选项中,不属于脑卒中一级预防的内容是( )

A、控制体重

B、戒烟限酒

C、应用他汀类药物控制血脂

D、积极进行康复训练

E、防治心脏病

答案：D

4、下列细菌是目前医院感染常见的细菌,但除外( )

A、大肠埃希菌

B、沙门菌属

C、肺炎克雷伯菌

D、葡萄球菌属特别是金黄色葡萄球菌和凝固酶阴性葡萄球菌

E、铜绿假单胞菌

答案：B

5、③、在妊娠 24-28 周及 28 周后首次就诊时,对所有尚未被诊断为 PGDM 或 GDM 的孕妇,均推荐其进行下列哪项检测。

A、肾功能

B、肝功能

C、75g OGTT

D、产前诊断

E、胆汁酸

答案：C

6、麻醉实施前、手术开始前和患者离开手术室前,共同核查患者信息的手术组成员不包括( )

A、手术室护士。

B、有执业资质的助手医师

C、麻醉医师

D、有执业资质的主刀医师

E、实习医生

答案：E

7、患者女性,50 岁。既往高血压病史 10 年,近日出现劳力性呼吸困难,经休息后缓解,经诊断患者为心力衰竭,首先出现( )

A、左心房衰竭

B、左心室衰竭

C、右心室衰竭

D、全心衰竭

E、右心房衰竭

答案：B

8、有关皮内注射的论述,哪项是错误的( )

A、消毒忌用碘酊

B、进针角度为 5°

C、只用于药物过敏试验

D、部位是前臂掌侧下 1/3 段

答案：C

9、按照《医院感染管理办法》的要求,对( )采取保护性隔离措施。

A、患者家属

B、特殊感染患者

C、临床医护人员

D、免疫力低下患者

E、老年人

答案：D

10、判断心搏停止,触摸颈动脉搏动时间一般不应少于( )

A、1~3s

B、5~10s

C、15~ 20s

D、4~5s

E、20~ 30s

答案：B

11、护士发现医师医嘱可能存在错误,但仍然执行错误医嘱,对病人造成严重后果,该后果的法律责任承担者是( )

A、医师和护士共同承担

B、开写医嘱的医师

C、医师和护士无需承担责任

D、执行医嘱的护士

E、科主任

答案：A

12、留置胃管前应根据什么选择胃管的大小和质地( )

A、置管的目的

B、评估的结果

C、病人病情

D、食物的形状和量

E、病人年龄

答案：B

13、呕吐呈喷射状,应考虑

A、颅内压增高

B、幽门梗阻

C、低位性肠梗阻

D、高位性肠梗阻

E、食物中毒

答案：A

14、 大量不保留灌肠时灌肠筒的液面应高于肛门（ ）

A、10~20 cm

B、40~60 cm

C、65~80 cm

D、20~30 cm

E、30~40 cm

答案：B

15、男性,36 岁,左侧胸部多根多处肋骨骨折,查体:极度呼吸困难,发绀,周身发汗,BP68/42mmHg,左胸饱满,气管向右侧偏移,叩诊呈鼓音,首要的处理方法是( )

A、剖胸探查

B、吸氧

C、胸腔穿刺排气

D、输血.补液

E、胸廓固定

答案：C

16、病人出现悲伤,沉默寡言,潸然泪下,不听劝告,不遵医嘱,甚至自杀倾向,说明其心理反应为;( )

A、愤怒期

B、磋商期

C、抑郁期

D、接受期

E、震惊否认期

答案：C

17、需要病室空气湿度较高的病人是

A、急性胃炎病人

B、慢性胆囊炎病人

C、急性胰腺炎病人

D、心肌梗死病人

E、急性咽喉炎病人

答案：E

18、 患者,男性,55 岁,诊断为高血压,入院后应给予( )

A、要素饮食

B、低蛋白饮食

C、低盐饮食

D、少渣饮食

E、低糖饮食

答案：C

19、移植术后患者衣被建议采用( )消毒灭菌方法

A、高压蒸汽

B、用 500-1000mg/L 的有效氯消毒剂浸泡 60 分钟

C、日光暴晒 6 小时

D、煮沸 20 分钟

E、床单位消毒机

答案：A

20、中心静脉压监测前患者取何种卧位()

A、半坐卧位

B、俯卧位

C、侧卧位

D、平卧位

答案：D

21、 心脏骤停最可靠和迅速的判断依据是( )

A、瞳孔对光反射消失

B、心音消失

C、意识丧失和大动脉搏动消失

D、呼吸停止

E、瞳孔散大

答案：C

22、静脉输液补钾的先决条件是

A、尿量在 40ml/h 以上

B、浓度在 0、3%以上

C、速度在 60 滴/分以下

D、总量在 4~5g/d 以下

E、最多不要超过 6~8g/d

答案：A

23、②、针对该病人采取的措施( )

A、请眼科会诊

B、增加洋地黄的用量

C、减少洋地黄的用量

D、继续使用洋地黄维持量

E、停用洋地黄

答案：E

24、非手术治疗期间,应考虑手术治疗的情况是( )

A、发热

B、明显血尿

C、剧烈疼痛

D、血细胞持续下降

E、腰部肿胀

答案：D

25、②、患者诊断为高血压危象,对于该患者采取的护理措施,不正确的是( )

A、绝对卧床休息

B、迅速建立静脉通道,遵医嘱尽早应用降压药物进行降压。

C、保持头低脚高位

D、给与持续低浓度吸氧

E、进行心电、血压、呼吸监护

答案：C

26、骨牵引前应准备下列用物,以下不需要的是( )

A、牵引弓

B、牵引架

C、骨牵引器包

D、切开包

E、胶布、纱布绷带

答案：E

27、患者、女性、28 岁,腰痛,阵发性下腹部疼痛,尿频,尿急,尿痛,伴畏冷,发热 1 天就诊,查尿蛋白(+),白细胞 10/HP,红细胞 12/HP.诊断最可能的是( )

A、急性膀胱炎

B、尿道综合征

C、泌尿系结石

D、急性肾盂肾炎

E、急性肾炎

答案：D

28、上述诊断的基本病理生理改变不包括

A、肺间质水肿

B、肺泡萎陷、透明膜形成

C、肺淤血

D、肺通气与灌流比例失调

E、肺微循环障碍

答案：C

29、患者,男性,45 岁,因腹痛 1 天入院,既往有不规律上腹痛,自行购买胃药不规律服用,入院后体查:腹部有压痛、反跳痛、腹肌紧张,压痛以上腹部为主。①患者的诊断可能是( )

A、结肠癌

B、肠梗阻

C、急性阑尾炎

D、急性胰腺炎

E、消化道穿孔并急性腹膜炎

答案：E

30、 甲亢病人服碘剂准备后的最佳手术时期是( )

A、开始服碘剂 1 周左右

B、开始服碘剂 3 天以后

C、开始服碘剂 1~2 周

D、开始服碘剂 2~3 周

E、开始服碘剂 3~4 周

答案：D

31、患者,男性,35 岁。酒后驾车发生车祸,右上腹受伤致肝破裂。神志清楚,上腹部明显压痛,面色苍白,四肢湿冷。脉搏每分钟 132 次,血压 80/60mmHg。尿少,口渴,过度换气。病人的休克原因考虑

A、出血性休克

B、过敏性休克

C、中毒性休克

D、损伤性休克

E、神经源性休克

答案：A

32、 呼吸道和消化道的共同通道是

A、鼻

B、肺泡

C、喉

D、气管

E、咽

答案：E

33、②护士为病人进行痰液引流,正确的做法是( )

A、在体位引流过程中,指导病人作胸式深呼吸

B、一般于晨起饭前 30 分钟或饭后进行

C、首先引流下叶,然后引流上叶

D、引流前 30 分钟遵医嘱给予支气管扩张药

E、引流时间为每天 1-3 次,每次 15-20 分钟

答案：E

34、女性,35 岁。尿频、尿急、尿痛 5 天,体温 39.5° C,左肾区有叫击痛,尿常规蛋白++,白细胞满视野,红细胞 5~10/ HP.首先应予何种处理

A、作中段尿细菌培养后立即给抗革兰性杆菌药物

B、立即给抗革兰阴性杆菌药物

C、立即作中段尿细菌培养,待报告后处理

D、先作肾 B 超和肾功能检查

E、先给抗革兰阳性球菌药物

答案：A

35、为减轻患者疼痛,首选的药物是

A、硝酸甘油

B、吗啡

C、阿司匹林

D、心痛定

E、安定

答案：B

36、病人,女,30 岁,因消化道溃疡穿孔急需输注 400ml 血液,下列错误的是:

A、输血时需要两名医务人员携带病历及交叉配血单到患者床旁进行核对。

B、抽取交叉配血标本时,需要 2 名医务人员核对无误后方可执行。

C、取血时,认真核对血袋上的姓名.性别.编号.输血数量.血型等是否与交叉配血报告单相符,确保准确无误。

D、抽交叉配血时,发现化验单错误,立即在错误化验单上修改正确。

E、输血前要进行血型鉴定及交叉配血试验。

答案：D

37、关于护理不良事件处理与报告制度,哪项是错误的?( )

A、对于主动上报不良事件的科室或责任人,根据给病人造成的后果,经护理部讨论减轻或免于处罚

B、视护理不良事件造成的后果决定是否上报

C、对防范不良事件首先提出建议的科室和个人给予表扬

D、对主动上报不良事件的非责任护士给予表扬

答案：B

38、大面积烧伤现场急救时,下列哪种情况需要气管切开后方可转院

A、严重休克

B、上呼吸道梗阻

C、头部烧伤

D、心搏骤停

E、呼吸道烧伤

答案：B

39、男性 ,17 岁 ,1 型糖尿病病人 ， 因肺部感染而诱发酮症酸中毒 。下列哪种症状最具有特征性

A、呼气有烂苹果味

B、昏迷

C、严重口渴多饮多尿

D、皮肤干燥 ， 弹性差

E、呼吸深大

答案：A

40、患者男,44 岁。肝硬化食管静脉破裂出血约 1000ml,输入大量库存血后,出现心率缓慢、手足抽搐搦、血压下降、伤口渗血,出现以上症状的相关因素是

A、血钾降低

B、血钙降低

C、血钠降低

D、血钙升高

E、血钾升高

答案：B

41、 当患者可疑溶血反应时作为当班护士应首先采取( )

A、报告医生

B、立即停止输血

C、减慢输液滴速

D、监测患者生命体征

E、更换输血器

答案：B

42、服药、注射、输液查对制度不包括[ ]

A、注射前也应查对

B、下一班护士查对上一班医嘱

C、摆药后必须经第二人核对方可执行

D、严格进行三查八对

E、观察用药后的反应

答案：B

43、发生过敏性休克时应立即( )

A、皮下注射阿托品 0.5mg

B、皮下注射 0.1%肾上腺素 0.5-1ml

C、皮下注射去甲肾上腺素 1mg

D、肌肉注射地塞米松 5mg

E、皮内注射 0.1%肾上腺素 0.5-1ml

答案：B

44、术后当天患者宜采用的体位是

A、半卧位

B、斜坡卧位

C、头低脚高位

D、平卧位,膝、髋关节微屈

E、端坐位

答案：D

45、陈先生,66 岁,护士为其测量血压,为与第一次测量辨别,需重新测量,下述何项做法错误( )

A、测量值先读收缩压,后读舒张压

B、使汞柱降至 0 点

C、连续加压直到听清为止

D、稍等片刻后重测

E、将袖带内气体驱尽

答案：C

46、此时患者出现的并发症是

A、肺性脑病

B、脑血管意外

C、休克

D、弥散性血管内凝血

E、感染中毒性脑病

答案：A

47、手消毒效果应达到的要求:卫生手消毒监测的细菌数是( )。

A、≤8cfu/cm2

B、≤20cfu/cm2

C、≤10cfu/cm2

D、≤15cfu/cm2

E、≤5cfu/cm2

答案：C

48、患者入院后护士收集相关资料,以下不需要收集的资料是( )

A、患者的对健康和疾病的认识、精神及情绪状态

B、患者的手术、过敏史

C、患者的现病史

D、患者的年龄、民族、职业、宗教信仰

E、患者家庭成员的生活方式

答案：E

49、取咽拭子培养标本的部位是()。

A、两侧鄂弓、咽部、扁桃体

B、舌根部

C、舌四周

D、舌下

E、颊部

答案：A

50、该病人此时的治疗关键的哪一项:

A、纠正酸中毒

B、快速补充血容量

C、急诊手术

D、注射维生素 K

E、应用大剂量有效抗生素

答案：C

51、骨折的专有体征是

A、反常活动、局部肿胀和淤斑、骨擦音或骨擦感

B、畸形、反常活动、骨擦音或骨擦感

C、压痛与疼痛、局部肿脓和淤斑、功能障碍

D、畸形、局部肿胀与淤斑、骨擦音或骨擦感

E、疼痛与压痛、局部肿胀与淤斑、骨擦音或骨擦感

答案：B

52、老王,女,67 岁,患慢性充血性心力衰竭,在治疗期间出现恶心、头痛、头晕、黄视,检查心率 46 次/min,二联律。应考虑为( )

A、氨茶碱中毒

B、洋地黄中毒

C、多巴酚酊胺中毒

D、酚妥拉明中毒

E、硝普钠中毒

答案：B

53、轻度高渗性脱水的主要表现是( )

A、尿比重高

B、高热

C、口渴

D、血压下降

E、粘膜干燥

答案：C

54、对患者溶栓的护理措施中,不妥的是（ ）

A、观察病人有无发生出血

B、观察有无过敏

C、准确迅速地配制溶栓药物

D、患者溶栓后出现心律失常,说明溶栓失败,及时通知医生

E、询问有无溶栓禁忌证

答案：D

55、多重耐药菌感染的预防和控制措施不正确的是( )

A、单间隔离

B、诊疗用物必须专人专用

C、同种病原同室隔离

D、接触隔离

E、连续 2 次细菌培养阴性可解除隔离

答案：E

56、四肢手术区皮肤消毒范围,应以切口为中心,上下( )

A、10CM

B、20CM

C、15CM

D、30CM

E、5CM

答案：B

57、糖尿病病人饮食中碳水化合物应占总热量的( )

A、40%

B、10%

C、20%

D、30%

E、50%

答案：E

58、三腔管用于门脉高压病人胃底、食管静脉破裂压迫止血时,放置时间一般不超过( )

A、3-5 天

B、2-3 天

C、1-2 天

D、6 天

E、3-4 天

答案：A

59、 临时备用医嘱 SOS( )小时有效

A、12 小时

B、8 小时

C、48 小时

D、4 小时

E、24 小时

答案：A

60、目前确定的新型冠状病毒的传播途径,以下说法不正确的是。( )

A、呼吸道飞沫传播

B、接触传播

C、气溶胶传播

D、媒介昆虫传播

E、其他传播途径尚待明确

答案：D

61、体位引流宜在( )进行,以免导致呕吐。每次引流( )。一般可安排在晨起时.晚餐前及睡前,正确答案:是( )

A、饭前 1 小时或饭后 1 小时

20~30 分钟,每天 3~5 次

B、饭前 1 小时或饭后 1~2 小时

15~20 分钟,每天 1~3 次

C、饭前 1 小时或饭后 1~2 小时

20~30 分钟,每天 3~5 次

D、饭前 1 小时或饭后 1~2 小时

15~30 分钟,每天 1~3 次

E、饭前 1~2 小时或饭后 1 小时

15~20 分钟,每天 1~3 次

答案：B

62、溃疡病患者腹痛剧烈,疑有穿孔合并症,禁止使用( )

A、胃肠减压

B、西咪替丁

C、灭吐灵

D、阿托品

E、吗啡

答案：E

63、患者刘某,男,40 岁。劳累后突呕大量咖啡色胃内容物,约 500 毫升,查体:面色苍白,四肢湿冷,脉细数,血压 80/50mmHg,血常规血红蛋白 44g/L。治疗上立即予以输血、止血等处理。①输血开始时滴速宜慢,多久后再根据输注的血制品种类、患者病情和年龄调节输注速度( )。

A、5 分钟

B、10 分钟

C、15 分钟

D、20 分钟

E、30 分钟

答案：C

64、对其应立即采取的护理措施为（ ）

A、抗生素的应用

B、迅速建立静脉通路,扩容

C、做好各种术前准备

D、床头抬高 35°~45°

E、立即禁食,持续胃肠减

答案：B

65、哪些不是产生护理风险的原因( )

A、护理人员法律观念淡薄。

B、缺乏责任心

C、理论知识欠缺。

D、严格执行操作规程。

E、观察不细致,不到位。

答案：D

66、患者,女,41 岁,因双下肢麻木乏力、大小便失禁 2 月余就诊。患者极度消瘦,精神差,留置导尿 2 个月,尿液混浊。诊断:T1/12 海绵状血管瘤并出血,行海编状血管瘤清除术。现发现开放尿管,无尿液流出。患者无尿的主要原因可能是( )

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/347005001153006034